

BASE INSTRUMENTAL · EJE VI

Inventario de Sensibilización Central (CSI Parte A) (CSI-25)

Mayer, T. G., Neblett, R., et al. (2012)

Validación española: Cuesta-Vargas, Roldán-Jiménez, Neblett & Gatchel (2016), Pain Med

Nombre y apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ M ☐ F

Código / N° H.C.:

Instrucciones: Indique con qué frecuencia experimenta cada uno de los siguientes síntomas en una escala de 0 a 4.

0 = Nunca | 1 = Raras veces | 2 = A veces | 3 = A menudo | 4 = Siempre

N°	Ítem / Enunciado	0	1	2	3	4
1	Me siento cansado/a cuando me levanto por la mañana.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Siento mis músculos rígidos y doloridos.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tengo ataques de ansiedad o pánico.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Rechino o aprieto los dientes.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tengo problemas de diarrea y/o estreñimiento.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Necesito ayuda para realizar mis actividades diarias.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Soy especialmente sensible a las luces brillantes.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Me canso con facilidad cuando realizo actividad física.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Siento dolor en todo el cuerpo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Tengo dolores de cabeza frecuentes.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Siento malestar en la vejiga o dolor al orinar.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Tengo dificultades para dormir bien.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Tengo dificultades para concentrarme.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Tengo la piel muy sensible al tacto o a la presión.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Ciertas comidas me hacen sentir mal o me causan molestias estomacales.	☐	☐	☐	☐	☐
16	Siento mareos o sensación de inestabilidad.	☐	☐	☐	☐	☐
17	He tenido dolor crónico en cuello o espalda.	☐	☐	☐	☐	☐
18	Siento dolor en articulaciones.	☐	☐	☐	☐	☐
19	Soy muy sensible a ciertos olores o perfumes.	☐	☐	☐	☐	☐
20	Siento sensación de pesadez en las piernas.	☐	☐	☐	☐	☐
21	Siento una tristeza o desánimo persistente.	☐	☐	☐	☐	☐
22	Tengo dolor en la mandíbula o en los músculos de la cara.	☐	☐	☐	☐	☐

Nº	Ítem / Enunciado	0	1	2	3	4
23	Tengo hormigueos o entumecimiento en brazos o piernas.	☐	☐	☐	☐	☐
24	Siento náuseas con frecuencia.	☐	☐	☐	☐	☐
25	El estrés empeora mis síntomas físicos.	☐	☐	☐	☐	☐

Puntuación y corrección: Rango de 0 a 100 puntos. Puntos de corte: 0–29 subclínico; 30–39 leve; 40–49 moderado; 50–59 severo; 60–100 extremo. Punto de corte sugerido: ≥ 40 para sensibilización central.

Hoja compuesta por **psico-flujo** (Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este) a partir de la fuente citada. Los ítems pertenecen a sus autores. No reproduce material de ninguna editorial.