


9. ÖRNEKLEME DAĞILIMI

Örneklem istatistiklerini kullanarak bilinmeyen kitle parametrelerini tahmin etme yöntemlerinin genel adına çıkarımsal istatistik denir.



Kitleden seçilen örneklemin istatistikleri (\bar{x} , s^2 , p gibi) elde edilen her bir örneklem için değişkenlik göstereceğinden bu istatistikler birer rasgele değişkenlerdir (\bar{X} , S^2 , P gibi) ve birer dağılıma sahiptirler.


Tanım: birimlik bir kitleden büyüklüğünde çekilebilecek bütün örneklem için hesaplanan herhangi bir istatistiğin dağılımına örnekleme dağılımı denir.

Tanım: ortalamalı varyanslı birimlik bir kitleden çekilebilecek (iadelî ya da iadesiz tane) bütün örneklem için ortalamasından oluşan rasgele değişkeninin dağılımına ortalamanın örnekleme dağılımı denir.

olup iadelî örneklem için iadesiz örneklem için dir.


Not: Genel olarak biz kitledeki gözlem sayısını bilmeyiz ve sonsuz büyüklükte kabul ederiz. Bu nedenle değeri büyük değerleri için 1'e yakınsayacağından iadelî ve iadesiz örneklem için varyans olarak alınır ve standart sapması (hatası) da dir.

ortalomalı bir kitleden n birimlik bir örneklem seçilmesi



ortalomalı bir kitleden n birimlik k tane örneklem seçilmesi





Örnek: 2,4,6,8,10 olarak verilen kitle için yerine koymaksızın 2 birimlik örneklem seçiliyor. Örneklem ortalamasının beklenen değerini bulunuz.

$C(5,2)=10$ farklı örneklem söz konusudur. Bunları tabloda gösterelim:

Örneklem	Örneklem Ortalaması
2,4	3
2,6	4
2,8	5
2,10	6
4,6	5
4,8	6
4,10	7
6,8	7
6,10	8
8,10	9

Her bir sonucu $1/10$ olasılıkla elde edebileceğimiz açıktır. Bu nedenle rasgele bir örneklem oluşmuş olur. Olasılıkları şu şekilde ifade de edelim:

$P(=9)=1/10$, $P(=8)=1/10$, $P(=7)=2/10$, $P(=6)=2/10$, $P(=5)=2/10$, $P(=4)=1/10$, $P(=3)=1/10$.

Diğer yandan olup kitle ortalaması ile örneklem ortalaması çakışır.

Örnek: $N=3$ birimlik bir kitlenin elemanları $X_1 = 2, X_2 = 4$ ve $X_3 = 6$ olsun. Bu kitleden iadeli ve iadesiz olarak $n=2$ birimlik tüm mümkün örneklem çekilsin. Örneklem dağılımını oluşturup, dağılımın beklenen değeri (ortalaması) ve varyansını hesaplayınız.

Çözüm: Öncelikle kitle ortalaması ve varyansını bulalım.

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N} = \frac{2 + 4 + 6}{3} = 4$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N} = \frac{(2-4)^2 + (4-4)^2 + (6-4)^2}{3} = 2.67$$

- a) *İadeli örneklem:* 3 birimlik bir kitleden iadeli olarak alınan 2 birimlik örneklem sayıları $N^n = 3^2 = 9$ dur. Bunlar

No	Tüm mümkün örneklem	Örneklem ortalamaları (\bar{X}_i)	Ortalamaların Örneklem Dağılımı		
			Örneklem ortalamaları (\bar{X})	Frekanslar (f)	Görel frekanslar (olasılıklar $f(\bar{X})$)
1	2 ve 2	2	2	1	1/9
2	2 ve 4	3	3	2	2/9
3	2 ve 6	4	4	3	3/9
4	4 ve 2	3	5	2	2/9
5	4 ve 4	4	6	1	1/9
6	4 ve 6	5	Toplam	9	1
7	6 ve 2	4			
8	6 ve 4	5			
9	6 ve 6	6			

Dağılımın beklenen değeri

$$E(\bar{X}) = \sum \bar{X} * f(\bar{X}) = 2 * \frac{1}{9} + 3 * \frac{2}{9} + 4 * \frac{3}{9} + 5 * \frac{2}{9} + 6 * \frac{1}{9} = \frac{36}{9} = 4$$

$$= \frac{\sum \bar{X} * f}{\sum f} = \frac{2 * 1 + 3 * 2 + 4 * 3 + 5 * 2 + 6 * 1}{9} = 4$$

olup $E(\bar{X}) = \mu = 4$

Dağılımın varyansı

$$V(\bar{X}) = \sum (\bar{X} - E(\bar{X}))^2 * f(\bar{X}) = (2-4)^2 * \frac{1}{9} + (3-4)^2 * \frac{2}{9} + \dots + (6-4)^2 * \frac{1}{9} = 1.33$$

$$= \frac{\sum (\bar{X} - E(\bar{X}))^2 * f}{\sum f} = \frac{(2-4)^2 * 1 + (3-4)^2 * 2 + \dots + (6-4)^2 * 1}{9} = 1.33$$

olup $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{2.67}{2} = 1.33$

- b) *İadesiz örneklem*: 3 birimlik bir kitleden iadesiz olarak alınan 2 birimlik örneklem sayısını $C(3,2) = 3$ dur. Bunlar

No	Tüm mümkün örneklem	Örneklem ortalamaları (\bar{X}_i)	Ortalamanın Örneklem Dağılımı		
			Örneklem ortalamaları (\bar{X})	Frekanslar (f)	Görelî frekanslar (olasılıklar $f(\bar{X})$)
1	2 ve 4	3	3	1	1/3
2	2 ve 6	4	4	1	1/3
3	4 ve 6	5	5	1	1/3
			Toplam	3	1

Dağılımın beklenen değeri

$$E(\bar{X}) = \sum \bar{X} * f(\bar{X}) = 3 * \frac{1}{3} + 4 * \frac{1}{3} + 5 * \frac{1}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

$$= \frac{\sum \bar{X} * f}{\sum f} = \frac{3 * 1 + 4 * 1 + 5 * 1}{3} = 4$$

olup $E(\bar{X}) = \mu = 4$

Dağılımın varyansı

$$V(\bar{X}) = \sum (\bar{X} - E(\bar{X}))^2 * f(\bar{X}) = (3 - 4)^2 * \frac{1}{3} + (4 - 4)^2 * \frac{1}{3} + (5 - 4)^2 * \frac{1}{3} = 0.67$$

$$= \frac{\sum (\bar{X} - E(\bar{X}))^2 * f}{\sum f} = \frac{(3 - 4)^2 * 1 + (4 - 4)^2 * 1 + (5 - 4)^2 * 1}{3} = 0.67$$

$$\text{olup } V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} * \frac{N-n}{N-1} = \frac{2.67}{2} * \frac{3-2}{3-1} = 0.67$$

Tanım: Bir kitle parametresi tahmin edilirken kitle yerine örneklem kullanılmasıyla oluşan hataya yani farkına örneklem hatası denir.

Teorem: ortalamalı varyanslı normal dağılıma sahip bir kitleden çekilen örneklem ortalamasının örneklem dağılımı olup olur.

Teorem (Merkezi Limit): ortalamalı varyanslı bir kitleden olacak şekildeki örneklem ortalamasının örneklem dağılımı sahiptir. O halde olur.

Örnek: Elektronik parça üretimi yapan bir firma ortalaması 100 Ω ve standart sapması 10 Ω olan rezistanslar imal etmektedir. Rezistansın dağılımı normaldir. Örneklem hacmi 25 olan rezistansların oluşturduğu örneklem ortalamasının 95 Ω değerinin altında olması ihtimali nedir?

Çözüm: Normal dağılıma sahip ortalaması ve varyansı bilinen kitleden alınan örneklem ortalamasının dağılımı da normal olup , ve ‘tir.

Örnek: Demir bir testerenin bilendikten sonraki kullanım ömrü ortalaması 60 saat ve varyansı 36 olan dağılıma sahip olduğu biliniyor. İmal edilen bu testerelelerden rasgele seçilen

64 birimlik örneklemin ortalamasının 58 ile 61 saat arasında olması olasılığı nedir?

Çözüm: Kitle normal olmasa da çekilen örneklem büyüklüğü olup olur. O halde bizden istenilen olasılık

Örnek: X sürekli rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu şeklindedir. Bu kitleden rasgele seçilen 50 birimlik örneklemin ortalamasının 2.5 'tan az olması olasılığı nedir?

Çözüm: Örneklemin gözlem sayısı olup örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı normal dağılıma sahiptir. Öncelikle kitlenin ortalaması ve varyansını bulalım. r.d. düzgün dağılıma sahip olup ve 'tür. Ya da
O halde ve olup olur.

10. PARAMETRE TAHMİNİ

Parametre tahminini nokta tahmini ve aralık tahmini olarak iki kısımda incelenir.

10.1. Nokta Tahmini: kitlenin bilinmeyen parametresi olmak üzere, örneklemden elde edilen değerine 'nın tahmincisi denir.

Varsayalım ki bir mühendis otomobil şasisi üzerinde kullanılan bir parçanın kopma mukavemetini analiz ediyor olsun. Mühendis parçaların oluşturduğu kitleye ait ortalama kopma mukavemetini tahmin etmek için örneklem verisinin ortalamasını kullanacaktır. Bu sayı nokta tahmini olarak bilinir. Örneğin 'nün nokta tahmini olup şeklinde gösterilir.

Örnek: Bir bilgisayar şirketinin ürettiği ekran kartlarından rasgele seçilen 5 tanesinin ömürleri 12, 15, 18, 20 ve 24 ay olarak bulunuyor.

Bu bilgiye dayanarak şirketin ürettiği tüm ekran kartlarının ortalama ömrünün nokta tahmini ay olarak hesaplanır.


Benzer şekilde kitlenin varyansı 'nın nokta tahmini de örneklemin varyansı olup 'dır.

10.2. Aralık Tahmini (Güven Aralığı): Kitle parametresi 'yı nokta tahminleme yerine belirli bir hata payı (e) içeren bir aralıkla da tahmin edebiliriz. O halde aralığına 'nın aralık tahmini denir.

eşitliğinde değeri, 'nın aralığında bulunması olasılığını gösterir. Burada anlam seviyesi genellikle 0.01, 0.05 ve 0.10 alınır ve sırasıyla kitle parametresi için %99, %95 ve %90 güven aralıkları belirlenmiş olur.

Örneğin alınırsa bunun anlamı kitle parametresinin %95 güven aralığı demek olur ve 100 tekrarda elde edilen tahminin en az 95'i belirlenen aralıkta olduğunun göstergesidir.

10.2.1. Kitle ortalaması () için aralık tahmini: Kitle ortalamasının aralık tahmini için durum söz konusudur. Bu durumlar kitlenin varyansının bilinip bilinmediği ve kitlenin normal dağılıma sahip olup olmadığıdır.



a) Kitlenin varyansı () biliniyorsa ve kitle normal dağılıma sahipse örneklem büyüklüğü () ne olursa olsun ortalamanın örnekleme dağılımı da normal olup

Burada dir. Çünkü değerinden eşit ve küçük olması

olasılıkları toplam dir.

Örneğin; için

O halde nün güven aralığı olarak bulunur.

Örnek: Varyansı 225 olan normal dağılmış bir kitleden 25 birim büyüklüğünde örneklem çekilmiş ve ortalaması 110 olarak bulunmuştur. Kitle ortalamasının %95 güven aralığını belirleyiniz.

Çözüm: biliniyor ve kitle normal olup örneklemin gözlem sayısına bakılmaksızın kitle ortalamasının aralık tahmini dur. olup , ve dir. ise olup dir.

O halde nün %95 güven aralığı

Yani kitle ortalaması %95 ihtimalle ile arasındadır.

b) Kitlenin varyansı () biliniyor ve kitlenin dağılımı normal değilse örneklem büyüklüğü olduğunda merkezi limit teoreminden dolayı ortalamanın örnekleme dağılımı da normal olup dir. Yine kitle ortalaması nün aralık tahmini dir.

Örnek: Önceki bilgilere dayanarak ehliyet sınavına giren adayların aldıkları puanların standart sapması 25 puan olduğu bilinmektedir. Bu sınava giren adaylardan rasgele seçilen 80 adayın puan ortalaması 75 olduğuna göre kitlenin ortalama puanının %90 güven aralığını belirleyiniz.

Çözüm: Standart sapma olup varyans biliniyor demektir. Lakin kitlenin dağılımı bilinmediğinden güven aralığı için sadece örneklemin gözlem sayısı olması durumunda tablo değerleri kullanılabilir. Burada olup güven aralığı ile belirlenebilir. , olup dir. Buradan dir. O halde 'nün %90 güven aralığı Yani kitle ortalaması %90 ihtimalle ile arasındadır.

c) Kitlenin varyansı () bilinmiyorsa ve kitle normal dağılıma sahipse kitlenin varyansı () yerine onun nokta tahmini olan örneklem varyansı () kullanılır. 'nün güven aralığı örneklemdeki gözlem sayısına göre sayısına () göre;

ise olup

ise olup

ile belirlenir. Burada değeri serbestlik dereceli dağılımının olasılığına sahip tablo değeridir.

Örnek: Normal dağılan bir kitleden alınan 36 birimlik örneklem ortalama 25 ve varyansı 16 olduğuna göre kitle ortalamasının %95 güven aralığını belirleyiniz.

Çözüm: bilinmiyor lakin ve kitle normal olup olduğundan yerine onun tahmini yi alarak kitle ortalamasının aralık tahmini ile hesaplanır. Burada , ve olup dir. Yani kitle ortalaması %95 ihtimalle 23.69 ile 26.31 arasındadır.

Örnek: Normal dağıldığı bilinen bir kitleden alınan 16 birimlik bir örneklem ortalama 35 ve standart sapması 4.6 olarak bulunmuştur. Kitle ortalamasının $\alpha=0.05$ anlam seviyesinde güven aralığını belirleyiniz.

Çözüm: bilinmiyor lakin ve kitle normal olup $n=16<30$ olduğundan σ yerine onun tahmini s'yi alarak kitle ortalamasının aralık tahmini ile hesaplanır. Burada $\bar{x}=35$, $s=4.6$ ve $\alpha=0.05$ dir. Bizden %95 güven aralığı istenmektedir= 2.1314 olup

$$35 - [2.1314 *] \leq \mu \leq 35 + [2.1314 *] \Rightarrow 32.55 \leq \mu \leq 37.45$$

Yani kitle ortalaması %95 ihtimalle 32.55 ile 37.45 arasındadır.

Kitlenin varyansı () bilinmiyorsa ve kitle normal değilse uygulama açısından sadece $n \geq 30$ için $\leq \mu \leq \bar{x} +$ dir.

Örnek: Bir otelin lobisine gelen müşterilerin ortalama kaç dakika burada vakit geçirdikleri araştırmak istenmektedir. Rasgele seçilen 36 kişinin lobide kaç dakika kaldıkları gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu verilerin ortalaması 25 ve standart sapması 4 olarak hesaplanmıştır. Lobiye gelen tüm müşterilerin ortalama geçirdikleri sürenin %95 güven aralığını bulunuz.

Çözüm: ve kitlenin dağılımı bilinmiyor ancak olduğundan kitle ortalamasının aralık

tahmini ile hesaplanır. Burada , ve olup 'tir. Buradan olup
Yani %95 ihtimalle müşteriler lobide ortalama ile dakika arasında vakit geçirmektedir.


Not: nün güven aralığını şöyle özetleyebiliriz:

- a)** biliniyor ve kitle normal ise ne olursa olsun
- b)** biliniyor ve kitle normal değilse ancak ise
- c)** bilinmiyor ve kitle normal olsun ya da olmasın ise
- d)** bilinmiyor ve kitle normal olsun ise

Birlikli (Kümülatif) Student's t - Dağılım Tablosu

s.d.	t _{0.70}	t _{0.80}	t _{0.90}	t _{0.95}	t _{0.975}	t _{0.99}	t _{0.995}	t _{0.999}	t _{0.9995}
1	0.7265	1.3764	3.0777	6.3138	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	0.6172	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.327	31.599
3	0.5844	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.215	12.924
4	0.5686	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732	8.6103
5	0.5594	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934	6.8688
6	0.5534	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076	5.9588
7	0.5491	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	4.7853	5.4079
8	0.5459	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008	5.0413
9	0.5435	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968	4.7809
10	0.5415	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437	4.5869
11	0.5399	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247	4.4370
12	0.5386	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296	4.3178
13	0.5375	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.8520	4.2208
14	0.5366	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.7874	4.1405
15	0.5357	0.8662	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	3.7328	4.0728
16	0.5350	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	3.6862	4.0150
17	0.5344	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.6458	3.9651
18	0.5338	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.6105	3.9216
19	0.5333	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.5794	3.8834
20	0.5329	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.5518	3.8495
21	0.5325	0.8591	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.5272	3.8193
22	0.5321	0.8583	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.5050	3.7921
23	0.5317	0.8575	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.4850	3.7676
24	0.5314	0.8569	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969	3.4668	3.7454
25	0.5312	0.8562	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.4502	3.7251
26	0.5309	0.8557	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.4350	3.7066
27	0.5306	0.8551	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.4210	3.6896
28	0.5304	0.8546	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.4082	3.6739
29	0.5302	0.8542	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.3962	3.6594
30	0.5300	0.8538	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.3852	3.6460
35	0.5292	0.8520	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238	3.3400	3.5911
40	0.5286	0.8507	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045	3.3069	3.5510
45	0.5281	0.8497	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896	3.2815	3.5203
50	0.5278	0.8489	1.2987	1.6759	2.0086	2.4033	2.6778	3.2614	3.4960
60	0.5272	0.8477	1.2958	1.6706	2.0003	2.3901	2.6603	3.2317	3.4602
70	0.5268	0.8468	1.2938	1.6669	1.9944	2.3808	2.6479	3.2108	3.4350
80	0.5265	0.8461	1.2922	1.6641	1.9901	2.3739	2.6387	3.1953	3.4163
90	0.5263	0.8456	1.2910	1.6620	1.9867	2.3685	2.6316	3.1833	3.4019
100	0.5261	0.8452	1.2901	1.6602	1.9840	2.3642	2.6259	3.1737	3.3905
200	0.5252	0.8434	1.2858	1.6525	1.9719	2.3451	2.6006	3.1315	3.3398
∞	0.5244	0.8416	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.0902	3.2905

$$t_{0.975;8} = 2.3060$$



Örnek: Normal dağıldığı bilinen bir kitleden alınan örneklemin ölçüm değerlerini kullanarak kitle ortalamasının %95 güven aralığını bulunuz.

Çözüm: bilinmiyor lakin ve kitle normal olup olduğu için güven aralığı ile hesaplanır. Burada örneklemin ortalaması ve standart sapmasının hesaplanması gerekmektedir. olur. Kitle ortalaması %95 ihtimalle ile arasındadır.

Örnek: Bir araba üreticisi rasgele seçtiği 6 arabanın CO₂ emisyon değerlerini g/km olarak ölçmüştür. Verilerin normal dağıldığı varsayımı altında üretilen arabaların ortalama CO₂ emisyon değerlerinin %90 güven aralığını bulunuz.

Çözüm: bilinmiyor lakin ve kitle normal olup olduğu için güven aralığı ile hesaplanır. Yani üretilen arabaların ortalama CO₂ emisyon değerlerinin %90 güvenle ile arasındadır.

Örnek: Bir hastalığın tedavisinde yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Rasgele seçilen 12 hasta sözü edilen bu yöntem ile tedavi edilerek iyileşinceye kadar geçen süreler gün şeklindedir. Verilerin normal dağıldığı varsayımı altında anlam seviyesinde hastaların ortalama iyileşme süresi için güven aralığını bulunuz.

Çözüm: Kitle normal olup olduğu tablo değeri kullanılır. O halde hastaların bu yöntem ile ortalama iyileşme süresi %95 güvenle 7.75 ile 12.24 gün arasındadır.

Örnek: Belirli bir mahalleden rasgele seçilen 10 binanın yaşlarına ilişkin verilen yıl olarak belirlenmiştir. Mahalledeki binaların yaş değerlerinin normal dağıldığı varsayımı altında mahalledeki binaların ortalama yaşlarına ilişkin anlam seviyesinde güven aralığını bulunuz.

Çözüm: Kitle normal olup olduğu tablo değeri kullanılır.

Örnek: Bir çay fabrikası ürettiği 1 kilogramlık çay paketlerinin ortalama ağırlığı için %95 güven aralığını belirlemek istemektedir. Üretilen çay paketlerinden rasgele seçilen 49 tanesinin ortalama ağırlığı 995 gr ve standart sapması 70 gr olduğuna göre güven aralığını oluşturunuz.

Çözüm: ve kitlenin dağılımı bilinmiyor lakin olduğundan kitle ortalamasının aralık tahmini ile hesaplanır. Burada , ve olup olur.

10.2.2. Kitle oranı () için aralık tahmini: Bir fabrikada üretilen ürünlerin kusurlu ya da

kusursuz olması, bir fakültedeki öğrencilerin başarılı ya da başarısız olması gibi iki sonuçlu kitlelerin oran parametresi ile hesaplanır (). Burada kitledeki eleman sayısı olup de ilgilenilen özelliğe sahip gözlem sayısıdır.

Kitleden alınan boyutlu örneklemede ilgilenilen özelliğe sahip tane gözlem varsa örneklemin oranı olacaktır. Eğer , 0 veya 1'e çok yakın değil ve de yeterince büyükse (veya) örnek oranının dağılımı ortalaması ve varyansı olan normal dağılıma sahiptir. Kitle oranı bilinmediği durumlarda tahmini olan alınarak örnek varyansı olur. O halde kitle oranı için güven aralığı

ile hesaplanır.

Örnek: Bir fabrikada üretilen ürünlerin içerisinde rasgele seçilen 80 ürünün 6 tanesinin bozuk olduğu gözlemlenmiştir. Fabrikada üretilen ürünlerin bozuk oranı için %95 güven aralığını bulunuz.

Çözüm: , olup ve dur. Burada olup nin güven aralığı ile hesaplanabilir. ise dir. Buradan olup

Yani üretilen ürünlerin bozuk olma oranı %95 güvenle (ihtimalle) %1.74 ile %13.26 arasındadır.

Örnek: Seçim öncesi yapılan bir ankette 1000 kişiden 200 ünün bir siyasi partiyi destekledikleri tespit edilmiştir. Bu siyasi partinin oy oranı için %99 güven aralığını bulunuz.

Çözüm: , olup ve dur. Burada olup nin güven aralığı ile hesaplanabilir. olup dir. Buradan bulunur. Son olarak


olup bu da siyasi partinin oy oranı %99 ihtimalle %17 ile %23 arasında olacağını söyler.

Örnek: Bir bölgede sigara içen insanlar arasında kanser hastası olanların oranının belirlenmesi istenmektedir. Bu kişiler arasından rasgele seçilen 1500 kişinin 375'i kanser hastası olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgedeki sigara içen insanların kansere yakalanması oranı için %95 güven aralığını bulunuz.

Çözüm: , olup ve dur. olup dir. 'nin güven aralığı

O halde bu bölgedeki sigara içen insanların kansere yakalanması oranı %95 ihtimalle %23 ile %27 arasındadır.

10.2.3. Kitle varyansı () için aralık tahmini: ortalamalı varyanslı normal dağılıma sahip bir kitleden çekilen büyüklüğündeki örneklem varyansı olmak üzere



değeri serbestlik dereceli (Ki-Kare) dağılımına sahiptir. Burada kitle varyansı için güven aralığı


ile hesaplanır.

Örnek: Normal dağılım bir kitleden çekilen 12 birimlik örneklemin ortalaması 20 ve varyansı 10 olarak hesaplanmıştır. Kitle varyansı için %90 güven aralığını belirleyiniz.

Çözüm: , , olup ve olup için %90 güven aralığı
O halde %90 ihtimalle kitle varyansı değeri 5.59 ile 24.07 arasındadır.

Birikimli (Kümülatif) Ki Kare Dağılım Tablosu

s.d	$\chi^2_{0.005}$	$\chi^2_{0.01}$	$\chi^2_{0.025}$	$\chi^2_{0.05}$	$\chi^2_{0.10}$	$\chi^2_{0.25}$	$\chi^2_{0.50}$	$\chi^2_{0.75}$	$\chi^2_{0.90}$	$\chi^2_{0.95}$	$\chi^2_{0.975}$	$\chi^2_{0.99}$	$\chi^2_{0.995}$
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.45	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	4.25	6.35	9.04	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.07	7.34	10.22	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.90	8.34	11.39	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	6.74	9.34	12.55	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	7.58	10.34	13.70	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	8.44	11.34	14.85	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.30	12.34	15.98	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.17	13.34	17.12	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.04	14.34	18.25	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.91	15.34	19.37	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	12.79	16.34	20.49	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	13.68	17.34	21.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	14.56	18.34	22.72	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	15.45	19.34	23.83	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	16.34	20.34	24.93	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	17.24	21.34	26.04	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	18.14	22.34	27.14	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	19.04	23.34	28.24	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	19.94	24.34	29.34	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	20.84	25.34	30.43	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	21.75	26.34	31.53	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	22.66	27.34	32.62	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	23.57	28.34	33.71	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	24.48	29.34	34.80	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	33.66	39.34	45.62	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	42.94	49.33	56.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	52.29	59.33	66.98	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	61.70	69.33	77.58	85.53	90.53	95.02	100.43	104.21
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	71.14	79.33	88.13	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	80.62	89.33	98.65	107.57	113.15	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	90.13	99.33	109.14	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17



□

10.3. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi: Örneklem büyüklüğü arttıkça kitle parametrelerine ilişkin bilgilerimizin de artacağı kesindir. Fakat bu durumun maliyet ve

zaman açısından dezavantaja sahiptir. O halde optimum örneklem büyüklüğünün belirlenmesi önemlidir. Kitle parametresi için belirlenen maksimum hata değeri olmak üzere güven aralığına düşen kitle parametresi için örneklem sayısını belirleyelim.

10.3.1. Kitle ortalamasının tahmini için örneklem büyüklüğü: Kitle parametresi için hata değerine sahip güven aralığı

olarak yazılabilir. Kitle varyansının bilindiği ve kitlenin normal dağıldığı durumda'nın güven aralığı

olup burada hata değerini alınabilir. Bu eşitlikten değeri çekilirse bulunur. O halde nün hata payına sahip güven aralığında minimum örneklem büyüklüğü alınabilir. Ancak burada kitle varyansının bilindiği bilgisine ihtiyaç vardır. Bu bilgi önceki çalışmalar yardımıyla temin edilebilir ya da yerine bir ön örnekleme yapıp örneklemin standart sapması kullanılabilir.

Örnek: Bir fabrikada üretilen çelik kabloların ortalama kaç tonluk bir gerilime dayanabilecekleri araştırılmaktadır. Yöneticiler, kabloların dayanma güçlerinin standart sapması 1 ton olduğunu ve normal dağıldıklarını geçmiş verilerden bilmektedir. Örneklemden hesaplanacak ortalama değer ile gerçek ortalama arasındaki farkın en fazla 0.5 ton olmasını istediklerine göre %90 güven aralığı oluşturmak için kaç kablunun test edilmesi gerekmektedir?

Çözüm: , , olup

10.3.2. Kitle oranının tahmini için örneklem büyüklüğü: Kitle parametresi nin güven aralığı formülünde hata değeri olmak üzere alınabilir. Bu eşitlikten değeri çekilirse bulunur. O halde nin maksimum hata payına sahip güven aralığında örneklem büyüklüğü olarak alınabilir. Ancak burada örneklem oranı bilinmediği için geçmiş verilere ilişkin bilgileri ya da bir ön örnekleme yapıp tahmin edilebilir. Herhangi bir bilgiye sahip değilsek alınırsa değeri maksimum olacağından nin maksimum değerini bulmuş oluruz. Böylece alınabilir.

Örnek: Bir fabrikada üretilen ampullerin defolu olma yüzdesi yüzdesi tahmin edilmek isteniyor. En fazla %3 lük bir hata payı ile %95 güven aralığında

- Defolu olma oranının geçmiş bilgilere göre yaklaşık %10 bilgisiyle
- Defolu olma oranına ilişkin herhangi bir bilginin olmadığında durumlar için örneklem büyüklüğünü belirleyiniz.

Çözüm: olup ve dür.

- Geçmiş bilgilere göre kullanılırsa örneklem büyüklüğü
- Herhangi bir bilgiye sahip değilsek örneklem büyüklüğü

