

Espaces complets

Table des matières

1. Suites de Cauchy	2
2. Complétude	3
3. Complétude des espaces de fonctions continues	4
4. Théorème du point fixe de Banach-Picard	4

1. Suites de Cauchy

Définition 1.1. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E . On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de *Cauchy* si elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N \text{ et } q \geq N \Rightarrow \|x_p - x_q\| \leq \varepsilon.$$

Proposition 1.2. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de Cauchy, et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

- (1) $(x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.
- (2) $(\lambda x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.
- (3) $(\|x_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

Démonstration.

- (1) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N_1 \text{ et } q \geq N_1 \Rightarrow \|x_p - x_q\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

et puisque $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N_2 \text{ et } q \geq N_2 \Rightarrow \|y_p - y_q\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Posons $N := \max(N_1, N_2)$. Soit $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p \geq N$ et $q \geq N$. Alors

$$\|x_p + y_p - (x_q + y_q)\| \leq \|x_p - x_q\| + \|y_p - y_q\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

(2)

(3)

□

Proposition 1.3. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Alors la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Démonstration. Puisque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N \text{ et } q \geq N \Rightarrow \|x_p - x_q\| \leq 1$$

en particulier en posant $q := N$, on a

$$\forall p \in \mathbb{N}, p \geq N \Rightarrow \|x_p - x_N\| \leq 1$$

d'après l'inégalité triangulaire inversée, on a

$$\forall p \in \mathbb{N}, p \geq N \Rightarrow \|x_p\| \leq 1 + \|x_N\|.$$

Posons $M := \max(\|x_0\|, \dots, \|x_N\|, 1 + \|x_N\|)$. Alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée par M .

□

Proposition 1.4. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente. Alors la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, il existe $N \in \mathbb{N}$ et $\ell \in E$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \|x_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Soit $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p \geq N$ et $q \geq N$. Alors

$$\|x_p - x_q\| = \|x_p - \ell + \ell - x_q\| \leq \|x_p - \ell\| + \|x_q - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy. □

Proposition 1.5. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Si la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite convergente, alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite convergente, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante, $N_2 \in \mathbb{N}$ et $\ell \in E$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \Rightarrow \|x_{\varphi(n)} - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

et puisque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N_1 \text{ et } q \geq N_1 \Rightarrow \|x_p - x_q\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

en particulier en posant $q := \varphi(p) \geq p \geq N$, on a

$$\forall p \in \mathbb{N}, p \geq N \Rightarrow \|x_p - x_{\varphi(p)}\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N$. Alors

$$\|x_n - \ell\| = \|x_n - x_{\varphi(n)} + x_{\varphi(n)} - \ell\| \leq \|x_n - x_{\varphi(n)}\| + \|x_{\varphi(n)} - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. □

2. Complétude

Définition 2.1. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A un sous-ensemble de E . On dit que A est *complet* si toute suite de Cauchy de A est convergente dans A . Si E est complet, on dit que E est un *espace de Banach*.

Exemples 2.2. $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ et $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ sont des espaces de Banach.

Proposition 2.3. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A un sous-ensemble de E . Si A est complet, alors A est fermé.

Démonstration. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A qui converge vers $\ell \in E$. Puisque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy. Puisque A est complet, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans A , alors $\ell \in A$. Donc A est fermé. □

Proposition 2.4. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $A \subset B$ deux sous-ensembles de E . Si A est fermé et B est complet, alors A est complet.

Démonstration. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy d'éléments de A . Alors $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy d'éléments de B . Puisque B est complet, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans B . Mais puisque A est fermé, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans A . Donc A est complet. □

Proposition 2.5. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Si E est de dimension finie, alors E est un espace de Banach.

Démonstration. Notons d la dimension de E et (e^1, \dots, e^d) une base de E . Puisque E est de dimension finie $\|\cdot\|$ est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N \text{ et } q \geq N \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, d\}, |u_p^i - u_q^i| \leq \varepsilon$$

on en déduit que pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$, la suite $(x_n^i)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans \mathbb{R} et converge vers une limite $x^i \in \mathbb{R}$. Alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $x := (x^1, \dots, x^d) \in E$. Donc E est un espace de Banach. \square

3. Complétude des espaces de fonctions continues

Proposition 3.1. Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, A un sous-ensemble de E et $(C_b^0(A, F), \|\cdot\|_\infty)$ l'espace vectoriel normé des fonctions continues et bornées de A dans F . Si F est un espace de Banach, alors $C_b^0(A, F)$ est aussi un espace de Banach.

Démonstration. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy d'éléments de $C_b^0(A, F)$. Soit $\varepsilon > 0$, alors puisque la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N \text{ et } q \geq N \Rightarrow \forall a \in A, \|f_p(a) - f_q(a)\|_F \leq \varepsilon$$

en particulier, pour tout $a \in A$, la suite $(f_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans F . Puisque F est complet, la suite $(f_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(a) \in F$. Montrons que la fonction f est continue et bornée.

On remarque en passant à la limite que l'on peut écrire

$$\forall q \in \mathbb{N}, q \geq N \Rightarrow \forall a \in A, \|f(a) - f_q(a)\|_F \leq \varepsilon$$

donc la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f . Puisque les f_n sont continues, la fonction f est continue.

De la même manière en remarque que pour tout $a \in A$, on a $\|f(a) - f_N(a)\|_F \leq 1$, par une inégalité triangulaire inversée, on obtient

$$\|f(a)\|_F \leq 1 + \|f_N(a)\|_F$$

donc la fonction f est bornée. \square

4. Théorème du point fixe de Banach-Picard

Lemme 4.1. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach et $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ une série à termes dans E . Si $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge absolument, alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge simplement.

Démonstration. Notons $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des sommes partielles de $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$. Soit $M, N \in \mathbb{N}$ tels que $M \geq N$, alors par une inégalité triangulaire, on obtient

$$\|U_M - U_N\| = \left\| \sum_{n=N+1}^M u_n \right\| \leq \sum_{n=N+1}^M \|u_n\| = \sum_{n=0}^M \|u_n\| - \sum_{n=0}^N \|u_n\| \xrightarrow{M, N \rightarrow +\infty} 0$$

donc la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, puisque E est un espace complet, la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Donc la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge simplement \square