

# Recommandations vaccinales contre les méningocoques

	Obligation				Recommandation	
	Avant 12 mois	De 12 à 23 mois révolus (en rattrapage)	Jusqu'au 5 <sup>e</sup> anniversaire (en rattrapage)	De 5 à 10 ans révolus	De 11 à 14 ans révolus	De 15 à 24 ans (en rattrapage)
ACWY	1 dose 6 mois : <i>Nimenrix</i> <sup>®</sup>  Rappel 12 mois : <i>Nimenrix</i> <sup>®</sup> ou <i>Menquadfi</i> <sup>®</sup>	1 seul dose <sup>1</sup> : <i>Nimenrix</i> <sup>®</sup> ou <i>Menquadfi</i> <sup>®</sup>	1 seule dose <sup>1</sup> : <i>Nimenrix</i> <sup>®</sup> ou <i>Menquadfi</i> <sup>®</sup> ou <i>Menveo</i> <sup>®</sup> (procédure de remboursement en cours)	Possible selon AMM mais non remboursé	1 seule dose <sup>2</sup> : <i>Nimenrix</i> <sup>®</sup> ou <i>Menquadfi</i> <sup>®</sup> ou <i>Menveo</i> <sup>®</sup>	1 seule dose : <i>Nimenrix</i> <sup>®</sup> ou <i>Menquadfi</i> <sup>®</sup> ou <i>Menveo</i> <sup>®</sup>
B	1 dose 3 mois : <i>Bexsero</i> <sup>®</sup>  1 dose 5 mois : <i>Bexsero</i> <sup>®</sup>  Rappel 12 mois : <i>Bexsero</i> <sup>®</sup>	2 doses espacées de 2 mois* : <i>Bexsero</i> <sup>®</sup>  Rappel 12 mois* après la 2 <sup>e</sup> dose : <i>Bexsero</i> <sup>®</sup>	2 doses espacées d'1 mois* : <i>Bexsero</i> <sup>®</sup>	Possible selon AMM mais non remboursé	Possible selon AMM mais non remboursé	2 doses espacées d'1 mois* : <i>Bexsero</i> <sup>®</sup> ou 2 doses espacées de 6 mois* : <i>Trumemba</i> <sup>®</sup> ou 2 doses espacées d'1 mois* et rappel 4 mois* après la 2 <sup>e</sup> dose : <i>Trumemba</i> <sup>®</sup>

1 - Pour les enfants déjà vaccinés contre les méningocoques C et pour ceux non vaccinés auparavant.

2 - Pour les adolescents et jeunes adultes déjà vaccinés contre le méningocoque C, contre les méningocoques ACWY et pour ceux non vaccinés auparavant.

\*Les intervalles mentionnés entre les doses sont des intervalles minimums, il n'y a pas d'intervalle maximum.