Paso	Dos raíces distintas	Raíz doble
	x_0 x_1 $x_n = \mathbf{P}\cdot x_{n-1} + \mathbf{Q}\cdot x_{n-2}$	
1	$D = \mathbf{P}^2 + 4\mathbf{Q}$ (si da 0, segunda columna)	
2	$r1 = (\mathbf{P}+\sqrt{D})/2$ $r2 = (\mathbf{P}-\sqrt{D})/2$	$r = \mathbf{P}/2$
3	$a+b = x_0$ $r1\cdot a + r2\cdot b = x_1$	$(x_0+b)\cdot r = x_1$
4	$x_n = a\cdot r1^n + b\cdot r2^n$	$x_n = (x_0+b\cdot n)\cdot r^n$
Una raíz: $X_n = x_0\,\mathbf{P}^n$		

Solo una raíz: $x_0=2$, $xn=5\cdot xn-1 \rightarrow r=5$, $a=2 \rightarrow$ **$xn = 2\cdot 5^n$**

Qué es

A La fórmula del sumatorio (con k): 5k+2

B La fórmula del resultado (con n, a la derecha del signo igual): n(5n+9)/2

k La variable que cambia en cada término de la suma (1, 2, 3... hasta n)

Qué necesitas	Qué haces
Caso base	n=1 en B. k=1 en A. Compara que coincidan
Hipótesis	n=m en B
Destino	n=(m+1) en B
Último término	k=(m+1) en A
Demostración	Hipótesis + último término = Destino

Qué es (Inducción FUERTE)

A La recurrencia (la regla que relaciona xm con los anteriores): xm = p·xm−1 + q·xm−2

B La fórmula del resultado final (la que tiene n, la que quieres demostrar)

Qué necesitas	Qué haces
Caso base	n=0 y n=1 en B (los subíndices). Comparar con x_0 y x_1 del enunciado
Hipótesis	n=(m−1) y n=(m−2) en B
Destino	n=m en B
Sustitución	Mete la hipótesis dentro de A (en xm−1 y xm−2)
Demostración	Simplifica A con la hipótesis dentro, hasta llegar al Destino