

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информатики и прикладной математики Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов

ОТЧЁТ

по дисциплине:

«Теория и системы поддержки принятия решений» на тему:

«Представление функций рядом Фурье. Задание 4»

Направление: 01.03.02

Обучающийся: Бронников Егор Игоревич

Группа: ПМ-1901

Санкт-Петербург 2022

Задача 14

 $3a \partial anue$: Разложить в ряд Фурье периодическую функцию f(x) с периодом 2l, заданную в интервале (-l,l):

$$l = \pi, \quad f(x) = \pi + x$$

Решение:

Разложение в ряд Фурье на интервале $(-\pi,\pi)$ имеет вид:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos\left(\frac{\pi nx}{\pi}\right) + b_n \cdot \sin\left(\frac{\pi nx}{\pi}\right)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos\left(\frac{\pi nx}{\pi}\right) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin\left(\frac{\pi nx}{\pi}\right) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Таким образом, подставляя исходные данные, получаем:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi + x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2}{2} + \pi x \right) \Big|_{\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{3\pi^2}{2} - \left(-\frac{\pi^2}{2} \right) \right) = 2\pi$$

$$a_{n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi + x) \cos(nx) \, dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x \sin(nx)}{n} + \frac{\pi \sin(nx)}{n} + \frac{\cos(nx)}{n^{2}} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(2\pi \cdot \frac{\sin(\pi n)}{n} + \frac{\cos(\pi n)}{n^{2}} - \frac{\cos(\pi n)}{n^{2}} \right) = \frac{2 \sin(\pi n)}{n} = 0$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b_n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi + x) \sin{(nx)} \ dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x \cos(nx)}{n} - \frac{\pi \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-2\pi \cdot \frac{\cos(\pi n)}{n} + \frac{\sin(\pi n)}{n^2} + \frac{\sin(\pi n)}{n^2} \right) = -2 \cdot \frac{\cos(\pi n)}{n} = -2 \frac{(-1)^n}{n} \end{aligned}$$

Окончательно, получаем искомое разложение:

$$f(x) = \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-2\frac{(-1)^n}{n} \right) \cdot \sin(nx)$$