

Sistema Renal

SISTEMA RENAL:

- 2 Rins
- 2 Ureteres
- 1 Bexiga urinária
- 1 Uretra





www.enfermeirodiogo.com



Canal Professor Diogo Jacintho

Rim



Disfunções do Sistema Urinário

Um dos cuidados importantes da enfermagem, com aqueles que possuem disfunções urinárias, é a monitorização diária do balanço hídrico.

RETENÇÃO URINÁRIA

 A retenção urinária é um problema caracterizado pela incapacidade da bexiga de se esvaziar completamente.

- As principais manifestações clinicas são:
 - Oligúria
 - Bexigoma

Medidas para Aliviar a Diurese

Garantir a privacidade durante a micção.

Abrir torneiras e chuveiros próximos.

Molhar os pés dos clientes acamados.

Fazer sondagem vesical de alívio.

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

 A incontinência urinária é uma disfunção caracterizada pela perda do controle, total ou parcial, da micção.

CISTITE

- É uma inflamação da bexiga, geralmente iniciada na uretra, causada mais frequentemente por microorganismos
- É uma inflamação da bexiga, geralmente iniciada na uretra, causada mais frequentemente por microorganismos
- As mulheres são mais atingidas pelas cistites que os homens, tendo em vista o tamanho da uretra feminina, menor do que a masculina

Manifestações Clínicas

- Urgência Miccinal
- Poliúria
- Disúria
- Piúria
- Hematúria
- Forte dor na Região Suprapúbioca

Cuidados de Enfermagem

 Aplicar calor e banhos de imersão quentes, que ajudam a aliviar a dor e a urgência miccional;

 estimular a ingestão de grandes quantidades de líquidos para promover o aumento da diurese e eliminar as bactérias do trato urinário;

 orientar o esvaziamento completo da bexiga (a cada duas a três horas), com o intuito de reduzir o número de bactérias e para não ocorrer reinfecção.

UROLITÍASE

 Entre tantas substâncias que são eliminadas diariamente através da urina, temos o cálcio e o ácido úrico, que são substâncias cristalinas, isto é, formam cristais.

 Alguns fatores favorecem a formação de cálculos, como infecção das vias urinárias, estase urinária, períodos prolongados de imobilização no leito, ingestão excessiva de cálcio e a desidratação.

/w.enfermeirodiogo.com

Manifestações Clínicas


- Cólicas Renais
- Hematúria
- Piúria
- Distenção Abdominal
- Dairréia
- Nauséas
- Vômitos

Cuidados de Enfermagem

 o alívio da dor pode ser facilitado por meio de banhos quentes ou aplicação de calor úmido na região do flanco;

 uma ingestão elevada de líquidos deve ser mantida, pois os cálculos se formam mais facilmente em uma urina concentrada.

w.enfermeirodiogo.com



www.enfermeirodiogo.com

GLOMERULONEFRITE

 Refere-se a uma resposta inflamatória do glomérulo contra alguma substância nociva (antígeno) que invade o organismo humano, e que o sistema imunológico tenta destruir.

• Este complexo antígeno-anticorpo se adere ao glomérulo, obstruindo-o e causando inflamação.

Manifestações Clínicas

- Cefaléia
- Dor em flanco
- HAS
- Hematúria
- Oliguria
- Coliúria (urina em cor de coca-cola)