


# Principais Cirurgias GastroIntestinais

Prof Enfº Diogo Jacintho




[www.enfermeirodiogo.com](http://www.enfermeirodiogo.com)



**Canal Professor Diogo Jacintho**

# Gastrostomia - GTT

Formação cirúrgica de fístula gástrica para introdução de alimentos ou esvaziamento do estômago.



Corte transversal del estómago

**GASTROSTOMIA  
ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA - (Tubo PEG).**







# Cuidados de Enfermagem com GTT

- O Botton deve ser cuidado como se fosse a boca do paciente.
- Todo procedimento deve ser feito de forma cuidadosa.
- Todo procedimento deve ser feito com paciente na posição sentada ou fowler.
- Sempre lavar a sonda (com 30 a 60ml de água), antes e após a administração de medicação ou alimentação.
- Lavar sempre a pele com água e sabão













# Gastroplastia

- Gastroplastia, também chamada de **Cirurgia Bariátrica**, **Cirurgia** da Obesidade ou ainda de **Cirurgia** de redução do estômago.
- Como o próprio nome diz, uma plástica no estômago (gastro = estômago, plastia = plástica), que tem como o objetivo reduzir o peso de pessoas com o IMC muito elevado.

A cirurgia bariátrica esta indicada para os seguintes pacientes:

- $IMC > 40 \text{ kg/m}^2$
- $IMC > 35 \text{ kg/m}^2$  — associado a outras comorbidades (HAS, Diabetes tipo II, dislipdemia, apnéia do sono)





# Tipos de Cirurgia Bariátrica

- Existem três tipos principais de cirurgias bariátricas:
  1. Restritivas
  2. Disabsortivas
  3. Mistas

Bypass



Gastrectomia Vertical



Banda gástrica ajustável



Duodenal



# Ostomias

---

Um estoma é a parte do intestino (delgado ou grosso) exteriorizada para parede abdominal.

A características de um estoma normal é: vermelho-róseo, úmido, sangra discretamente quando toca

# Colostomia

- **Colostomia** consiste na exteriorização do intestino grosso, mais comumente do cólon transverso ou sigmóide, através da parede abdominal, para eliminação de gases ou fezes



- Colostomia pode ser dupla, quando há a boca proximal (para saída de fezes) e a distal (é irrigada periodicamente para manutenção da limpeza e retirada do muco).





# Cuidados de Enfermagem com Colostomia

- Orientar o paciente que, gradativamente, poderá educar a sua evacuação;
- Trocar a bolsa de colostomia fechada sempre que é necessidade, ou seja, encher de fezes ou se a bolsa descolar.
- Limpar o local com antissépticos ao trocar a bolsa e após a higiene local
- A partir do 7º dia de PO lava apenas com água e sabão sem esfregar;

- Colocar pedaços de carvão vegetal no interior da bolsa para diminuir o odor;
- Orientar para evitar alimentos que aumente formação de odor e gases. Ex:repolho,cebola,ovo,feijão etc...
- Estimular a hidratação, pois a maior quantidade de água nas fezes.
- Controlar e anotar a frequência e característica da evacuação;
- Orientar e estimular o paciente a cuidar da sua colostomia, supervisionando esse cuidados;

# Bolsas de Ostomia

- O sistema de bolsa variam de acordo com o fabricante e as necessidade do paciente.
- A bolsa pode ser descartável ou reutilizável.
- A troca da bolsa será feita quando o intestino estiver em sua menor atividade, após 4h da refeição, de noite ou de manhã depende da necessidade do cliente.



