薄肌理论 · 可持续版 · V1.1

可持续薄肌手册

好看、好用、练得久的身体



V1.1 · 2026 年 10 月 · 以 CC BY 4.0 授权发布，可自由转载、改编，请标明出处。

本手册是给一般成年人的健身指南，不取代医疗建议。有疾病、旧伤、怀孕或正在服药，开始前先问医生。

开始之前

怎么用这本手册

这是“薄肌理论”的可持续版。先看懂目标，再挑一套课表照着练。所有数字都是起点，不是规定；照自己的状况调整。

你想知道	看哪里
薄肌是什么、体脂要多少	第 1 章
一周要练哪些东西	第 2 章、第 7 章
重量训练怎么练、选哪套课表	第 3 章、第 4 章
有氧要做多少	第 5 章
怎么吃	第 8 章
没进步、很累怎么办	第 9 章、第 10 章
只想看重点	最后一页“速查卡”

开始前先确认

- 有心脏病、高血压、糖尿病、关节旧伤、怀孕，或正在长期服药：**先问医生**，尤其是高强度间歇和跳跃。
- 不确定的话，可以先做 PAR-Q+ 运动前自评问卷（网上可以免费获取）。
- 很久没运动：前 2–4 周全部用轻重量、短时间，让身体先适应。

疼痛红绿灯

练习时分清楚“累”和“痛”。肌肉酸是正常的，关节痛不是。

绿灯：照常练

肌肉酸、累、喘；练完隔 1–2 天的肌肉酸痛。

黄灯：调整

关节有点不舒服（10 分里 3 分以下），隔天就消退。**减重量、缩小幅度，或换一个不痛的动作。**

红灯：停

尖锐的痛、越练越痛、隔天更痛、麻或肿。**停练这个部位，找医生或物理治疗师。**

这本手册的原则

- 能长期做下去，比短期做到最好重要。
- 看趋势，不看单一天的数字。
- 忙的时候做少一点也算数，不要因为做不满就整周放弃。

第 1 章

目标：薄肌是什么

薄肌 = 足够的肌肉 + 适中的体脂。我们要的是一副好看、好用、能长期维持的身体，不是某个数字。

方法只有两个

- **重量训练**让肌肉长出来。
- **控制热量**让脂肪降下来。

没有专门练“薄肌”的特殊方法。肌力、心肺和平衡则让这身肌肉反应快、稳、不容易受伤。

体脂参考




图 1　体脂的外形参考。这是外形目标，不是健康分界线；每个人能舒服维持的范围不一样。

- **常态**：男性约 10–15%，女性约 20–25%。这个范围多数人吃得饱、练得动、睡得好。
- **短期压低**：拍照或活动前可以短期降一点，结束后回到常态。这不是必要步骤。
- **体脂机不准**：体脂秤、体脂机的误差常有好几个百分点。看**腰围、照片和长期趋势**更可靠。

一个更简单的健康指标

腰围小于身高的一半。例如身高 170 厘米，腰围最好在 85 厘米以下。量法：肚脐高度、自然呼气后量。

比体脂数字更重要的信号

出现以下情况，通常代表吃得太少或练得太多，男女都适用：

- 月经变乱或停经、性欲明显下降
- 一直很累、常生病、反复受伤
- 训练表现持续退步

这时先多吃一点、少练一点；持续的话去看医生。

第 2 章

六件事都要练，但比重不同

肌力、心肺、恢复是三根主柱，给足时间。爆发力、平衡、活动度用最少的量，塞进热身和课表空档。



图 2　三根主柱和三项小剂量。主柱撑起身体，小剂量让它更稳、更灵活。

要素	为什么要练	怎么练	每周最少
肌力	外形、代谢、老了还能自己走动	复合动作，慢慢加重	3 次
心肺	心血管健康、恢复快、活得久	中等强度为主，少量高强度	150 分钟中等强度，或 75 分钟高强度
恢复	让其他五项真正有效	睡眠、减量周、管理压力	每晚 7–9 小时
爆发力	反应快；40 岁后退化最快	跳、抛、短冲刺	2 次 × 5–10 分钟
平衡与核心	单腿稳定，少扭伤、少跌倒、少腰痛	单腿动作、抗旋转	放进重量训练
活动度	动作做得标准、关节舒服	动态热身、练后拉伸	每次 5–10 分钟

柔韧性够用就好，能把动作做标准即可。多拉筋并不能明显预防受伤，不必花大量时间。

第 3 章

重量训练：五个原则

记住这五条，换哪套课表都通用。

#	原则	说明
1	**每个肌群每周练 2 次**	比一周只练一次更有效，漏练一天也不会整周落空。
2	**每个肌群每周约 10 组**	新手 6–8 组就有效。热身组不算。
3	**每组做到“还能再做 1–3 下”**	太轻不算数，每组都做到力竭又太累。见图 3。
4	**主项 6–10 下，辅助 8–15 下**	主项是深蹲、硬拉、卧推、划船这类大动作；辅助动作是侧平举、弯举这类小动作。
5	**用“双重渐进法”慢慢加**	先加次数，再加重量。见图 4。

做完一组，问自己：“还能再做几下？”



深蹲、硬拉这类大动作不要做到 0。新手很难估准，先保守一点（留 2–3 下），练几周就会越来越准。

图 3　每组的用力程度。大部分的组停在“还能再做 1–3 下”。

双重渐进法

每个动作设一个次数范围，例如 8–10 下。

1. 重量不变，每次训练想办法多做一两下。
2. 所有组都做到上限（10 下）后，下次加重量，次数回到下限（8 下）重新开始。
3. 每次加多少：上肢 1–2.5 公斤，下肢 2.5–5 公斤。侧平举、弯举这类小动作加不上重量很正常，多加次数就好。





图 4　双重渐进法示例（卧推，8–10 下，3 组）。次数一路往上加，三组都做到 10 下就加重量，次数回到 8 下再往上爬。

每次训练的流程

1. **动态热身 5–10 分钟**（第 6 章）。
2. **爆发力 5–10 分钟**（有安排的那天）。
3. **主项**：先做 2–3 组由轻到重的热身组，再做正式组。组间休息 2–3 分钟。
4. **辅助动作**：组间休息 1–2 分钟；可以两个动作轮流做（超级组）来省时间。
5. **练后拉伸 5 分钟**，记录这次的重量和次数。

遇到瓶颈怎么办



例：8–10 下改成 10–12 下；杠铃卧推改成哑铃卧推

两个例外

- 减脂期：力量能维持住就算成功，不用每次都进步。
- 别太快换动作：换得太频繁，反而看不出自己有没有进步。

图 5　瓶颈的处理顺序。大部分瓶颈是睡眠或饮食的问题，不是课表的问题。

减量周

大约每 6–8 周安排一次，或在明显疲劳、关节酸、连续停滞时提前安排：**组数减半，重量不变或略降**，维持一周再恢复。

第 4 章

选一套课表

大多数人每周练三次就够，重点是每个肌群练到两次、每周约 10 组，而且能长期做下去。

A　新手全身

每周 3 次 · 每次 45–60 分钟

- 练不到半年
- 还不会深蹲、硬拉
- 先练 8–12 周

B　标准三练（主力）

每周 3 次 · 每次 60–75 分钟

- 动作已经熟练
- 大多数人练好几年都够
- 本手册的周课表用这套

C　进阶四练

每周 4 次 · 每次 60–75 分钟

- 认真练 1–2 年以上
- 饮食睡眠都做到，仍卡 2 个月
- 每周真的有 4 天空

图 6　三套课表怎么选。由左往右升级；忙的时候可以退回去。

A　新手全身（第 1–12 周）

A、B 两天轮流，每周 3 次：第一周 A-B-A，第二周 B-A-B。重量选“做完还能再做 3 下”的轻重量，专心把动作练标准。

A 日	约 13 组
高脚杯深蹲	3 × 8–12
哑铃卧推	3 × 8–12
高位下拉	3 × 8–12
哑铃罗马尼亚硬拉	2 × 8–12
平板支撑	2 × 20–40 秒

B 日	约 13 组
腿举或分腿蹲	3 × 8–12
坐姿划船	3 × 8–12
哑铃肩推	3 × 8–12
臀推	2 × 10–15
死虫式	2 × 每边 8

B　标准三练：下肢 / 上肢 / 全身

周一、周三、周五（或任何不连续的三天）。主项 6–10 下，辅助 8–15 下。

周一　下肢	15 组 · 约 70 分钟（含跳箱）
深蹲	4 × 6–10
罗马尼亚硬拉	3 × 6–10
保加利亚分腿蹲（兼练平衡）	3 × 每边 8–12
腿弯举	3 × 10–15
Pallof 推（抗旋转核心）	2 × 每边 10

周三　上肢	23 组 · 约 75 分钟（含药球）
卧推	4 × 6–10
引体向上（做不到 6 下就用高位下拉）	4 × 6–10
站姿肩推	3 × 6–10
俯身划船	3 × 8–12
双杠臂屈伸（做不到就用窄距俯卧撑）	3 × 8–12
侧平举 + 二头弯举（超级组）	各 3 × 10–15

周五　全身	20 组 · 约 70 分钟
上斜哑铃卧推	3 × 8–12
前蹲或腿举	3 × 8–12
臀推	3 × 8–12
单臂哑铃划船	3 × 8–12
单腿罗马尼亚硬拉（兼练平衡）	2 × 每边 8–10
面拉 + 侧平举（超级组）	各 3 × 12–15




图 7　标准三练每周的直接组数。每个主要肌群都练到两天、约 10 组。胸想多练，周五加 2 组飞鸟即可。

C　进阶四练：上肢 / 下肢 × 2

周一上肢 A、周二下肢 A、周四上肢 B、周五下肢 B。每个肌群每周约 12–16 组。改成四练后，有氧移到休息日，或接在重量训练后面做。

上肢 A	
卧推	4 × 6–10
引体向上	4 × 6–10
站姿肩推	3 × 6–10
俯身划船	3 × 8–12
侧平举 + 弯举	各 3 × 10–15

下肢 A	
深蹲	4 × 6–10
罗马尼亚硬拉	3 × 6–10
腿弯举	3 × 10–15
提踵	3 × 10–15
悬垂举腿	3 × 8–12

上肢 B	
上斜哑铃卧推	3 × 8–12
高位下拉	3 × 8–12
单臂哑铃划船	3 × 8–12
双杠臂屈伸	3 × 8–12
面拉 + 侧平举	各 3 × 12–15
三头臂屈伸	3 × 10–15

下肢 B	
硬拉或腿举	3 × 6–10
保加利亚分腿蹲	3 × 每边 8–12
臀推	3 × 8–12
单腿罗马尼亚硬拉	2 × 每边 8–10
Pallof 推	2 × 每边 10

没有器材时

部位	动作
推	俯卧撑 → 脚垫高俯卧撑 → 窄距俯卧撑
拉	引体向上；没有单杠就用桌下反向划船、弹力带划船
腿	背包深蹲、分腿蹲、登阶、单腿臀桥
怎么加难度	先加次数 → 下放放慢到 3 秒 → 背包加重 → 换更难的变化

第 5 章

有氧与心肺

每周约 150 分钟中等强度，或 75 分钟高强度，或两者混搭。照强度算，不照活动名称算。

用“能不能说话”判断强度




图 8　说话测试。不用心率表也能判断；有心率表的话，中等强度大约是最大心率的 64–76%，但每个人差异很大。

建议的配法

- **中等强度**：每周 2–3 次，每次 30–60 分钟。
- **高强度**：每周 1 次。例如 4 组“4 分钟用力、3 分钟轻松”，共约 30 分钟。
- **日常步数**：每天 7,000–10,000 步照常走。速度快到“唱不了歌”的快走，可以算进有氧量。
- **心肺底子差**：先用爬坡快走；走得太轻松、心率拉不上来，再换成慢跑。

方式	优点	注意
爬坡快走	冲击最小，最容易达到中等强度	体能好的人可能心率拉不上来
骑车	冲击小，最不影响腿部训练	对骨骼刺激少
慢跑	效率高，有助骨密度	着地冲击约体重 2–3 倍；练腿隔天先避开较好
游泳	几乎零冲击	对骨骼刺激最少
球类、爬山	好玩，容易持续	强度忽高忽低，大概估就好

有氧会不会影响长肌肉?

合理的量不太会。想优先长肌肉的话：同一天先做重量训练、再做有氧；能分开几个小时更好，但不是硬性规定。跑步比骑车更容易影响腿部训练。

第 6 章

爆发力、活动度、平衡

这三项不需要另外排时间，每次花 5–10 分钟，放进热身或重量训练里。

爆发力：每周 2 次，每次 5–10 分钟，放在热身之后

部位	动作	组数
下肢	跳箱、立定跳远	3 组 × 3–5 下
上肢	药球胸前推抛、过顶砸球	3 组 × 5 下
全身	壶铃摆荡；或 20–30 米短冲刺	3 组 × 10 下；冲刺 4–6 趟

- **每一下都全力、干净，累了就停。**这不是有氧，不要做到喘。
- **先学落地：**膝盖对准脚尖、轻声落地。体重较重或膝盖不舒服，先用药球抛掷代替跳跃。
- **冲刺：**先用七八成速度跑，几周后再慢慢加快；腿后侧拉伤过的人，先用动感单车冲刺代替。

活动度：练前动、练后拉

- **练前动态热身（各 30–60 秒）：**髋关节绕圈、世界最伟大拉伸、胸椎旋转、弹力带绕肩。练前不要长时间静态拉伸，会暂时降低力量。
- **练后静态拉伸（各 30–60 秒）：**练到的部位各拉一下，不痛为原则。久坐的人每天挑两个：髋屈肌、胸、胸椎、脚踝。

平衡与核心：放进重量训练

- **单腿动作每周至少 2 个：**保加利亚分腿蹲、单腿罗马尼亚硬拉、登阶。
- **核心每次挑 1 个、做 2–3 组：**Pallof 推、单手农夫行走、平板支撑、死虫式。这些练的是“稳住身体”，比卷腹更能保护腰。
- **生活里顺便练：**刷牙时单腿站 30 秒，熟练后闭眼。


自我检查（每 6–8 周做一次）

测验	合格标准	做不到时
脚跟不离地，蹲到大腿低于水平	能稳稳蹲下、站起	加强脚踝、髋关节活动度
双手伸直举过头	手臂贴近耳朵，腰不拱	加强胸椎旋转、绕肩
单腿站	睁眼轻松撑 30 秒；闭眼约 10 秒（40 岁以下）	多做单腿动作和单腿站
立定跳远	和自己比，维持或进步	保持每周 2 次爆发力练习

第 7 章

一周怎么排

每周约 5–6 小时，就能把六件事都练到。下面是标准三练的范例，顺序可以照自己的行程换。



有氧合计：中等约 105–120 分钟 ＋ 高强度 16 分钟 × 2 ≈ 140–150 分钟。
平日再加几段快走，就轻松超过 150 分钟。每天另外走 7,000–10,000 步。

图 9　每周课表范例。重量训练之间隔一天；高强度有氧不排在练腿隔天。

排课的几个参考

- 同一个肌群，通常隔 48 小时左右再练。只要下次表现没退步，间隔短一点也没关系。
- 跑步、高强度间歇尽量不排在练腿隔天；骑车、快走比较没影响。
- 高强度训练最好在睡前 1–2 小时结束。
- 行程打乱了就顺延，不用硬补。

忙碌周的最低版本

2–3 次全身重量训练（每次 40 分钟，只做主项）＋ 1–2 次 30 分钟有氧。**维持住就是成功。**

第 8 章

饮食

吃够蛋白质，热量配合目标，八成吃天然食物、两成保留弹性。




图 10　每餐的餐盘比例。不想算数字的人，每餐照这样吃就八九不离十。

蛋白质

- **每公斤体重每天 1.6–2.2 克**，多数人吃到 1.6 就够，分 3–4 餐吃。
- **体重过重的人，用“目标体重”来算**，不要用现在的体重。例：目标 70 公斤 → 每天约 110–150 克，每餐 30–40 克。
- 来源：鸡蛋、鸡胸、瘦牛肉、鱼、豆腐、无糖酸奶、牛奶。吃不够再用乳清蛋白补。

热量：先看自己在哪个起点

你的起点	怎么吃	说明
偏瘦、想长肌肉	每天多吃约 5–10%	体重每月增加约 0.5–1 公斤；增加太快多半是脂肪
体重正常、肌肉不多的新手	维持热量	先专心练，体态会自己变好，不必急着减重
体脂偏高	每天少吃 10–20%	每周体重下降 0.5–1%
肥胖或有慢性病	和医生或营养师一起制定	不要自己大幅节食

- **越接近目标，减得越慢：**已经偏瘦、想保住肌肉，每周掉 0.5% 左右就好。例：70 公斤的人每周约 0.35 公斤。
- **长期减脂**可以每 8–12 周回到维持热量 1–2 周，让身体和心情喘口气。
- 脂肪至少占总热量 20%；纤维每天 25–35 克；蔬菜 3 份、水果 2 份。

一天怎么吃（目标体重 70 公斤的例子）

餐次	内容	蛋白质
早餐	鸡蛋 2 颗、无糖酸奶 1 盒、燕麦 1 小碗	约 30 g
午餐	盒饭：一掌鸡腿或鱼、半盘青菜、一拳米饭	约 35 g
点心	牛奶或无糖豆浆 1 杯、水果 1 份	约 10 g
晚餐	一掌瘦肉或豆腐、半盘青菜、一拳红薯	约 35 g
需要时	练后或睡前补一份乳清蛋白	约 25 g
合计	正好落在每天 110–150 g 的范围	**约 135 g**

弹性规则

- **八成天然食物，两成喜欢的食物。**不需要完全戒糖，添加糖控制在每天总热量 10% 以内。
- **聚餐、节日事先算进整周**，吃完隔天照常吃，不用饿肚子补偿。
- **酒少喝：**热量高，又会影响睡眠和恢复。

补充品

名称	用法	说明
肌酸	每天 3–5 克	证据最充分的补充品，任何时间吃都可以
乳清蛋白	蛋白质不够时补	本质就是食物，方便而已
咖啡因	睡前 8 小时以前	能提升训练表现，但太晚喝会影响睡眠
维生素 D	先抽血检查	日照少的人比较容易不足

第 9 章

睡眠与恢复

训练只是刺激，进步发生在休息的时候。恢复跟不上，练越多反而越退步。

睡眠：每晚 7–9 小时

睡不够时，力量、长肌肉的效率、食欲控制会一起变差，减脂时掉的肌肉也更多。

作息

- 起床时间每天相差不超过 1 小时，周末也一样
- 睡前 30–60 分钟放下手机，至少调暗
- 高强度训练最好在睡前 1–2 小时结束

环境与饮品

- 房间暗、安静、偏凉（约 18–22°C）
- 咖啡因在睡前 8 小时停
- 酒会打乱深层睡眠，训练期少喝

恢复管理

- **连续几天睡不到 6 小时**：当周降低强度，不要硬撑。
- **工作或生活压力大**：训练量减少 20–30%，维持住就好。压力会叠加，身体分不出是哪一种。
- **减脂期**：热量少吃超过 25% 时，恢复和力量通常会明显下滑。
- **减量周**：约每 6–8 周一次，或觉得累积疲劳时提前（见第 3 章）。

疲劳提醒（不是诊断）

下面出现两项以上，先休息 2–3 天，接着轻松练一周：

- 早上起床的心率比平常明显偏高
- 力量连续两周下滑
- 睡不好、没动力、容易生病

休息后还没改善，或同时出现第 1 章“比体脂数字更重要的信号”，就去看医生。

第 10 章

追踪进度

外形看趋势，能力看测验。不要只盯着体脂一个数字。




图 11　每天的体重会跳来跳去（示意）。单天可能差 1 公斤，多半是水分和食物；看“7 天平均”那条线往哪里走就好。

项目	怎么量	多久一次	看什么
体重	早上起床、上完厕所	每天	看每周平均的变化
腰围	肚脐高度，自然呼气后量	每 2 周	减脂期应该慢慢变小
照片	同光线、同角度，正面、侧面、背面	每 4 周	眼睛看得到的变化
力量	记录每次主项的重量和次数	每次训练	增肌期稳定进步；减脂期维持就好
心肺	同一条路线的心率和速度	每 6–8 周	同样心率下跑得更快
能力	第 6 章的自我检查	每 6–8 周	维持或进步
恢复	早晨心率、睡眠时数	每天	有没有明显异常

什么时候调整计划


数字停滞 **2–3 周**再调整，不要因为一两天的波动就改方向。调整时一次只改一件事（例如每天少吃 150–200 大卡），再观察 2–3 周。

第 11 章

长期维持与心态

达到目标之后的日子，才是这套方法真正的主体。维持比追求容易得多，前提是生活方式本身撑得住。

维持期怎么练



组数可以减到一半甚至三分之一，**但重量不要降**，肌肉和力量大多保得住。

图 12　减组数，不减重量。维持期每周 2–3 次重量训练就够，有氧照常。

维持期怎么吃

- 达标后，热量回到“新体重的维持量”。一次回到位或分几周慢慢加都可以，看 2–4 周的体重趋势再微调。
- 体脂上下 2–3% 是正常的。出差、聚餐、忙碌之后回到原本的节奏就好，不需要补偿。

保留好的部分

“付出就有回报”的感觉、习惯一点点不舒服，这些是训练带来的好东西，值得留着。但不需要用分数或等级来评价自己的身体，那很容易变成焦虑。

心理警示

出现以下情况，代表追求体态已经开始伤害生活，应该放宽标准，必要时找专业人士聊聊：

- 吃了计划外的东西就强烈自责，或用大量运动补偿。
- 因为怕破坏饮食而拒绝聚餐。
- 每天反复照镜子、量体重，数字一变就影响整天心情。

附录

一页速查卡

把这页存在手机里，忘了就看一眼。

目标

- 男性体脂约 10–15%，女性约 20–25%
- 腰围小于身高的一半
- 看趋势，不看单一数字

重量训练

- 每周 3 次（下肢 / 上肢 / 全身）
- 每个肌群每周 2 次、约 10 组
- 每组留 1–3 下；主项 6–10 下，辅助 8–15 下
- 先加次数，再加重量

有氧

- 每周 150 分钟中等强度（高强度 1 分钟算 2 分钟）
- 中等：能说话、唱不了歌
- 每周 1 次间歇，每天 7,000–10,000 步

小剂量三项

- 爆发力：每周 2 次、5–10 分钟，全力、不喘
- 活动度：练前动态热身，练后拉伸
- 平衡：每周 2 个单腿动作，每次 1 个核心

饮食

- 蛋白质 1.6–2.2 g / 公斤（过重用目标体重算）
- 半盘蔬菜、一掌蛋白质、一拳主食
- 减脂每周 0.5–1%，越接近目标越慢
- 八成天然、两成弹性；肌酸每天 3–5 g

睡眠与恢复

- 每晚 7–9 小时，起床时间固定
- 每 6–8 周一次减量周
- 压力大就少练 20–30%

瓶颈

- 先查睡眠和饮食
- 再查动作和休息时间
- 最后才换次数范围或动作
- 停滞 2–3 周再调整

安全

- 肌肉酸：照练
- 关节小不适：减重或换动作
- 尖锐痛、越练越痛：停，看医生
- 忙碌周：做最低版本也算数

参考视频（薄肌理论原版）

- 邵艾伦 Alan《如何练出薄肌？训练、饮食、减脂一次讲透》，7:39 起：youtube.com/watch?v=vQp8G-BHnI8&t=459s
- 邵艾伦 Alan《对话孙宇晨：年轻人如何抓住 AI 时代的机会？》，3:12:05 起：youtube.com/watch?v=0Z-vhBvBmUY&t=11525s

V1.1 · 2026 年 10 月 | 本手册为一般健身指南，不取代医疗建议。

CC BY 4.0 · 转载请标明出处：github.com/enlivatech/sustainable-lean-physique

© 2026 Enliva LLC