薄肌理論 · 可持續版

可持續薄肌手冊

好看、好用、練得久的身體



AZ · 2026 年 10 月版

本手冊是給一般成年人的健身指南，不取代醫療建議。有疾病、舊傷、懷孕或正在服藥，開始前先問醫生。

開始之前

怎麼用這本手冊

這是「薄肌理論」的可持續版。先看懂目標，再挑一套課表照著練。所有數字都是起點，不是規定；照自己的狀況調整。

你想知道	看哪裡
薄肌是什麼、體脂要多少	第 1 章
一週要練哪些東西	第 2 章、第 7 章
重量訓練怎麼練、選哪套課表	第 3 章、第 4 章
有氧要做多少	第 5 章
怎麼吃	第 8 章
沒進步、很累怎麼辦	第 9 章、第 10 章
只想看重點	最後一頁「速查卡」

開始前先確認

- 有心臟病、高血壓、糖尿病、關節舊傷、懷孕，或正在長期服藥：**先問醫生**，尤其是高強度間歇和跳躍。
- 不確定的話，可以先做 PAR-Q+ 運動前自評問卷（網路可免費取得）。
- 很久沒運動：前 2–4 週全部用輕重量、短時間，讓身體先適應。

疼痛紅綠燈

練習時分清楚「累」和「痛」。肌肉痠是正常的，關節痛不是。

綠燈：照常練

肌肉痠、累、喘；練完隔 1–2 天的肌肉痠痛。

黃燈：調整

關節有點不舒服（10 分裡 3 分以下），隔天就消退。**減重量、縮小幅度，或換一個不痛的動作。**

紅燈：停

尖銳的痛、越練越痛、隔天更痛、麻或腫。**停練這個部位，找醫生或物理治療師。**

這本手冊的原則

- 能長期做下去，比短期做到最好重要。
- 看趨勢，不看單一天的數字。
- 忙的時候做少一點也算數，不要因為做不滿就整週放棄。

第 1 章

目標：薄肌是什麼

薄肌 = 足夠的肌肉 + 適中的體脂。我們要的是一副好看、好用、能長期維持的身體，不是某個數字。

方法只有兩個

- **重量訓練**讓肌肉長出來。
- **控制熱量**讓脂肪降下來。

沒有專門練「薄肌」的特殊方法。肌力、心肺和平衡則讓這身肌肉反應快、穩、不容易受傷。

體脂參考




圖 1　體脂的外型參考。這是外型目標，不是健康分界線；每個人能舒服維持的範圍不一樣。

- **常態**：男性約 10–15%，女性約 20–25%。這個範圍多數人吃得飽、練得動、睡得好。
- **短期壓低**：拍照或活動前可以短期降一點，結束後回到常態。這不是必要步驟。
- **體脂機不準**：體脂秤、體脂機的誤差常有好幾個百分點。看**腰圍、照片和長期趨勢**更可靠。

一個更簡單的健康指標

腰圍小於身高的一半。例如身高 170 公分，腰圍最好在 85 公分以下。量法：肚臍高度、自然吐氣後量。

比體脂數字更重要的訊號

出現以下情況，通常代表吃得太少或練得太多，男女都適用：

- 月經變亂或停經、性慾明顯下降
- 一直很累、常生病、反覆受傷
- 訓練表現持續退步

這時先多吃一點、少練一點；持續的話去看醫生。

第 2 章

六件事都要練，但比重不同

肌力、心肺、恢復是三根主柱，給足時間。爆發力、平衡、活動度用最少的量，塞進熱身和課表空檔。



圖 2　三根主柱和三項小劑量。主柱撐起身體，小劑量讓它更穩、更靈活。

要素	為什麼要練	怎麼練	每週最少
肌力	外型、代謝、老了還能自己走動	複合動作，慢慢加重	3 次
心肺	心血管健康、恢復快、活得久	中等強度為主，少量高強度	150 分鐘中等強度，或 75 分鐘高強度
恢復	讓其他五項真正有效	睡眠、減量週、管理壓力	每晚 7–9 小時
爆發力	反應快；40 歲後退化最快	跳、拋、短衝刺	2 次 × 5–10 分鐘
平衡與核心	單腳穩定，少扭傷、少跌倒、少腰痛	單腳動作、抗旋轉	放進重量訓練
活動度	動作做得標準、關節舒服	動態熱身、練後伸展	每次 5–10 分鐘

柔軟度夠用就好，能把動作做標準即可。多拉筋並不能明顯預防受傷，不必花大量時間。

第 3 章

重量訓練：五個原則

記住這五條，換哪套課表都通用。

#	原則	說明
1	**每個肌群每週練 2 次**	比一週只練一次更有效，漏練一天也不會整週落空。
2	**每個肌群每週約 10 組**	新手 6–8 組就有效。熱身組不算。
3	**每組做到「還能再做 1–3 下」**	太輕不算數，每組都做到力竭又太累。見圖 3。
4	**主項 6–10 下，配件 8–15 下**	主項是深蹲、硬舉、臥推、划船這類大動作；配件是側平舉、彎舉這類小動作。
5	**用「雙重漸進法」慢慢加**	先加次數，再加重量。見圖 4。

做完一組，問自己：「還能再做幾下？」



深蹲、硬舉這類大動作不要做到 0。新手很難估準，先保守一點（留 2–3 下），練幾週就會越來越準。

圖 3　每組的用力程度。大部分的組停在「還能再做 1–3 下」。

雙重漸進法

每個動作設一個次數範圍，例如 8–10 下。

1. 重量不變，每次訓練想辦法多做一兩下。
2. 所有組都做到上限（10 下）後，下次加重量，次數回到下限（8 下）重新開始。
3. 每次加多少：上肢 1–2.5 公斤，下肢 2.5–5 公斤。側平舉、彎舉這類小動作加不上重量很正常，多加次數就好。





圖 4　雙重漸進法示例（臥推，8–10 下，3 組）。次數一路往上加，三組都做到 10 下就加重量，次數回到 8 下再往上爬。

每次訓練的流程

1. **動態熱身 5–10 分鐘**（第 6 章）。
2. **爆發力 5–10 分鐘**（有安排的那天）。
3. **主項：**先做 2–3 組由輕到重的熱身組，再做正式組。組間休息 2–3 分鐘。
4. **配件：**組間休息 1–2 分鐘；可以兩個動作輪流做（超級組）來省時間。
5. **練後伸展 5 分鐘**，記錄這次的重量和次數。

卡關怎麼辦



例：8–10 下改成 10–12 下；槓鈴臥推改成啞鈴臥推

兩個例外

- 減脂期：力量能維持住就算成功，不用每次都進步。
- 別太快換動作：換得太頻繁，反而看不出自己有沒有進步。

圖 5　卡關的處理順序。大部分卡關是睡眠或飲食的問題，不是課表的問題。

減量週

大約每 6–8 週安排一次，或在明顯疲勞、關節痠、連續卡關時提前安排：**組數減半，重量不變或略降**，維持一週再恢復。

第 4 章

選一套課表

大多數人每週練三次就夠，重點是每個肌群練到兩次、每週約 10 組，而且能長期做下去。

A　新手全身

每週 3 次 · 每次 45–60 分鐘

- 練不到半年
- 還不會深蹲、硬舉
- 先練 8–12 週

B　標準三練（主力）

每週 3 次 · 每次 60–75 分鐘

- 動作已經熟練
- 大多數人練好幾年都夠
- 本手冊的週課表用這套

C　進階四練

每週 4 次 · 每次 60–75 分鐘

- 認真練 1–2 年以上
- 飲食睡眠都做到，仍卡 2 個月
- 每週真的有 4 天空

圖 6　三套課表怎麼選。由左往右升級；忙的時候可以退回去。

A　新手全身（第 1–12 週）

A、B 兩天輪流，每週 3 次：第一週 A-B-A，第二週 B-A-B。重量選「做完還能再做 3 下」的輕重量，專心把動作練標準。

A 日	約 13 組
高腳杯深蹲	3 × 8–12
啞鈴臥推	3 × 8–12
滑輪下拉	3 × 8–12
啞鈴羅馬尼亞硬舉	2 × 8–12
棒式	2 × 20–40 秒

B 日	約 13 組
腿推或分腿蹲	3 × 8–12
坐姿划船	3 × 8–12
啞鈴肩推	3 × 8–12
臀推	2 × 10–15
死蟲	2 × 每邊 8

B　標準三練：下肢 / 上肢 / 全身

週一、週三、週五（或任何不連續的三天）。主項 6–10 下，配件 8–15 下。

週一　下肢	15 組 · 約 70 分鐘（含跳箱）
深蹲	4 × 6–10
羅馬尼亞硬舉	3 × 6–10
保加利亞分腿蹲（兼練平衡）	3 × 每邊 8–12
腿彎舉	3 × 10–15
Pallof 推（抗旋轉核心）	2 × 每邊 10

週三　上肢	23 組 · 約 75 分鐘（含藥球）
臥推	4 × 6–10
引體向上（做不到 6 下就用滑輪下拉）	4 × 6–10
站姿肩推	3 × 6–10
俯身划船	3 × 8–12
雙槓撐體（做不到就用窄握伏地挺身）	3 × 8–12
側平舉 + 二頭彎舉（超級組）	各 3 × 10–15

週五　全身	20 組 · 約 70 分鐘
上斜啞鈴臥推	3 × 8–12
前蹲舉或腿推	3 × 8–12
臀推	3 × 8–12
單臂啞鈴划船	3 × 8–12
單腳羅馬尼亞硬舉（兼練平衡）	2 × 每邊 8–10
面拉 + 側平舉（超級組）	各 3 × 12–15




圖 7　標準三練每週的直接組數。每個主要肌群都練到兩天、約 10 組。胸想多練，週五加 2 組飛鳥即可。

C　進階四練：上肢 / 下肢 × 2

週一上肢 A、週二下肢 A、週四上肢 B、週五下肢 B。每個肌群每週約 12–16 組。改成四練後，有氧移到休息日，或接在重量訓練後面做。

上肢 A	
臥推	4 × 6–10
引體向上	4 × 6–10
站姿肩推	3 × 6–10
俯身划船	3 × 8–12
側平舉 + 彎舉	各 3 × 10–15

下肢 A	
深蹲	4 × 6–10
羅馬尼亞硬舉	3 × 6–10
腿彎舉	3 × 10–15
提踵	3 × 10–15
懸垂舉腿	3 × 8–12

上肢 B	
上斜啞鈴臥推	3 × 8–12
滑輪下拉	3 × 8–12
單臂啞鈴划船	3 × 8–12
雙槓撐體	3 × 8–12
面拉 + 側平舉	各 3 × 12–15
三頭伸展	3 × 10–15

下肢 B	
硬舉或腿推	3 × 6–10
保加利亞分腿蹲	3 × 每邊 8–12
臀推	3 × 8–12
單腳羅馬尼亞硬舉	2 × 每邊 8–10
Pallof 推	2 × 每邊 10

沒有器材時

部位	動作
推	伏地挺身 → 腳墊高伏地挺身 → 窄握伏地挺身
拉	引體向上；沒有單槓就用桌下反向划船、彈力帶划船
腿	背包深蹲、分腿蹲、登階、單腳臀橋
怎麼加難度	先加次數 → 下放放慢到 3 秒 → 背包加重 → 換更難的變化

第 5 章

有氧與心肺

每週約 150 分鐘中等強度，或 75 分鐘高強度，或兩者混搭。照強度算，不照活動名稱算。

用「能不能說話」判斷強度




圖 8　說話測試。不用心率錶也能判斷；有心率錶的話，中等強度大約是最大心率的 64–76%，但每個人差異很大。

建議的配法

- **中等強度**：每週 2–3 次，每次 30–60 分鐘。
- **高強度**：每週 1 次。例如 4 組「4 分鐘用力、3 分鐘輕鬆」，共約 30 分鐘。
- **日常步數**：每天 7,000–10,000 步照常走。速度快到「唱不了歌」的快走，可以算進有氧量。
- **心肺底子差**：先用爬坡快走；走得太輕鬆、心跳拉不上來，再換成慢跑。

方式	優點	注意
爬坡快走	衝擊最小，最容易達到中等強度	體能好的人可能心跳拉不上來
騎車	衝擊小，最不影響腿部訓練	對骨骼刺激少
慢跑	效率高，有助骨密度	著地衝擊約體重 2–3 倍；練腿隔天先避開較好
游泳	幾乎零衝擊	對骨骼刺激最少
球類、爬山	好玩，容易持續	強度忽高忽低，大概估就好

有氧會不會影響長肌肉？

合理的量不太會。想優先長肌肉的話：同一天先做重量訓練、再做有氧；能分開幾個小時更好，但不是硬性規定。跑步比騎車更容易影響腿部訓練。

第 6 章

爆發力、活動度、平衡

這三項不需要另外排時間，每次花 5–10 分鐘，放進熱身或重量訓練裡。

爆發力：每週 2 次，每次 5–10 分鐘，放在熱身之後

部位	動作	組數
下肢	跳箱、立定跳遠	3 組 × 3–5 下
上肢	藥球胸前推拋、過頭砸球	3 組 × 5 下
全身	壺鈴擺盪；或 20–30 公尺短衝刺	3 組 × 10 下；衝刺 4–6 趟

- **每一下都全力、乾淨，累了就停。**這不是有氧，不要做到喘。
- **先學落地：**膝蓋對準腳尖、輕聲落地。體重較重或膝蓋不舒服，先用藥球拋擲代替跳躍。
- **衝刺：**先用七八成速度跑，幾週後再慢慢加快；腿後側拉傷過的人，先用飛輪衝刺代替。

活動度：練前動、練後拉

- **練前動態熱身（各 30–60 秒）：**髖關節繞圈、世界最偉大伸展、胸椎旋轉、彈力帶繞肩。練前不要長時間靜態伸展，會暫時降低力量。
- **練後靜態伸展（各 30–60 秒）：**練到的部位各拉一下，不痛為原則。久坐的人每天挑兩個：髖屈肌、胸、胸椎、腳踝。

平衡與核心：放進重量訓練

- **單腳動作每週至少 2 個：**保加利亞分腿蹲、單腳羅馬尼亞硬舉、登階。
- **核心每次挑 1 個、做 2–3 組：**Pallof 推、單手農夫走路、棒式、死蟲。這些練的是「穩住身體」，比捲腹更能保護腰。
- **生活裡順便練：**刷牙時單腳站 30 秒，熟練後閉眼。


自我檢查（每 6–8 週做一次）

測驗	合格標準	做不到時
腳跟不離地，蹲到大腿低於水平	能穩穩蹲下、站起	加強腳踝、髖關節活動度
雙手伸直舉過頭	手臂貼近耳朵，腰不拱	加強胸椎旋轉、繞肩
單腳站	睜眼輕鬆撐 30 秒；閉眼約 10 秒（40 歲以下）	多做單腳動作和單腳站
立定跳遠	和自己比，維持或進步	保持每週 2 次爆發力練習

第 7 章

一週怎麼排

每週約 5–6 小時，就能把六件事都練到。下面是標準三練的範例，順序可以照自己的行程換。



有氧合計：中等約 105–120 分鐘 + 高強度 16 分鐘 × 2 ≈ 140–150 分鐘。
平日再加幾段快走，就輕鬆超過 150 分鐘。每天另外走 7,000–10,000 步。

圖 9　每週課表範例。重量訓練之間隔一天；高強度有氧不排在練腿隔天。

排課的幾個參考

- 同一個肌群，通常隔 48 小時左右再練。只要下次表現沒退步，間隔短一點也沒關係。
- 跑步、高強度間歇盡量不排在練腿隔天；騎車、快走比較沒影響。
- 高強度訓練最好在睡前 1–2 小時結束。
- 行程打亂了就順延，不用硬補。

忙碌週的最低版本

2–3 次全身重量訓練（每次 40 分鐘，只做主項）+ 1–2 次 30 分鐘有氧。**維持住就是成功。**

第 8 章

飲食

吃夠蛋白質，熱量配合目標，八成吃原型食物、兩成保留彈性。




圖 10　每餐的餐盤比例。不想算數字的人，每餐照這樣吃就八九不離十。

蛋白質

- **每公斤體重每天 1.6–2.2 公克**，多數人吃到 1.6 就夠，分 3–4 餐吃。
- **體重過重的人，用「目標體重」來算**，不要用現在的體重。例：目標 70 公斤 → 每天約 110–150 公克，每餐 30–40 公克。
- 來源：雞蛋、雞胸、瘦牛肉、魚、豆腐、無糖優格、牛奶。吃不夠再用乳清蛋白補。

熱量：先看自己在哪個起點

你的起點	怎麼吃	說明
偏瘦、想長肌肉	每天多吃約 5–10%	體重每月增加約 0.5–1 公斤；增加太快多半是脂肪
體重正常、肌肉不多的新手	維持熱量	先專心練，體態會自己變好，不必急著減重
體脂偏高	每天少吃 10–20%	每週體重下降 0.5–1%
肥胖或有慢性病	和醫生或營養師一起訂	不要自己大幅節食

- **越接近目標，減得越慢：**已經偏瘦、想保住肌肉，每週掉 0.5% 左右就好。例：70 公斤的人每週約 0.35 公斤。
- **長期減脂**可以每 8–12 週回到維持熱量 1–2 週，讓身體和心情喘口氣。
- 脂肪至少佔總熱量 20%；纖維每天 25–35 公克；蔬菜 3 份、水果 2 份。

一天怎麼吃（目標體重 70 公斤的例子）

餐次	內容	蛋白質
早餐	雞蛋 2 顆、無糖優格 1 盒、燕麥 1 小碗	約 30 g
午餐	便當：一掌雞腿或魚、半盤青菜、一拳白飯	約 35 g
點心	牛奶或無糖豆漿 1 杯、水果 1 份	約 10 g
晚餐	一掌瘦肉或豆腐、半盤青菜、一拳地瓜	約 35 g
需要時	練後或睡前補一份乳清蛋白	約 25 g
合計	正好落在每天 110–150 g 的範圍	**約 135 g**

彈性規則

- **八成原型食物，兩成喜歡的食物。**不需要完全戒糖，添加糖控制在每天總熱量 10% 以內。
- **聚餐、節日事先算進整週**，吃完隔天照常吃，不用餓肚子補償。
- **酒少喝：**熱量高，又會影響睡眠和恢復。

補充品

品項	用法	說明
肌酸	每天 3–5 公克	證據最充分的補充品，任何時間吃都可以
乳清蛋白	蛋白質不夠時補	本質就是食物，方便而已
咖啡因	睡前 8 小時以前	能提升訓練表現，但太晚喝會影響睡眠
維生素 D	先抽血檢查	日照少的人比較容易不足

第 9 章

睡眠與恢復

訓練只是刺激，進步發生在休息的時候。恢復跟不上，練越多反而越退步。

睡眠：每晚 7–9 小時

睡不夠時，力量、長肌肉的效率、食慾控制會一起變差，減脂時掉的肌肉也更多。

作息

- 起床時間每天相差不超過 1 小時，週末也一樣
- 睡前 30–60 分鐘放下手機，至少調暗
- 高強度訓練最好在睡前 1–2 小時結束

環境與飲品

- 房間暗、安靜、偏涼（約 18–22°C）
- 咖啡因在睡前 8 小時停
- 酒會打亂深層睡眠，訓練期少喝

恢復管理

- **連續幾天睡不到 6 小時：**當週降低強度，不要硬撐。
- **工作或生活壓力大：**訓練量減少 20–30%，維持住就好。壓力會疊加，身體分不出是哪一種。
- **減脂期：**熱量少吃超過 25% 時，恢復和力量通常會明顯下滑。
- **減量週：**約每 6–8 週一次，或覺得累積疲勞時提前（見第 3 章）。

疲勞提醒（不是診斷）

下面出現兩項以上，先休息 2–3 天，接著輕鬆練一週：

- 早上起床的心跳比平常明顯偏高
- 力量連續兩週下滑
- 睡不好、沒動力、容易生病

休息後還沒改善，或同時出現第 1 章「比體脂數字更重要的訊號」，就去看醫生。

第 10 章

追蹤進度

外型看趨勢，能力看測驗。不要只盯著體脂一個數字。




圖 11　每天的體重會跳來跳去（示意）。單天可能差 1 公斤，多半是水分和食物；看「7 天平均」那條線往哪裡走就好。

項目	怎麼量	多久一次	看什麼
體重	早上起床、上完廁所	每天	看每週平均的變化
腰圍	肚臍高度，自然吐氣後量	每 2 週	減脂期應該慢慢變小
照片	同光線、同角度，正面、側面、背面	每 4 週	眼睛看得到的變化
力量	記錄每次主項的重量和次數	每次訓練	增肌期穩定進步；減脂期維持就好
心肺	同一條路線的心跳和速度	每 6–8 週	同樣心跳下跑得更快
能力	第 6 章的自我檢查	每 6–8 週	維持或進步
恢復	早晨心跳、睡眠時數	每天	有沒有明顯異常

什麼時候調整計畫


數字停滯 **2–3 週**再調整，不要因為一兩天的波動就改方向。調整時一次只改一件事（例如每天少吃 150–200 大卡），再觀察 2–3 週。

第 11 章

長期維持與心態

達到目標之後的日子，才是這套方法真正的主體。維持比追求容易得多，前提是生活方式本身撐得住。

維持期怎麼練



組數可以減到一半甚至三分之一，**但重量不要降**，肌肉和力量大多保得住。

圖 12　減組數，不減重量。維持期每週 2–3 次重量訓練就夠，有氧照常。

維持期怎麼吃

- 達標後，熱量回到「新體重的維持量」。一次回到位或分幾週慢慢加都可以，看 2–4 週的體重趨勢再微調。
- 體脂上下 2–3% 是正常的。出差、聚餐、忙碌之後回到原本的節奏就好，不需要補償。

保留好的部分

「付出就有回報」的感覺、習慣一點點不舒服，這些是訓練帶來的好東西，值得留著。但不需要用分數或等級來評價自己的身體，那很容易變成焦慮。

心理警訊

出現以下情況，代表追求體態已經開始傷害生活，應該放寬標準，必要時找專業人士聊聊：

- 吃了計畫外的東西就強烈自責，或用大量運動補償。
- 因為怕破壞飲食而拒絕聚餐。
- 每天反覆照鏡子、量體重，數字一變就影響整天心情。

附錄

一頁速查卡

把這頁存在手機裡，忘了就看一眼。

目標

- 男性體脂約 10–15%，女性約 20–25%
- 腰圍小於身高的一半
- 看趨勢，不看單一數字

重量訓練

- 每週 3 次（下肢 / 上肢 / 全身）
- 每個肌群每週 2 次、約 10 組
- 每組留 1–3 下；主項 6–10 下，配件 8–15 下
- 先加次數，再加重量

有氧

- 每週 150 分鐘中等強度（高強度 1 分鐘算 2 分鐘）
- 中等：能說話、唱不了歌
- 每週 1 次間歇，每天 7,000–10,000 步

小劑量三項

- 爆發力：每週 2 次、5–10 分鐘，全力、不喘
- 活動度：練前動態熱身，練後伸展
- 平衡：每週 2 個單腳動作，每次 1 個核心

飲食

- 蛋白質 1.6–2.2 g / 公斤（過重用目標體重算）
- 半盤蔬菜、一掌蛋白質、一拳主食
- 減脂每週 0.5–1%，越接近目標越慢
- 八成原型、兩成彈性；肌酸每天 3–5 g

睡眠與恢復

- 每晚 7–9 小時，起床時間固定
- 每 6–8 週一次減量週
- 壓力大就少練 20–30%

卡關

- 先查睡眠和飲食
- 再查動作和休息時間
- 最後才換次數範圍或動作
- 停滯 2–3 週再調整

安全

- 肌肉痠：照練
- 關節小不適：減重或換動作
- 尖銳痛、越練越痛：停，看醫生
- 忙碌週：做最低版本也算數

AZ · 2026 年 10 月版 | 本手冊為一般健身指南，不取代醫療建議。