

**Questão 1** Diretrizes do rastreamento mamográfico

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o rastreamento do câncer de mama organizado por mamografia de rotina (em que se convida formalmente as mulheres na faixa etária alvo para os exames periódicos), além de garantir controle de qualidade, seguimento oportuno e monitoramento em todas as etapas do processo, apresenta melhores resultados e menores custos que o rastreamento oportunístico.

Considerando as informações apresentadas, para qual faixa etária e em que periodicidade, respectivamente, o INCA recomenda o rastreamento do câncer de mama organizado por mamografia de rotina?

- ☐ A 45 aos 69 anos de idade; anualmente.
- ☐ B 50 aos 79 anos de idade; anualmente.
- ☐ C 40 aos 69 anos de idade; a cada 2 anos.
- ☐ D 50 aos 69 anos de idade; a cada 2 anos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176589](#)

**Questão 2** BIRADS

A partir da mamografia de rastreamento de uma paciente de 57 anos, mostraram-se achados provavelmente benignos, com classificação BI-RADS 3. Assinale a alternativa correta, acerca da conduta a ser tomada.

- ☐ A Manter rotina de rastreamento
- ☐ B Repetir a mamografia em 1 ano
- ☐ C Biópsia mamária
- ☐ D Controle radiológico por três anos (semestral no primeiro ano e anual nos segundo e terceiro anos)
- ☐ E Punção aspirativa de mama por agulha fina

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176467](#)

**Questão 3** Fatores de risco Ressonância magnética Diretrizes do rastreamento mamográfico

Uma paciente de 53 anos de idade comparece ao ambulatório de Clínica Médica onde faz acompanhamento regular de suas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTS — hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade). Durante a consulta de seguimento, a paciente manifesta preocupação com um "caroço" que detectou há cerca de 1 mês em sua mama esquerda. Ela nega emagrecimento, dor local ou descarga mamilar. Além das medicações que faz uso em razão de suas DCNTs, a paciente vem em uso de terapia de reposição hormonal (TRH) desde que entrou na menopausa, há 12 anos. Ela tem 5 filhos, tendo sua menarca ocorrida de forma tardia (aos 15 anos). A paciente não fuma, nem consome álcool. Ao exame físico dirigido à queixa atual, o médico detecta a presença de lesão nodular de cerca de 2,5 cm, endurecida, não aderida a planos profundos e sem alterações cutâneas adjacentes, localizada no quadrante superior externo da mama esquerda; não são detectadas linfonodomegalias axilares ou supraclaviculares ipsilaterais.

Considerando a hipótese diagnóstica principal de neoplasia maligna de mama, seus fatores de risco relacionados e sua rotina de investigação diagnóstica, assinale a alternativa correta.

- A O histórico de menarca tardia, menopausa precoce e gestações múltiplas são fatores de risco reconhecidos.
- B Diferentemente da terapia de contracepção conjugada (estrógeno e progestágeno), a TRH não é fator de risco para a doença.
- C Na idade da paciente, a realização de ressonância magnética local não aumenta a especificidade das informações obtidas com a mamografia.
- D A chance de a paciente apresentar mutação hereditária no gene BRCA1 é alta, particularmente se seu tumor coexpressar receptores de estrogênio, progestágeno e HER2.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153218](#)

**Questão 4** Exames complementares Rastreamento mamográfico Quadro clínico

Paciente de 52 anos, menopausada, relata nódulo em mama esquerda de crescimento rápido. Sobre a investigação diagnóstica deste caso, é CORRETO afirmar:

- A O auto exame das mamas é o método de rastreamento mais eficaz para o diagnóstico de câncer de mama.
- B A mamografia de rastreamento é o método mais indicado para o diagnóstico de câncer de mama.
- C A mamografia com laudo BIRADS categoria 3 descarta a realização de biópsia do nódulo.
- D A indicação de tratamento para câncer de mama prescinde da realização de biópsia do nódulo.
- E O exame histopatológico é o padrão ouro para o diagnóstico de câncer de mama.

4000146936

**Questão 5** Biópsias da mama BIRADS

Mulher de 52 anos foi submetida à mamografia para rastreamento do câncer de mama. Exame mostrou microcalcificações pleomórficas agrupadas em quadrante inferior interno da mama direita, categoria 5 BIRADS. Ultrassonografia das mamas categoria BIRADS 1. Qual o próximo passo da investigação diagnóstica?

- A Core biópsia.
- B Mamotomia.
- C Punção por agulha fina.
- D Repetir ultrassonografia e mamografia em 6 meses.
- E Ressonância magnética das mamas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146761](#)

**Questão 6** BIRADS

Uma mulher de 40 anos fez uma mamografia solicitada pelo seu ginecologista, e, no laudo, veio uma classificação chamada de BI-RADS. Baseando-se nessa classificação, assinale a alternativa correta.

- A BI-RADS 1 corresponde a achados benignos, e o exame pode ser repetido em dois anos.
- B BI-RADS 2 corresponde a achados benignos, e o exame pode ser repetido em sua periodicidade habitual.
- C BI-RADS 0 indica que não foi encontrada nenhuma alteração na mama e sua repetição depende da clínica e da idade da mulher.
- D BI-RADS 3 indica que o VPP (valor preditivo positivo é alto, e um atraso no diagnóstico poderia trazer grandes prejuízo, devendo-se repetir em no máximo 6 meses.
- E BI-RADS 4 indica casos em que o VPP (valor preditivo positivo é de 90%, impondo-se, portanto, biópsia sistemática.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146442](#)

### Questão 7 Rastreamento mamográfico

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde/INCA para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, pode-se afirmar que

- A alterações no formato do mamilo e retração de pele devem ser acompanhadas por ultrassonografia mamária.
- B a mamografia é o exame de rastreio do câncer de mama e deve ser realizada anualmente entre 45 e 65 anos, no intuito de identificar a doença em fase assintomática.
- C nódulos mamários em mulheres acima de 50 anos devem ser referenciados para serviço de diagnóstico.
- D os métodos existentes para a detecção precoce do câncer de mama reduzem a incidência e a mortalidade pela doença.
- E a ultrassonografia é utilizada na diferenciação de cistos e nódulos sólidos na mama, na avaliação de nódulos palpáveis e é considerada método de rastreio para detecção precoce de câncer de mama em qualquer faixa etária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145699](#)

### Questão 8 BIRADS

Paciente de 61 anos, sem queixas ginecológicas, comparece à Unidade Básica de Saúde para trazer resultado da mamografia realizada em agosto de 2020 e que pode ser vista abaixo. No exame clínico das mamas não havia nódulos palpáveis. Menopausa aos 52 anos, G4P3A 1 e nega uso de terapia hormonal. Qual a conduta MAIS ADEQUADA para essa paciente após avaliar a mamografia?




- A Encaminhar para realização de biópsia e estudo histopatológico da mama direita
- B Encaminhar para punção aspirativa por agulha fina na mama esquerda
- C Solicitar ampliação de imagem da mama esquerda devido à calcificação presente
- D Solicitar ultrassonografia das mamas e axilas para complementar a propedêutica

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145497](#)

#### Questão 9 BIRADS

Mulher de 51 anos, nulípara, menopausa há 1 ano, retorna à consulta na unidade básica de saúde para checar mamografia de rastreamento. Tem como antecedente uma tia avó com história de câncer de mama e fez uso de contraceptivo hormonal combinado por 20 anos. Há um ano retirou o sistema intrauterino de levonorgestrel que vinha usando como método contraceptivo nos últimos 5 anos. Não apresenta alteração detectável no exame físico. O laudo da mamografia vem descrito como B1-RADS® 3 e apresenta a imagem abaixo. Considerando a história clínica e a imagem, assinale a alternativa que contenha a conduta mais adequada, segundo orientações do Ministério da Saúde.



Mamografia no tempo zero, 6 e 12 meses

- A Manter seguimento rotineiro com mamografia anual.
- B Solicitar ultrassonografia mamária complementar.
- C Encaminhar para realização de análise histopatológica.
- D Realizar nova mamografia em seis meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144258](#)

#### Questão 10 BIRADS

Os exames de mamografia recebem uma classificação e recomendação de conduta descrito como BI-RADS. No caso da uma mulher de 54 anos, com imagem mamográfica de microcalcificações pleomórficas, ramificadas, na mama esquerda, a classificação e conduta adequadas segundo o BI-RADS é:

- A BI-RADS 0 – necessário estudo adicional para o diagnóstico.
- B BI-RADS 3 – controle semestral.
- C BI-RADS 6 – prosseguir com cirurgia.
- D BI-RADS 1 – rotina habitual.
- E BI-RADS 4 – prosseguir a investigação com histopatologia.

**Questão 11 BIRADS**

Mulher de 52 anos, assintomática no momento e em uso de terapia de reposição hormonal pois anteriormente apresentava fogachos. Comparece ao consultório solicitando esclarecimento sobre sua mamografia, cujo resultado foi BI RADS = 0 (Sistema de dados e relatórios de imagens de mama do American College of Radiology). O esclarecimento correto a se fazer é:

- A a mamografia está normal.
- B foi visibilizada uma lesão benigna.
- C o exame mostra uma suspeita de malignidade.
- D o exame mostra uma lesão provavelmente benigna.
- E o exame foi inconclusivo, necessitando de avaliação adicional.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000143463

**Questão 12 BIRADS**

Paciente de 27 anos de idade, retorna à consulta de rotina com exame ultrassonográfico evidenciando nódulo hipocogênico, ovalado, com limites regulares e bem delimitados, de maior eixo paralelo à pele e sem sombra acústica posterior. Ao exame físico, a lesão é palpável e menor que 2cm, em quadrante superior lateral de mama direita, móvel, com consistência fibroelástica e indolor. Quando questionada de antecedentes mórbidos familiares, refere que avó paterna teve câncer de mama aos 68 anos, e que no momento não gostaria de passar por cirurgia. Neste caso a melhor conduta é:

- A uma vez que a paciente tem alto risco para câncer de mama, a conduta imediata é exérese cirúrgica do nódulo.
- B é possível realizar acompanhamento clínico e ultrassonográfico, haja visto que a principal hipótese diagnóstica é de fibroadenoma.
- C está indicada realização de mamografia, pois se trata de um nódulo suspeito e o método é o melhor para avaliar nódulos.
- D indicar biópsia excisional do nódulo e pesquisa de linfonodos axilares com a finalidade de descartar malignidade de lesão suspeita.
- E em se tratando de um nódulo anecóico, estaria indicada core biopsy para avaliação histológica.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000143449

**Questão 13 BIRADS**

Segundo a classificação de imagem do sistema Birads, a mamografia classe 0 (zero) representa:

- A Necessidade de estudo adicional.
- B Patologia benigna.
- C Mamas normais.
- D Patologia provavelmente benigna.
- E Suspeita de malignidade.

**Questão 14** Biópsias da mama BIRADS

Mulher de 57 anos, do lar, casada, refere presença de nódulo mamário à direita, que percebeu há 4 meses. Menarca aos 15 anos, menopausa aos 50 anos, G4P2, e em uso de terapia hormonal combinada desde a menopausa. Refere que já realizou exame ultrassonográfico de mama, por conta própria. No exame foi visibilizado nódulo microlobulado, de 2.9 x 1.7 cm, em quadrante superolateral de mama direita, sombra acústica posterior. Neste caso, a orientação é

- A substituir a terapia hormonal por isoflavona e fazer novo controle de ultrassonografia com 6 meses.
- B substituir a terapia hormonal por isoflavona e fazer mamografia bilateral.
- C substituir a terapia hormonal por tibolona e fazer mamografia bilateral.
- D suspender a terapia hormonal e fazer biópsia incisional (core biopsy).
- E suspender a terapia hormonal e fazer novo controle de ultrassonografia com 6 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000143329

**Questão 15** Rastreamento mamográfico BIRADS

Mulher de 40 anos relata que sua mãe teve câncer de mama aos 72 anos. Realiza mamografia e procura o médico de família para orientação. O resultado da mamografia foi BI-RADS 1. Quanto à realização e o resultado da mamografia, respectivamente, é correto afirmar que:

- A não seguiu as recomendações do Ministério da Saúde / normal
- B seguiu as recomendações do Ministério da Saúde / inconclusivo
- C seguiu as recomendações do Ministério da Saúde / indeterminado
- D não seguiu as recomendações do Ministério da Saúde / mostra alterações benignas

Essa questão possui comentário do professor no site 4000143255

**Questão 16** BIRADS

Julgue o item.

Atualmente, o BI-RADS atribui sete categorias para os resultados e a interpretação da mamografia. Os achados classificados como BI-RADS 3 em uma mamografia possuem uma probabilidade maior ou igual a 98% de se tratarem de patologias benignas.

- A Certo.
- B Errado.

4000142441

**Questão 17** BIRADS

Paciente 35 anos vai ao ginecologia com laudo mamográfico de Bi rads 0.

Qual o significado deste resultado?

- A Necessária complementação por outro método de imagem.
- B Mama normal seguimento anual.
- C Necessária core biopsy de mama para definir diagnóstico.
- D Alta suspeição para lesão maligna da mama.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142024](#)

#### Questão 18 BIRADS

Paciente do sexo feminino, 50 anos, história familiar positiva para câncer de mama, em terapia hormonal, realizou mamografia, com resultado BI-RADS 0.

A melhor conduta, nessa situação, é

- A não fazer nada.
- B fazer acompanhamento a curtos períodos.
- C complementar a propedêutica.
- D prescrever raloxifeno.
- E realizar core-biopsy.

4000141529

#### Questão 19 Biópsias da mama

Paciente, 53 anos, com massa mamária palpada de 1,5 cm, sem qualquer alteração cutânea associada nem presença de adenopatia, apresentando exames de mamografia e ultrassonografia normais.

Quanto à biópsia do nódulo, no caso apresentado:

- A Sempre deve ser realizada por aspiração por agulha fina, por ser capaz de diferenciar o carcinoma ductal in situ do invasor.
- B Se sugerir câncer, diante de resultado negativo do exame clínico e de imagem, não será necessária a excisão do nódulo para avaliar malignidade.
- C Será dispensada, pois a imagem normal da massa mamária palpável exclui câncer.
- D A abordagem comum é biópsia central por agulha com base na palpação.

4000141385

#### Questão 20 BIRADS

A categoria 3 da classificação BI-RADS® (*Breast Image Reporting and Data System*), desenvolvida pelo American College of Radiology, é definida por:



- A “Anormalidade suspeita”: probabilidade intermediária de câncer, entre 3% e 94%, o que justifica a estratificação das lesões em baixo, intermediário ou alto grau de suspeição.
- B “Achados provavelmente benignos”: apresentam risco de malignidade inferior a 2%.
- C “Incompleta”: necessária avaliação complementar dos achados por outro método de imagem ou por incidências especiais na mamografia.
- D “Achados benignos”: nenhuma característica sugestiva de malignidade.
- E “Altamente sugestivo de malignidade”: a probabilidade de malignidade é superior à 95%, e a indicação é de estudo anatomopatológico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141022](#)

### Questão 21 BIRADS

O termo BI-RADS é uma sistematização internacional para a avaliação mamária, interpretação do exame e confecção dos laudos de exames de imagem especificamente da mama. Uma paciente de 51 anos de idade apresenta laudo mamográfico de assimetria focal à direita, palpável no exame físico mamário.

Considera-se tal achado como BI-RADS de categoria

- A 2.
- B 3.
- C 4.
- D 5.

4000140760

### Questão 22 Rastreamento do câncer de mama Câncer de mama

Assinale a alternativa incorreta em relação ao câncer de mama:

- A A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomenda mamografia anual a partir dos 40 anos de idade e o Instituto Nacional do Câncer recomenda mamografia bianuais a partir dos 50 anos de idade.
- B Na mamografia, as calcificações em pipoca, distrófica são benignas e calcificações amorfas, pleomórficas são malignas.
- C A presença de nódulo palpável, fibroelástico, móvel, com aproximadamente 2cm, em paciente abaixo dos 40 anos não necessita de exames complementares para sua elucidação.
- D A maioria das lesões cancerígenas são únicas, indolores, firmes e imóveis.
- E A ultrassonografia é útil em mulheres abaixo dos 35 anos, naquelas com implantes mamários e com terapia hormonal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000138356](#)

### Questão 23 Diretrizes do rastreamento mamográfico

Uma paciente de 56 anos de idade comparece à consulta com o ginecologista para revisão. Refere realizar exames ginecológicos de rastreamento, conforme orientação do médico clínico geral que a atendia até então. Informa que faz uso de cálcio, vitamina D e sinvastatina, por histórico de osteoporose identificada em densitometria óssea (DMO) prévia, e



dislipidemia. Recentemente recebeu diagnóstico de nefrolitíase após crise de dor renal. Relata ser tabagista e etilista desde os 23 anos de idade, e o peso atual dela é 54 kg. Teve dois partos vaginais prévios, menarca aos 12 anos e menopausa aos 38 anos de idade. Nega ter realizado terapia de reposição hormonal.

Considerando esse caso clínico e com base nas recomendações do Ministério da Saúde para exames de rastreamento e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

A paciente deve realizar a mamografia anualmente.

- ☐ A Certo.
- ☐ B Errado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000131157](#)

#### Questão 24 BIRADS

Paciente com 50 anos de idade percebe nódulo em sua mama direita com aproximadamente 2cm, indolor, móvel e bem delimitado, com mamografia mostrando Birads III e a ecografia IV.

Qual a melhor conduta?

- ☐ A Indicar punção biópsia.
- ☐ B Solicitar ressonância magnética e Pet Scan.
- ☐ C Realizar punção aspirativa para citologia oncológica.
- ☐ D Realizar a exérese ampla da lesão para diagnóstico definitivo e tratamento.
- ☐ E Devido às características benignas pela descrição dos exames, aguardar 6 a 12 meses e repetir exame.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129861](#)

#### Questão 25 Rastreamento mamográfico

Em uma consulta médica na atenção primária à saúde, uma mulher de 55 anos relata nunca ter feito mamografia, que não tem antecedentes familiares de câncer de mama e que não tem opinião formada sobre fazer ou não o exame.

Embora haja polêmica na literatura científica sobre o tema, e por causa dela, assinale a conduta mais indicada para o médico:

- ☐ A Mostrar a necessidade urgente da realização do exame.
- ☐ B Mostrar o amplo balanço danos × benefícios favorável aos benefícios desse rastreamento, sugerindo que o realize.
- ☐ C Mostrar o balanço danos × benefícios desfavorável ou duvidoso desse rastreamento sugerindo que não o realize.
- ☐ D Mostrar o balanço danos × benefícios fracamente favorável desse rastreamento sugerindo que o realize.
- ☐ E Mostrar para ela os danos e benefícios potenciais do rastreamento para que ela decida de forma informada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129814](#)

#### Questão 26 BIRADS

Mulher na menopausa, com 53 anos, realiza uma mamografia de rotina que apresenta um laudo com “microcalcificações

pleomórficas finas agrupadas, lineares e ramificadas, seguindo o trajeto ductal e densidade assimétrica em quadrante superior externo da mama esquerda”. Em sua última mamografia, realizada há dois anos, não apresentava essas alterações.

Utilizando o método BI-RADS™ (Breast Imaging Reporting and Data System), o achado na mamografia dessa paciente é mais compatível com classificação:

- A 0
- B 3
- C 4
- D 5
- E 6

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129742](#)

### Questão 27 Rastreamento mamográfico

Em relação ao rastreamento de câncer de mama na rede pública, o Ministério da Saúde recomenda a realização da mamografia em mulheres com idade

- A entre 40 e 65 anos, anualmente.
- B entre 50 e 65 anos, anualmente.
- C entre 50 e 69 anos, a cada dois anos.
- D acima de 50 anos, a cada dois anos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129656](#)

### Questão 28 BIRADS

Mulher de 30 anos, nuligesta, apresenta nódulo de mama direita, palpável, indolor e que persiste após 1 ciclo menstrual. Relata que uma tia teve câncer de mama aos 60 anos. O ultrassom de mamas evidenciou nódulo sólido de 1,8 cm - BI-RADS-3. Qual seria a melhor conduta, de acordo com as diretrizes de conduta para diagnóstico e terapêutica?

- A** Em mulheres com nódulos palpáveis BI-RADS-3 deve ser indicada exérese da lesão, independentemente dos sintomas.
- B** As lesões BI-RADS 3 podem ter seguimento semestral por até três anos, não sendo indicada a biópsia para esta conduta.
- C** A exérese cirúrgica de lesões mamárias BI-RADS-3 deve ser priorizada aos casos assintomáticos e com história familiar, pois apresentam maior risco para câncer de mama.
- D** Até a terceira década de vida, a maioria dos nódulos sólidos da mama não necessita de investigação; no entanto, quando o nódulo é palpável, recomenda-se mamografia de rastreamento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129566](https://www.4000129566.com.br)

### Questão 29 **BIRADS 3**

Uma mulher com 52 anos de idade, Gesta 3 Para 2 Aborto 1, foi encaminhada ao ambulatório de mastologia para avaliação. A paciente não apresentava queixas mamárias e não possuía história familiar de câncer. Ao exame físico, não foram encontradas alterações na mama direita da paciente e, na mama esquerda, foi identificado espessamento sem nódulos palpáveis. O resultado da mamografia de rotina, realizada recentemente pela paciente, é de BIRADS 3. Diante desse quadro clínico, a conduta indicada é

- A** informar que o resultado do exame é provavelmente benigno e que o acompanhamento pode continuar a ser feito no serviço de atenção primária, com repetição da mamografia em 6 meses.
- B** informar que o resultado do exame é normal e que o atendimento pode continuar a ser feito no serviço de atenção primária, com avaliação clínica anual e repetição da mamografia em 2 anos.
- C** informar que o resultado do exame é inconclusivo e solicitar a realização de ultrassonografia mamária complementar, mantendo o acompanhamento no serviço de atenção secundária.
- D** informar que o resultado do exame é sugestivo de malignidade e indicar biópsia mamária imediata no serviço de atenção secundária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129723](https://www.4000129723.com.br)

### Questão 30 **Diretrizes do rastreamento mamográfico**

Em relação à política de rastreamento do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo.

I - No Brasil, a estratégia preconizada para o rastreamento de câncer de mama é a mamografia a cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos;

II - O autoexame das mamas, que foi muito estimulado no passado, provou ser benéfico para a detecção precoce de tumores e por trazer segurança, e menor número de exames invasivos;

III - O autoexame deve ser orientado para o reconhecimento de lesões, e não recomendado para que a mulher tenha conhecimento de seu próprio corpo;

IV- O exame clínico das mamas não tem benefício bem estabelecido como rastreamento, devendo ser realizado no caso de queixas mamárias, como parte inicial da investigação.

Está CORRETO o que se afirma em:

- A III e IV.
- B II e III.
- C I e IV.
- D I e II.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126540](#)

### Questão 31 BIRADS 2

A avaliação complementar da mama de paciente na faixa etária abaixo do rastreamento mamográfico pode ser feita com a ultrassonografia mamária, que vai apresentar a classificação em BI-RADS US. No achado BI-RADS US Categoria 2, deve-se informar à paciente:

- A Necessita avaliação adicional.
- B Os achados são altamente suspeitos de malignidade.
- C Os achados são provavelmente benignos.
- D Os achados são benignos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126957](#)

### Questão 32 Rastreamento mamográfico Diretrizes para o rastreamento

Uma mulher de 54 anos de idade, sem queixas, vem à consulta para revisão preventiva. Ela refere ter dois filhos e ter amamentado ambos. É tabagista, nega outras doenças e afirma que não faz uso de medicações. Ela se mostra preocupada com neoplasia, pois tem uma prima que teve câncer de colo uterino, mas nega história familiar de câncer de mama. Considerando as evidências científicas de rastreamento de neoplasias, quais exames deverão ser solicitados nesse momento?

- A Ecografia mamária, ecografia transvaginal e radiografia (Rx) de tórax.
- B Mamografia, pesquisa de sangue oculto nas fezes e radiografia (Rx) de tórax.
- C Ecografia mamária, ecografia transvaginal e exame citopatológico de colo uterino.
- D Mamografia, exame citopatológico do colo uterino e pesquisa de sangue oculto nas fezes.

4000126648

### Questão 33 BIRADS 0

Uma mulher de 42 anos de idade realizou auto-exame das mamas e detectou nodulação na mama direita, com aumento da sensibilidade local. Na consulta com o médico foi realizado exame das mamas, que revelou mamas difusamente densas à palpação, sem nódulos palpáveis, descarga papilar ou linfonodomegalia. Foi solicitada mamografia, com o seguinte resultado: mamas densas difusamente, BI-RADS 0 (resultado inconclusivo). Para elucidação diagnóstica, nesse caso, indica-se

- A repetir a mamografia.
- B encaminhar para biópsia.
- C solicitar ultrasonografia mamária.
- D solicitar dosagem de marcadores tumorais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126594](#)

#### Questão 34 Diretrizes do rastreamento mamográfico

Uma mulher, com 34 anos de idade, comparece à consulta em Ambulatório de Mastologia. Está assintomática e sem anormalidades ao exame clínico. Antecedentes familiares, prima diagnosticada com câncer de mama unilateral aos 60 anos de idade. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde para rastreamento do câncer de mama, essa paciente deverá realizar mamografia

- A anual, iniciando a partir dos 35 anos.
- B anual, iniciando a partir dos 40 anos.
- C a cada dois anos, iniciando a partir dos 40 anos.
- D a cada dois anos, iniciando a partir dos 50 anos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127003](#)

#### Questão 35 BIRADS 0

Z. F. C., nuligesta, de 52 anos, retorna à UBS trazendo resultado da mamografia com laudo BI-RADS 0 (zero). Na terminologia BI-RADS (American College of Radiology Breast Imaging Reporting and Data System), a informação que deve ser transmitida à paciente é:

- A Há imagem com suspeita de malignidade.
- B A mamografia é normal.
- C Há imagem com aspecto de lesão benigna.
- D Necessita de avaliação adicional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126735](#)

#### Questão 36 Diretrizes do rastreamento mamográfico Rastreamento nas pacientes de alto risco

Paciente, com 35 anos de idade, nuligesta, procura médico para realizar exames de mama. Relata ter muito medo, pois sua mãe teve câncer de mama bilateral, diagnosticado aos 49 anos. O exame clínico das mamas é normal, bem como o restante do exame físico da paciente. Qual a conduta a ser adotada pelo médico no rastreamento do câncer de mama para esta paciente?

