

**Questão 1** **Oftalmologia** **Queimaduras Químicas Oculares**

Um funcionário da indústria petroquímica sofre acidente de trabalho com vazamento de alcali líquido em seu olho esquerdo. O funcionário é encaminhado para o médico plantonista da empresa referindo dor local intensa e borramento visual. Qual conduta determina melhor impacto no prognóstico dessa lesão?

- A Colírio a base de corticoide e antibiótico.
- B Lavagem exaustiva com soro fisiológico.
- C Encaminhar a uma emergência oftalmológica.
- D Pomada anti-inflamatória e uso de lente isolante.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181346](#)

**Questão 2** **Traumatismos Oculares** **Oftalmologia**

Um paciente com 25 anos de idade, soldador, procurou Unidade de Pronto Atendimento relatando que, durante seu ofício, retirou o protetor facial momentaneamente e foi atingido por "flash" ocasionado pelo equipamento de solda no olho direito. O médico clínico socorrista evidenciou apenas eritema conjuntival. O paciente refere, nesse momento, irritabilidade e "sensação de areia" nos olhos, sem perda da acuidade visual.

Nesse caso, a melhor medida a ser adotada pelo médico socorrista antes de encaminhar o paciente para avaliação especializada é

- A curativo oclusivo e compressivo.
- B oftalmoscopia e retirada de corpo estranho com pinça.
- C aplicação de colírio contendo antimicrobianos e corticoesteroides.
- D irrigação ocular com soro fisiológico a 0,9% em temperatura ambiente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176632](#)

**Questão 3** **Abrasões Corneanas** **Oftalmologia** **Queimaduras Químicas Oculares**

Homem de 30 anos relata a entrada de pó de cal em um olho há cerca de 30 minutos. Apresenta dor ocular, embaçamento da visão e lacrimejamento. Exame físico: hiperemia conjuntival e dificuldade em manter o olho aberto.

A conduta inicial é:

- A aplicação de pomada oftálmica epitelizante e prescrição de colírio com corticoide.
- B irrigação copiosa do olho com solução salina ou solução de Ringer lactato.
- C curativo oclusivo do olho com pomada oftálmica epitelizante.
- D uso de colírio lubrificante.

[4000170100](#)

**Questão 4** Abrasões Corneanas Oftalmologia

Diagnosticada uma abrasão corneana superficial com presença de corpo estranho aderido na área da lesão e não havendo instrumental para retirá-lo, o médico deve proceder inicialmente a:

- ☐ A oclusão da lesão com pomada de corticóide
- ☐ B aplicação de antibiotico tópico
- ☐ C aplicação de ciclopentolato
- ☐ D irrigação da região com soro fisiológico

4000164950

**Questão 5** Queimaduras Químicas Oculares Corpo Estranho Corneano e Conjuntival

Homem, 40 anos de idade, refere acidente com água sanitária atingindo os olhos, quando estava limpando o banheiro de casa há 20 minutos. Exame físico: fácies de dor, edema palpebral e hiperemia conjuntival em ambos os olhos, com grande possibilidade da presença de resíduos de hipoclorito de sódio. Qual a conduta inicial mais adequada?

- ☐ A Encaminhar para avaliação oftalmológica de urgência.
- ☐ B Realizar neutralização do pH básico com ácido fraco.
- ☐ C Realizar lavagem copiosa de ambos os olhos com soro fisiológico 0,9%.
- ☐ D Prescrever lubrificante ocular de 6 em 6h e reavaliação em 7 dias.

4000144738

**Questão 6** Abrasões Corneanas

Criança de 6 anos foi acompanhar o pai no serviço de instalação de cerca na fazenda. Refere que bateu algo no olho esquerdo e sentiu correr uma “água quente”. Exame ocular: não realizado devido ao blefaro-espasmo à esquerda. Até o especialista chegar, a conduta é:

- ☐ A jejum, colírio, pomada de antibiótico, curativo compressivo e estudo da profilaxia antitetânica.
- ☐ B jejum, colírio de antibiótico de hora em hora sem necessidade de curativo e avaliação da profilaxia antitetânica.
- ☐ C dieta livre, pois provavelmente se trata de abrasão corneana superficial.
- ☐ D jejum, curativo oclusivo, repouso e avaliação da profilaxia antitetânica.

4000141619

**Questão 7** Traumatismos Oculares

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às lesões traumáticas do globo ocular.

- A O olho torna-se amolecido devido à diminuição da pressão intraocular e a câmara anterior pode apresentar-se plana e rasa.
- B Se a ruptura ocorreu na face anterior do globo ocular, seu conteúdo pode ser visto sendo eliminado para fora do olho.
- C O principal objetivo no tratamento inicial da ruptura do globo ocular é a proteção do olho lesado para evitar lesões adicionais.
- D Devem ser retirados todos os corpos estranhos, tecidos ou coágulos antes da aplicação do curativo estéril de proteção.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000002419](#)

#### **Questão 8** Queimaduras Químicas Oculares

Com relação às queimaduras químicas do globo ocular, assinale a alternativa INCORRETA.

- A As substâncias alcalinas precipitam as proteínas teciduais, o que resulta na formação de uma barreira natural contra uma penetração tecidual maior.
- B O tratamento inicial consiste em irrigação contínua e abundante. Não deve ser tentada a neutralização do agente químico lesivo.
- C O blefaroespasma costuma ser intenso e as pálpebras devem ser abertas manualmente durante a irrigação.
- D As substâncias alcalinas combinam-se com os lipídeos das membranas celulares, levando à sua destruição e à rápida penetração do agente cáustico, estendendo sua ação destrutiva a outros tecidos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000002358](#)

#### **Questão 9** Ruptura do Globo Ocular e Lesão Ocular Penetrante

Homem, 23a, teve o olho esquerdo atingido por um fragmento de madeira. Ao exame físico, olho esquerdo: ferimento cortante na esclera com evidência de saída de humor aquoso.

A conduta antes da avaliação do especialista é:

- A Curativo protetor, sem compressão sobre o globo ocular.
- B Curativo compressivo e exame radiográfico de crânio.
- C Comprimir as bordas das feridas para rafia.
- D Pinçar o ferimento e curativo compressivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130162](#)

#### **Questão 10** Corpo Estranho Corneano e Conjuntival

Na coordenação do cuidado de situações oftalmológicas na APS, assinale a alternativa correta que o MFC deve referenciar a pessoa ao oftalmologista, após o primeiro atendimento e medidas iniciais.

- A Isadora, 23 anos, babá, com hiperemia conjuntival, fotofobia e lacrimejamento importantes há 4 dias, compatíveis com conjuntivite viral.
- B Antônio, 27 anos, indígena, com artrite assimétrica subaguda, uretrite não-gonocócica e conjuntivite reativa compatíveis com síndrome de Reiter.
- C Patrícia, 15 anos, estudante, com hiperemia conjuntival e secreção mucopurulenta importantes há 3 dias, além da visão turva, compatíveis com conjuntivite bacteriana.
- D José, 52 anos, marceneiro, com corpos estranhos (duas pequenas farpas de madeira) na córnea, desvio da pupila e redução da acuidade visual.
- E Marina, 53 anos, negra, com hemorragia conjuntival em limbo temporal direito, após pico hipertensivo sistêmico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000115826](#)

### Questão 11 Traumatismos Oculares

No pronto-socorro: jovem de 22 anos do sexo feminino dá entrada com dor ocular e derrame intraocular, após trauma contuso. Qual seria a conduta correta até a chegada do especialista? Assinale a CORRETA:

- A Explorar o olho, na tentativa de identificar a lesão.
- B Lavar com soro fisiológico.
- C Iniciar colírio antisséptico.
- D Curativo oclusivo compressivo e analgesia.
- E Iniciar analgesia e encaminhar o paciente para o ambulatório do oftalmologista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000026399](#)

### Questão 12 Fratura Orbitária Cirurgia

Quais paredes da órbita são acometidas com maior frequência nos casos de fraturas isoladas das paredes da órbita?

- A Paredes medial e superior
- B Paredes inferior e medial
- C Paredes superior e inferior
- D Paredes lateral e medial
- E Paredes lateral e superior

4000009387

### Questão 13 Hifema Traumático

Arthur é atendido e internado em hospital de urgência após acidente automobilístico. Entre as diversas especialidades médicas que assistem o paciente devido seu politrauma, qual foi a solicitada para avaliação e conduta de hifema?

- ☐ A Cirurgia buco-maxilo-facial.
- ☐ B Cirurgia torácica.
- ☐ C Infectologia.
- ☐ D Oftalmologia.
- ☐ E Otorrinolaringologia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000018986](#)

#### Questão 14 **Fratura Orbitária**

Quais são as paredes da órbita que são acometidas com maior frequência nos casos de fraturas isoladas de face?

- ☐ A Paredes medial e superior
- ☐ B Paredes superior e inferior
- ☐ C Paredes inferior e medial
- ☐ D Paredes lateral e medial

Essa questão possui comentário do professor no site [4000107937](#)

#### Questão 15 **Abrasões Corneanas**

Diante de um caso de erosão de córnea após trauma com objeto de pequeno tamanho, como, por exemplo, uma lente de contato, assinale a alternativa CORRETA:

- ☐ A A aplicação do corante de fluoresceína está contraindicada, pois dificulta a visualização da área danificada.
- ☐ B O médico clínico deve encaminhar obrigatoriamente o paciente para a avaliação oftalmológica o mais precocemente possível.
- ☐ C Como primeira medida terapêutica, deve-se aplicar colírio anestésico ou colírios de esteroides.
- ☐ D Deve-se encaminhar o paciente ao oftalmologista se o quadro de dor persistir após 48 horas da primeira consulta.
- ☐ E Analgésicos orais são ineficazes para alívio da dor ocular nos casos de erosão corneana, não havendo indicação para seu uso.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099778](#)

#### Questão 16 **Catarata Senil**

A principal causa de cegueira no mundo é:

- ☐ A Glaucoma.
- ☐ B Hipertensão arterial.
- ☐ C Catarata.
- ☐ D Trauma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000076714](#)

**Questão 17**    **Traumatismos Oculares**

Criança de sete anos brincava de jogar béis (VER IMAGEM) com seus colegas em casa quando em um lance, ao passar por trás de seu companheiro que estava para rebater uma bola, sofreu um forte impacto do taco de béis em seu olho esquerdo. No momento do impacto, foi levado ao hospital, onde, no pronto atendimento, o exame físico revelou: hematoma periorbitário esquerdo com edema importante. Movimentos oculares preservados em todas as direções. Amaurose à esquerda. Reflexo pupilar lento à esquerda. O reflexo vermelho estava presente e com brilho característico em olho direito, porém não havia reflexo vermelho em olho esquerdo. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao quadro clínico em questão:



- A Os sinais observados são de um trauma ocular contuso com provável descolamento de retina, uma consequência comum nesse tipo de trauma.
- B Os sinais observados evidenciam um trauma ocular explosivo com fratura orbitária em "blow out", clássica de traumas oculares.
- C A ruptura total do nervo óptico é a causa mais comum de amaurose pelo quadro clínico descrito.
- D O olho se comporta como uma víscera maciça no trauma ocular contuso.
- E O tipo de trauma ocular penetrante descrito impõe como tratamento de primeira linha intervenção cirúrgica imediata para evitar perda de tecido intraocular e consequente perda irreversível da visão do olho afetado.

4000052148

**Questão 18**    **Hifema Traumático**

Hifema:

- A Pus no vítreo.
- B Hemorragia da câmara anterior.
- C Pus na câmara posterior.
- D Hemorragia do vítreo.
- E Pus na câmara anterior.

4000017966

**Questão 19** Ruptura do Globo Ocular e Lesão Ocular Penetrante

NÃO é sinal sugestivo de ferimento perfurante ocular:

- ☐ A Hemorragia na câmara anterior.
- ☐ B Hifema.
- ☐ C Pupila piriforme.
- ☐ D Hemorragia de retina.
- ☐ E NDA.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119508](#)

**Questão 20** Fratura Orbitária

Paciente do sexo masculino, atleta de 19 anos, jogava uma partida de tênis no seu clube como de costume. Ao final do primeiro set sofreu um ataque de seu adversário, no qual a bola de tênis atingiu seu olho direito com grande velocidade e alto impacto. Sentiu uma dor muito intensa, começou a enxergar embaçado e em alguns minutos passou a enxergar duplo. Dirigiu-se ao pronto atendimento onde no exame físico constatou-se: edema e hematoma periorbitário à direita, com limitação do olhar para cima e discreto desvio medial de olho direito, com hiperemia conjuntival e proptose. Sobre o tipo de trauma sofrido pelo paciente em questão, assinale a alternativa incorreta:

- ☐ A A turvação visual pode ter sido resultante de sangramento na câmara anterior, também chamado de hifema, secundário ao trauma.
- ☐ B Descolamento de retina e coróide são possíveis complicações desse tipo de trauma.
- ☐ C Como as paredes orbitárias medial e inferior são mais espessas, são as que menos sofrem fraturas nesse tipo de trauma.
- ☐ D Fratura por explosão pode ser uma consequência dessa contusão.
- ☐ E A diplopia tem como uma das causas a exoftalmia, que nesse caso poderia ser uma consequência de sangramento intraorbitário.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000047073](#)

**Questão 21** Queimaduras Químicas Oculares

A conduta imediata na queimadura química por álcali na região ocular é:

- ☐ A Lavagem ocular copiosa com solução tampão ácida.
- ☐ B Lavagem ocular copiosa com Ringer lactato e lidocaína.
- ☐ C Curativo oclusivo e encaminhamento ao oftalmologista.
- ☐ D Lavagem ocular copiosa com soro fisiológico.
- ☐ E Instilação de colírio anestésico e antibiótico.

4000113369

**Questão 22** Hifema Traumático

ADAPTADA - O que é Hifema:

- A Pus no vítreo.
- B Hemorragia da câmara anterior
- C Pus na câmara posterior.
- D Hemorragia do vítreo.
- E Pus na câmara anterior.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000023474](#)

**Respostas:**

1	B	2	D	3	B	4	D	5	C	6	D	7	D	8	A	9	A	10	D	11	D
12	B	13	D	14	C	15	D	16	C	17	A	18	B	19	D	20	C	21	D	22	B