

Questão 1 **Prevenção Primária**

Considerando os níveis de prevenção, o ato de utilizar máscaras em cenários pandêmicos como o de COVID-19 é um exemplo de qual nível de prevenção?

- ☐ A Quaternária
- ☐ B Terciária
- ☐ C Secundária
- ☐ D Primária

4000164852

Questão 2 **Níveis de Prevenção e outros conceitos associados**

Considere o caso clínico abaixo e os personagens nele ilustrados, para responder.

Após ser aprovado e ingressar no Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, você é direcionado para uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) para ser recebido pelo médico preceptor da Unidade. Em sua primeira participação de reunião de equipe, uma das agentes comunitárias de saúde (ACS) da equipe do médico preceptor traz o relato de uma gestante de sua microárea que não procurou a Unidade de Saúde para começar o pré-natal. A gestante era Vanessa e ela era antiga conhecida da equipe, porque seu finado pai, Seu Odair, fora uma liderança comunitária e era muito querido por todos. Vanessa tinha a primeira consulta de pré-natal agendada para o primeiro horário depois da reunião de equipe. Dr. Marcos Júlio, seu preceptor, relata que Vanessa nunca teve boa relação com os pais e saiu de casa cedo, passando a morar, aos 14 anos, na casa de Ubiratan, seu primeiro parceiro. Após alguns anos morando juntos, Vanessa engravidou e chegou a ser acompanhada pela UAPS no pré-natal, mas teve perda gravídica com aproximadamente 12 semanas de seguimento. Durante esse acompanhamento pré-natal, a equipe ficou ciente de que Vanessa vivia em contexto de violência doméstica, mas continuava vivendo com Ubiratan, porque não aceitava voltar para a casa dos pais. Por volta de seus 24 anos, Vanessa teve episódio de hemiplegia desproporcional em dimídio esquerdo, desvio de rima labial e disartria, enquanto trabalhava em uma casa como diarista. Foi levada à urgência e hospitalizada. Durante hospitalização, confirmou-se um infarto cerebral. A família de Vanessa possui histórico de AVCs em idades precoces: Vanusa apresentou episódio de AVC durante uma de suas gestações e dona Benzarina teria apresentado o primeiro AVC antes da menopausa. Segundo a Assistente Social do hospital em que Vanessa ficou internada por quase dois meses, Ubiratan nunca teria realizado uma visita, mas Edberto, um ex-namorado, foi companhia assídua. Após a alta hospitalar, Vanessa descobriu que Ubiratan estava vivendo com outra mulher e se mudou para casa de Edberto, que a acolheu, a despeito da não-aceitação do pai de Edberto, Seu Eduardo. Depois de seis anos morando juntos, Vanessa engravidou novamente, mas não procurou a UAPS. A ACS fazia visitas domiciliares na mesma rua em que Edberto e Vanessa moram, quando viu Vanessa, já com barriga gravídica, varrendo a calçada. Após breve conversa, a ACS agenda atendimento para Vanessa na UAPS.

(TRECHO DA QUESTÃO ANTERIOR)

"Em sua consulta com Edberto, ele refere que o medo de desenvolver câncer de pulmão é uma das razões que o motiva a parar de fumar. Ele, então, pergunta se você pode solicitar algum exame de rastreio para câncer de pulmão nele. De acordo com recomendações nacionais para o rastreio do câncer de pulmão, assinale a alternativa com a conduta adequada."

A abordagem adequada frente à demanda, ilustrada na questão anterior, de Edberto quanto a exames de rastreio de câncer de pulmão configura que nível de Prevenção?

- ☐ A Primária.
- ☐ B Secundária.
- ☐ C Terciária.
- ☐ D Quaternária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163708](#)

Questão 3 Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS

Considere o texto abaixo para responder à questão.

“As mulheres são atingidas pela violência interpessoal de modo singular, na maioria das vezes, por parceiros íntimos ou familiares, envolvendo agressões físicas, sexuais e também danos psíquicos. [...] [...] Estudos nacionais e internacionais apontam entre os usuais fatores associados à violência por parceiro íntimo o consumo de substâncias psicoativas. [...] Adicionalmente relevante se torna o consumo de medicamentos, realizado especialmente por mulheres, e sua relação com os episódios de violência entre parceiros íntimos, o que pode ser considerado um novo desafio para os profissionais de saúde, [...] devido ao risco de corroborar para uma medicalização excessiva. Na América Latina, [...] o uso de álcool pelo parceiro íntimo se insere entre as demais características apresentadas pelas mulheres agredidas, a saber: coabitação com o parceiro sem casamento formal; muitos filhos; não compartilhamento da tomada de decisão; disparidade no nível de instrução. Assim, o consumo de álcool, especificamente, está incluído entre os riscos para a violência doméstica, principalmente se o padrão de consumo for elevado. [...]”

SILVA, Valéria Nanci. “Violência e uso de substância psicoativas: um estudo com mulheres usuárias de um serviço de Atenção Primária à Saúde de São Paulo / Valéria Nanci Silva. – São Paulo, 2008.

O texto faz referência a que fenômeno observado na saúde pública?

- ☐ A Carga de doença.
- ☐ B Cascata de prescrição.
- ☐ C Determinantes Sociais de Saúde.
- ☐ D Barreiras geográficas da Atenção Primária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163699](#)

Questão 4 Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS

Uma equipe de saúde da família atua em uma unidade básica de saúde situada na zona periférica de uma cidade com mais de 800 000 habitantes. No último mês, foi evidenciado aumento no número de casos de diarreia entre crianças de 2 a 5 anos que frequentam a creche pública de um bairro. A equipe de saúde da família desse local analisa que, no último ano, têm sido recorrentes os casos de diarreia entre crianças da área, inclusive, em alguns casos, com necessidade de internação hospitalar. Dentre os casos, observam que eles se concentram naquelas famílias que não são da área de cobertura da equipe de saúde da família. No bairro onde se localiza a creche, 20% dos domicílios possuem abastecimento de água tratada, 10% com esgoto sanitário, sem coleta regular de lixo nos domicílios, sendo os esgotos e lixos acumulados das casas ou jogados no córrego, a céu aberto, que corta o bairro.

Em relação à situação acima descrita, assinale a alternativa correta em relação ao processo saúde-doença e os determinantes de saúde envolvidos no caso.

- A** O aumento no número de casos de diarreia na creche tem como principal fator a virulência da bactéria e, por se tratar de um caso recorrente, a equipe de saúde da família poderia atuar com medidas medicamentosas profiláticas direcionadas ao agente etiológico.
- B** A educação em saúde na creche, com os profissionais da educação e com a comunidade, teria papel importante na melhoria das condições sanitárias da comunidade; é uma estratégia suficiente para o combate de surtos.
- C** A falta de acesso aos serviços de saúde e de acompanhamento regular com a equipe de saúde da família é um fator associado ao desfecho desfavorável dos casos, com aumento de quadros graves de diarreia com necessidade de internação hospitalar.
- D** A adoção de medidas como uso de hipoclorito na água e de filtros nos bebedores escolares é a principal medida para combate à transmissão dos agentes etiológicos que cursam com quadros de diarreia, diminuindo assim a incidência de casos na creche.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153172](#)

Questão 5 **Prevenção Quaternária**

Homem, 53 anos, comparece à consulta agendada na UBS com sua médica de família para uma consulta de rotina. Além de sobrepeso, sedentarismo e eventual insônia quando exagera na alimentação, não apresenta outras comorbidades. Diz à sua médica que, “às vezes” se sente um pouco triste, mas isso acontece esporadicamente, dura apenas algumas horas e não afeta sua funcionalidade. O paciente solicitou à assistente o uso de medicamento para a depressão, pois sua esposa usa sertralina e “ficou muito bem”. Após uma conversa sobre sua situação de saúde, quando lhe foi explicado que sua “tristeza” não se trata de um quadro patológico, ficou pactuado um plano terapêutico com início de atividade física 3 vezes por semana, exposição regular à luz solar, realização de higiene do sono, redução de carboidratos e redução do peso corporal. Além disso, a médica decidiu não iniciar a medicação solicitada. Em relação ao último item do plano terapêutico, que nível de prevenção está sendo aplicado?

- A** Prevenção primária
- B** Prevenção secundária
- C** Prevenção terciária
- D** Prevenção quaternária
- E** Prevenção de acidente de trabalho

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147789](#)

Questão 6 **Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS**

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) vêm sendo amplamente discutidos no âmbito da relação entre o funcionamento dos sistemas de saúde e a função da sociedade. Em relação a esses determinantes, assinale a correta:

- A A atuação sobre as diversas camadas dos DSS cabe basicamente às instituições de saúde.
- B Os DSS podem ser compreendidos como as condições sociais a que as pessoas são submetidas no viver e trabalhar
- C As condições de trabalho fazem parte do nível distal dos DSS.
- D O modelo envolve essencialmente os condicionantes abstratos, como os relacionamentos sociais (familiares, comunitários e no trabalho) e a qualidade do atendimento em saúde, suprimindo pontos mais concretos, como moradia, esgotamento sanitário e água potável, que são objetos de outras políticas específicas
- E O manejo das iniquidades não é objeto dos DSS, por depender de uma atuação política intersetorial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147532](#)

Questão 7 Modelos Explicativos de Saúde e Doença

O modelo flexneriano foi proposto por Abraham Flexner, que idealizou uma nova forma de ensinar a medicina. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que constituiu corretamente um dos elementos propostos por Flexner em seu documento que ficou conhecido como “Flexner Report”:

- A O social, o coletivo, o público e a comunidade devem ser contemplados no ensino médico, por implicarem no processo de saúde-doença.
- B Deve-se dar ênfase ao atendimento centrado na pessoa e na comunidade.
- C O modelo salienta a importância das Unidades Básicas de Saúde na construção da Atenção Básica, que deve ser a porta de entrada do sistema de saúde.
- D A partir desse modelo, percebe-se que ocorre uma valorização da pesquisa biológica.
- E Antes de pensar em uma suspeita diagnóstica, o médico deve lembrar-se de que o processo saúde-doença parte de uma noção multicausal e social, considerando-se a dimensão social, psicológica e econômica da saúde.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147531](#)

Questão 8 Medicina Preventiva Processo saúdedoença Prevenção em Saúde

A promoção da alimentação saudável é fundamental para a saúde pública, e ações que visem promovê-la devem levar em conta os nutrientes e as especificidades nutricionais de cada faixa etária, sendo diferentes conforme idade, sexo, grau de atividade física e diferentes situações da vida, como a gestação. Nesse contexto, em relação às seguintes orientações essenciais em nutrição, assinale a alternativa correta.

- A** As mulheres que desejam engravidar devem ser aconselhadas a comer alimentos ricos em ferro-heme, como carnes e ovos. Além de consumir alimentos fontes de ferro na forma férrica, associados ao consumo de alimentos fontes de vitamina C, o que reduz a forma férrica à ferrosa e melhora a absorção. O período mais crítico em relação às necessidades nutricionais de ferro é o primeiro trimestre.
- B** Os cuidadores das crianças devem ser orientados a evitar a oferta de alimentos com alta densidade calórica, como bebidas pobres em nutrientes (refrigerantes, sucos artificiais), açúcar, doces em geral, salgadinhos, achocolatados, gelatinas e outras guloseimas antes dos dois anos de vida. O consumo de alimentos ricos em gordura, como frituras, bolachas recheadas, sorvetes e embutidos, embora desaconselhável, não está relacionado ao fato das crianças preferirem esses alimentos em substituição à alimentação básica.
- C** No período da adolescência, há um crescimento rápido e aumento da necessidade energética, porém não nas necessidades de cálcio ou ferro.
- D** Na avaliação do adulto, existem alguns métodos para avaliação da gordura abdominal. A OMS orienta a medida da circunferência abdominal no ponto médio entre o último rebordo costal e a crista ilíaca. A relação cintura/quadril consiste em um bom indicador complementar que tem boa correlação com a gordura abdominal e associação com o risco de morbimortalidade. Considera-se como risco para doenças cardiovasculares valores de relação cintura/quadril > 1 para mulheres e $> 0,85$ para homens.
- E** Existem evidências de que a absorção de certos nutrientes diminui com a idade. No entanto ainda não existem evidências suficientes de que os valores recomendados de nutrientes devam ser diminuídos ou aumentados para idosos. Os pontos de corte de IMC, entretanto, são diferentes para a população idosa, sendo IMC < 22 classificado como baixo peso, de 22 a 27 como eutrófico e > 27 como sobrepeso.

4000147076

Questão 9 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Correlacione as medidas ou ações de saúde e os respectivos níveis de prevenção. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. Medidas ou ações de saúde: 1. Hospitalização em função das necessidades. 2. Terapia ocupacional. 3. Habitação adequada. 4. Fluoretação da água. 5. Exame periódico de saúde. Níveis de prevenção: () Promoção da saúde. () Proteção específica. () Diagnóstico e tratamento precoce. () Limitação do dano. () Reabilitação.

- A** 2 / 4 / 3 / 1 / 5
- B** 3 / 5 / 4 / 1 / 2
- C** 1 / 4 / 3 / 2 / 5
- D** 3 / 4 / 5 / 1 / 2
- E** 4 / 3 / 5 / 2 / 1

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146916](#)

Questão 10 Medicina Preventiva Processo saúde/doença

O pensamento social, desde muito tempo, reivindica a saúde e a doença como objetos próprios e fecundos de estudo. Igualmente, estuda a medicina, os doentes e os profissionais de saúde como parte de suas indagações. Tal empenho fundamenta-se na identificação de que estes são fenômenos constitutivos da dimensão social do indivíduo. Assim, saúde e doença são, nesse sentido, apreendidas por meio da conjugação de fatores:

- A Biológicos, sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, conformando “fenômenos sociais totais”.
- B Biológicos, sociais, políticos, econômicos, culturais, ambientais e religiosos, conformando “fenômenos sociais totais”.
- C Biológicos, sociais, políticos, culturais e ambientais, conformando “fenômenos sociais totais”.
- D Biológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, conformando “fenômenos sociais totais”.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146702](#)

Questão 11 **Processo saúde-doença**

Considerando que os processos de saúde-doença resultam da interação de múltiplos e complexos fatores, as investigações relativas às vulnerabilidades aos adoecimentos devem buscar compreender em que medida as condições socioeconômicas interagem com fatores associados a:

- A Aspectos biológicos e regionais.
- B Aspectos culturais e econômicos.
- C Aspectos biológicos e religiosos.
- D Aspectos culturais e biológicos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146660](#)

Questão 12 **Medicina Preventiva Níveis de Prevenção e outros conceitos associados Prevenção Secundária**

Em 2014 foi assinado um acordo no qual várias prefeituras de municípios de todo o mundo se comprometeram a acelerar a resposta para o fim da epidemia de AIDS, a Declaração de Paris. O acordo estabelece o alcance das metas 90-90-90, o que significava até 2020 ter: - 90% das pessoas vivendo com HIV sabendo que tem o vírus; - 90% das pessoas diagnosticadas com HIV recebendo tratamento; - 90% das pessoas em tratamento com carga viral indetectável. Buscando o alcance das metas, as prefeituras ampliaram o acesso das pessoas ao diagnóstico precoce do HIV por meio de testes rápidos. Tal medida se enquadra em qual nível de prevenção?

- A Prevenção primária
- B Prevenção secundária
- C Prevenção terciária
- D Prevenção quaternária

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146023](#)

Questão 13 **Prevenção Primária**

Sobre promoção da saúde e proteção específica, é correto afirmar:

- A Têm como exemplos educação em saúde e vacinação, respectivamente, e correspondem, ambas, à prevenção primária.
- B Ambas correspondem à prevenção secundária.
- C Praticam-se com próteses e órteses.
- D Praticam-se com educação em saúde e política de emprego e renda.
- E Têm como exemplos adição do flúor à água de consumo e de iodo ao sal de cozinha, respectivamente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000143363

Questão 14 Prevenção Secundária

Pratica-se prevenção secundária, na classificação em três níveis

- A com políticas de habitação e vacinação.
- B com órteses para membros superiores e próteses dentárias.
- C evitando-se iatrogenia.
- D com antibioticoterapia e colecistectomia.
- E com saneamento básico e prevenção de quedas em idosos.

4000143356

Questão 15 Prevenção Quaternária

O médico precisa realizar ações de prevenção no seu cotidiano de trabalho. Em relação as ações desenvolvidas é correto afirmar:

- A Indicar imunização e orientar mudanças de estilo de vida é caracterizado como prevenção terciária.
- B Indicar fisioterapia motora em pacientes com sequela de acidente vascular cerebral é caracterizado como prevenção secundária.
- C Avaliar nos indivíduos o risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, excessivas.
- D indicar exames de rastreamento de câncer de colo de útero é caracterizado como prevenção primária.

4000142973

Questão 16 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

São exemplos de prevenção secundária:

- A alimentação balanceada e realização de atividades físicas.
- B uso de preservativo masculino e vacinação.
- C coleta de exame citopatológico e realização de mamografia.
- D realização de mamografia e manutenção do peso corporal.
- E vacinação e manutenção do peso corporal.

Questão 17 Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS

Criança, 8 anos, com quadro de asma, pode ser apontado como determinante causal proximal da doença:

- A Fator socioeconômico.
- B Fator biológico.
- C Fator hereditário.
- D Evento infeccioso prévio.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141390

Questão 18 Processo saúde/doença

Quanto à qualidade de vida, a Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizando-se de um método transcultural (WHOQOL), afirma que “embora não haja definição consensual de qualidade de vida, há concordância considerável entre os pesquisadores acerca de algumas características do constructo qualidade de vida”.

A alternativa que apresenta CORRETAMENTE as características desse constructo é:

- A Subjetividade, multidimensionalidade e bipolaridade, esta última consubstanciada em dimensões positivas e negativas.
- B Multidimensionalidade, sociabilidade e subjetividade, sendo esta última pura e não total.
- C Multidimensionalidade, sociabilidade e subjetividade, esta última pura e total.
- D Bipolaridade, sociabilidade e multidimensionalidade, incluindo três dimensões: a física, a psicológica e a social.

4000141322

Questão 19 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

O ano de 2020 está sendo marcado principalmente pela pandemia COVID-19, com a atuação de gestores de saúde para tentar diminuir os impactos socioeconômicos e também reduzir o número de infectados e, conseqüentemente, de mortos. Normalmente as orientações iniciais são dadas pela WHO (Organização Mundial de Saúde). Os primeiros movimentos foram baseados em tentar prevenir a contaminação da população.

Sobre os níveis de prevenção, assinale a assertiva correta.

- A Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, usar corretamente máscaras fora de casa e evitar aglomerações são exemplos de ações de prevenção secundária para o “novo coronavírus”.
- B Os pacientes já acometidos pela doença que necessitaram de internação e ficaram com algumas sequelas (temporárias ou permanentes), permanecendo em processo de reabilitação (como fisioterapia), são exemplos de prevenção quaternária.
- C Alguns países tiveram parte da população em uso de medicamentos como antiparasitários (ivermectina, nitazoxanida), “vitaminas” C, D3 como “prevenção”. Trata-se de prevenção terciária.
- D Vários laboratórios ao redor do mundo estão pesquisando vacinas para o “novo coronavírus”. Trata-se de uma prevenção primária.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000140818

Questão 20 Prevenção Quaternária

Você, médico de uma Unidade Básica de Saúde, recebe uma paciente de 30 anos de idade, sem fatores de risco para câncer de mama, mas que acredita que fazer exames preventivos é a melhor forma de se cuidar. Por isso, solicita que você peça uma mamografia de rotina para ela. No entanto, você considera recusar o pedido da paciente quanto à solicitação da mamografia pois isto configura uma medida de prevenção:

Assinale a alternativa correta:

- ☐ A Primária.
- ☐ B Secundária.
- ☐ C Terciária.
- ☐ D Quaternária.

4000140634

Questão 21 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Sobre os níveis de prevenção é INCORRETO:

- ☐ A A educação alimentar é um exemplo de prevenção primária.
- ☐ B A vacinação contra o sarampo é um exemplo de prevenção primária.
- ☐ C O autoexame de mama é um exemplo de prevenção secundária.
- ☐ D A fisioterapia motora em pessoa com hemiparesia secundária por acidente cerebrovascular é um exemplo de prevenção terciária.
- ☐ E Solicitar teste do antígeno prostático específico para todos os homens com mais de 50 anos é um exemplo de prevenção terciária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000140501](#)


Questão 22 Prevenção Quaternária

Um menino com 7 anos de idade é encaminhado à Unidade Básica de Saúde (UBS) pela escola devido ao fato de que ele não consegue aprender a ler, o que tem impactado o seu desempenho escolar no último ano. Segundo relato do psicólogo do colégio, suspeita-se que o menino tenha déficit de atenção. De acordo com o histórico familiar, a criança é um dos 3 filhos de um casal que mora em uma casa de dois quartos. A avaliação da Equipe de Saúde da Família revela que o comportamento do menino em casa é tranquilo, que ele apresenta concentração em suas atividades e brinca com seus irmãos; não troca letras; não troca fonemas; não esquece atividades corriqueiras. Ao médico da equipe, a criança refere não gostar da escola porque sua professora não gosta dele. O médico chama a professora à UBS e, juntamente com sua equipe, reestabelece um canal de diálogo entre a professora e o menino. Após 2 meses, a equipe recebe a notícia de que a criança está evoluindo bem na escola. O conjunto de medidas adotadas na condução desse caso insere-se como prevenção:

- ☐ A Quaternária.
- ☐ B Terciária.
- ☐ C Secundária.
- ☐ D Primária.

Questão 23 Prevenção em Saúde

A figura abaixo apresenta a distribuição espacial dos casos de febre amarela confirmados e em investigação pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil até o dia 06 de abril de 2017, com início dos sintomas a partir de 1º de dezembro de 2016.



Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública sobre Febre Amarela. Informe - Nº 35/2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

Considerando a situação epidemiológica da febre amarela apresentada nos mapas, no período analisado, assinale a opção correta no que se refere às mudanças nas áreas de recomendação de vacinação.

- A Intensificação das estratégias de vacinação de forma seletiva nos estados de Minas Gerais e Paraná, anteriormente áreas sem recomendação de vacinação contra a febre amarela.
- B Determinação do estado de São Paulo como área com recomendação temporária de vacinação, anteriormente uma área sem recomendação de vacinação contra a febre amarela.
- C Intensificação da vacinação em municípios afetados pela febre amarela no estado do Rio de Janeiro, mantido como área com recomendação permanente de vacinação.
- D Determinação da maioria dos municípios do estado do Espírito Santo como áreas indicadas para a recomendação temporária de vacinação contra a febre amarela.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000049385

Questão 24 Anticoagulação oral Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Como estratégia de enfrentamento ao grande número de casos de acidente vascular encefálico nos idosos moradores de uma determinada área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família, propõe-se projeto de intervenção coletiva centrado na prevenção primária de tal adoecimento. Das ações específicas listadas abaixo, aquela que deve ser priorizada nesse projeto de prevenção primária é

- A buscar um controle efetivo da hipertensão arterial sistêmica nos pacientes idosos da região, sendo alvos do tratamento anti-hipertensivo os níveis tensionais menores ou iguais a 120 x 80 mmHg.
- B realizar palestras e outras atividades educativas, com destaque para a adesão a um plano dietético mais saudável, pobre em sal e rico em verduras, legumes e frutas, bem como para o combate ao sedentarismo e o tabagismo.
- C realizar rastreamento primário na população idosa local através da realização de ultrassonografia com Doppler de artérias carótidas e vertebrais, com o objetivo de avaliar a ocorrência de placas ateroscleróticas clinicamente silenciosas.
- D prescrever anticoagulação crônica adequada, associada a controle laboratorial de acordo com o fármaco utilizado, para indivíduos portadores de fibrilação atrial crônica cuja pontuação no escore CHADS2 seja maior ou igual a 2 pontos.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126921

Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Uma mulher de 45 anos de idade, história de diabetes e asma brônquica, estava internada no Hospital Municipal com quadro de pneumonia comunitária. Ao receber alta hospitalar foi orientada a procurar uma Unidade Básica de Saúde para solicitar administração de vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica). Qual o tipo de prevenção objetivada a partir da ação descrita?

- A Primária.
- B Secundária.
- C Terciária.
- D Quarternária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126652](#)

Prevenção Terciária

Paciente do sexo masculino, com 45 anos de idade, é dependente químico de cocaína, com uso por via inalatória e procurou o serviço especializado do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) para tratamento. A oferta desse atendimento no Sistema Único de Saúde caracteriza ações de que tipo?

- A Prevenção primordial.
- B Prevenção quaternária.
- C Prevenção terciária.
- D Prevenção secundária.
- E Prevenção primária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127073](#)

Respostas:

1	D	2	D	3	C	4	C	5	D	6	B	7	D	8	E	9	D	10	A	11	D
12	B	13	A	14	D	15	C	16	C	17	D	18	A	19	D	20	D	21	E	22	A
23	D	24	D	25	A	26	C														