

Questão 1 **Psiquiatria Infantil** **Diagnóstico do Autismo** **Transtorno do Espectro Autista TEA**

Menino de 10 anos apresenta dificuldades na escola, com muita dificuldade na socialização, dificuldades motoras, baixa tolerância à frustração, tendo bastante dificuldade em entender as solicitações da professora, não interagindo bem com os colegas, com relatos de sofrer bullying por seu jeito estranho. Apresenta habilidades com números, bastante perfeccionista, apaga muitas vezes suas escritas e chora se não ficam como gostaria. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa correta.

- ☐ A Necessita de avaliação especializada multidisciplinar, sala de recursos, além de treinamento de habilidades sociais.
- ☐ B É um quadro bastante típico nessa faixa etária, sendo a conduta adequada no manejo do caso o afastamento de suas atividades escolares.
- ☐ C É um quadro clássico de superdotação, altas habilidades e necessita de avaliação psiquiátrica
- ☐ D Seus comportamentos acontecem por falta de limites, não necessitando avaliações especializadas.

4000183379

Questão 2 **Diagnóstico do TDAH** **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH**

Após o período de isolamento em razão da pandemia por covid-19, registrou-se aumento no número de crianças e adolescentes com queixas atencionais nos consultórios pediátricos. Sabe-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é prevalente e que o diagnóstico é clínico, havendo critérios essenciais para seu correto reconhecimento. Assinale a alternativa que contempla o critério que necessariamente deverá ser identificado.

- ☐ A Início dos sintomas até os 10 anos
- ☐ B Associação de desatenção e hiperatividade/impulsividade
- ☐ C Resposta ao tratamento farmacológico com metilfenidato
- ☐ D Existência de sintomas em mais de um ambiente

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182781](#)**Questão 3** **Transtorno do Espectro Autista TEA**

O transtorno do espectro autista (TEA) é um grupo de síndromes neuroevolutivas que se caracteriza por uma ampla gama de problemas na comunicação social e por comportamentos restritos e repetitivos. Sobre o TEA, assinalar a alternativa CORRETA:

- ☐ A O TEA é diagnosticado com uma frequência quatro vezes maior em meninas do que em meninos.
- ☐ B Inúmeras síndromes com causas genéticas incluem o TEA como parte de um fenótipo mais amplo.
- ☐ C A idade paterna e materna avançada no momento do nascimento do bebê não está entre os fatores pré-natais mais significativamente associados a esse transtorno.
- ☐ D A hiperatividade e a desatenção são comportamentos raros em crianças com esse transtorno.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182688](#)

Questão 4 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

Uma criança de quatro anos com deficiência intelectual e diagnóstico de síndrome de Down é avaliada por atraso de falo. Apresenta déficit de comunicação, socialização, estereotipias motoras e hipersensibilidade aos estímulos auditivos e táteis. Qual a provável comorbidade dessa criança?

- A Transtorno do movimento estereotipado.
- B Apraxia de fala na infância.
- C Transtorno do espectro autista.
- D Déficit de atenção e hiperatividade

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182109](#)

Questão 5 Diagnóstico do TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

Os pais levam Miguel de 8 anos para consulta, pois a diretora da escola disse que ele é desatento e tem dificuldade em aprender. A conduta inicial do médico da Atenção Primária nessa situação deve ser

- A encaminhar Miguel ao neuropediatra.
- B avaliar os ambientes familiar e escolar da criança.
- C solicitar avaliação adicional tanto auditiva como visual.
- D realizar testes de aptidão intelectual.
- E solicitar eletroencefalograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181667](#)

Questão 6 Psiquiatria Infantil

Uma médica da Estratégia de Saúde da Família percebeu que, nas consultas de Puericultura, houve um aumento das queixas de agitação, irritabilidade e tristeza nas crianças, durante o período da pandemia da COVID-19. Muitos genitores, preocupados com as mudanças comportamentais dos filhos, estão solicitando a prescrição de medicamentos e encaminhamentos para consulta com Psicólogos.

Nesse cenário, atenta à situação, a médica, em conjunto com a equipe de saúde, deve planejar e executar ações de saúde no território que contemplem esse novo momento.

Considerando as informações apresentadas e com base na Educação Popular em Saúde, a principal ação a ser realizada com as famílias dessas crianças é a

- A promoção de reuniões com profissionais do Centro de Atenção Psicossocial infantil e familiares para esclarecer o manejo medicamentoso dos casos.
- B escuta ativa das queixas trazidas pelos familiares, para a compreensão do problema e construção dialogada da solução.
- C utilização pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde de uma série de técnicas de convencimento dos familiares para evitar a medicalização do sofrimento das crianças.
- D elaboração de uma série de palestras informativas, com exposição das melhores evidências científicas para o tratamento das doenças neurodegenerativas da infância.

Questão 7 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

A avaliação do desenvolvimento é etapa essencial na consulta pediátrica e vai muito além de conhecer os importantes marcos para cada faixa etária. O preceptor solicitou que fosse aplicado em um paciente o M-CHAT, que permite ao pediatra, a partir de um determinado escore de pontos, pensar, principalmente, na possibilidade de

- A Depressão.
- B Transtorno Obsessivo Compulsivo.
- C Transtorno do Espectro Autista.
- D Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
- E Erros inatos do metabolismo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000173579](#)

Questão 8 Transtorno do Espectro Autista TEA

Sobre a apresentação clínica de uma criança portadora de transtorno de espectro autista na infância, qual característica é provável de se encontrar?

- A Movimentos corporais estereotipados
- B Capacidade para fazer amizade com seus pares
- C Habilidade para sustentar uma conversação
- D Interesse em histórias sobre acontecimentos imaginários

4000170522

Questão 9 Psiquiatria Infantil Transtorno de Oposição e Desafio TOD

Perda de paciência frequente, postura desafiadora; recusa em aceitar ordens ou solicitações de adultos, com os quais discute com frequência; tende a responsabilizar os outros pelos seus atos; frequentemente perturba os outros de forma deliberada. As características expostas são compatíveis com qual transtorno comportamental da infância?

- A Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
- B Transtorno da personalidade antissocial.
- C Transtorno opositor desafiante.
- D Transtorno explosivo intermitente.

4000169495

Questão 10 Psiquiatria Infantil Transtorno do Espectro Autista TEA

Criança de 5 anos é levada pelos pais ao consultório, segundo o que relatam, a escola tem se queixado da criança por não acompanhar os colegas no rendimento geral e por não conversar com os amigos e professores. Conforme o médico fazia mais perguntas sobre a criança, os pais explicam que ele sempre foi "difícil de lidar", que se irrita muito quando tocam nele, que faz "escândalos" quando tentam arrumar o cabelo dele. Mas que adora brincar com dinossauros, inclusive suas primeiras palavras se relacionavam a esses animais, sabendo mais de 30 nomes diferentes. Durante a consulta toda, a

criança quase não respondeu às indagações da pediatra e não tirava o olho de uma figura colada na balança. O quadro descrito tem como provável diagnóstico:

- A Paralisia cerebral.
- B Transtorno opositor desafiador.
- C Transtorno do espectro autista.
- D Transtorno de déficit de atenção.

4000169269

Questão 11 Psiquiatria Infantil

O ensaio publicado em maio de 2020 pela Revista Ciência e Saúde Coletiva, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, intitulado "O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no contexto da Covid-19 e os riscos para violências autoinflingidas", traz reflexões referentes aos impactos do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e sobre o uso intensivo da internet entre crianças e adolescentes e suas possíveis consequências para a prática de violências autoinflingidas. Quanto à saúde mental de crianças e adolescentes, dentre as considerações abaixo, qual é considerada ERRADA:

- A Há algumas práticas de autoagressões, que não necessariamente envolvem transtornos de ordem emocional ou quadros depressivos e que são vistos como práticas culturais aceitas socialmente no universo online.
- B Não é considerada necessária a criação de protocolos e medidas exclusivas para os adolescentes quanto à prevenção das formas de violências autoinflingidas
- C O uso excessivo da internet pode também gerar uma forma de adição, um transtorno que gera dependência, podendo se expressar em várias formas: cyber sexo, relacional (das redes sociais), adição por jogos
- D Pode ocorrer acirramento de vulnerabilidades para ideações e tentativas de suicídio quando a criança ou o adolescente apresenta, previamente, condições específicas da saúde mental que demandem monitoramento

4000168723

Questão 12 Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

Em relação ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), é correto afirmar que:

- A É um transtorno que usualmente aparece na infância ou adolescência, relacionado a alterações neurobiológicas e costuma apresentar melhora do quadro clínico com uso de psicoestimulantes.
- B É relacionado essencialmente com fatores culturais (as práticas de determinada sociedade) e as primeiras vivências infantis (o modo como os pais, ou seus substitutos, educam e se relacionam com os filhos, com os decorrentes conflitos psicológicos).
- C São consideradas as principais causas: luz artificial, consumo de açúcar, deficiência hormonal e deficiências vitamínicas na dieta da criança. Não estão associados a outras comorbidades psiquiátricas na vida adulta.
- D Abordagem focada completamente na relação do terapeuta com o paciente.

4000164551

Questão 13 Psiquiatria Infantil Transtorno de Oposição e Desafio TOD

Os pais de uma criança de seis anos de idade vêm ao ambulatório com queixas de que a criança está com posturas desafiadoras; recusa em aceitar ordens ou solicitações de adultos, com os quais discute com frequência; e tendendo a

responsabilizar os outros pelos seus atos. Esses sintomas ocorrem em casa e em outros espaços sociais. Diante desse relato, qual a principal hipótese diagnóstica?

- A Transtorno de conduta.
- B Transtorno explosivo intermitente.
- C Transtorno de oposição desafiante.
- D Transtorno da personalidade antissocial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163691](#)

Questão 14 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

No ambulatório, uma criança de 30 meses de idade apresenta alterações compatíveis com Transtorno do Espectro Autista. Qual dos critérios abaixo certamente foram considerados como os mais importantes na definição da hipótese diagnóstica?

- A Capacidade limitada para fazer amizade com seus pares assim como algum prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversação.
- B Prejuízo limitado na espontaneidade de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas (p.ex., não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse).
- C Prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, como contato visual direto, expressão facial, postura corporal e gestos para regular a interação social.
- D Prejuízo limitado na atividade imaginativa, como representação de papéis de adultos, personagens de fantasia ou animais; falta de interesse em histórias sobre acontecimentos imaginários.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163690](#)

Questão 15 Psiquiatria Infantil Diagnóstico do TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

Escolar, sexo masculino, 10 anos, vem à consulta com o pediatra por dificuldades de relacionamento social na família e na escola. Mostra um desempenho escolar errático com alguns bons resultados mesclados com resultados ruins. A família recebe bilhetes da escola, quase diariamente, com queixas de que o paciente atrapalha o andamento da aula com piadas, conversas ou discussões. Segundo a mãe, o filho é bastante inteligente, mas vem deteriorando o seu desempenho ao longo dos anos com piora acentuada nas últimas séries do ensino fundamental. Não consegue se concentrar nos trabalhos e termina as tarefas muito rápido, com uma qualidade baixa. Frequentemente, perde o material necessário para fazer as lições de casa. De acordo com a família, isso sempre aconteceu, mas nos últimos anos os sintomas têm ficado mais significativos. Com base nessa história, o diagnóstico mais provável é:

- A Distímia.
- B Distúrbio de conduta.
- C Transtorno de humor bipolar
- D Transtorno opositor- desafiador.
- E Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade

4000163579

Questão 16 Psiquiatria Infantil Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

Sobre transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), é correto afirmar:

- A Ocorre simultaneamente com outros transtornos emocionais, transtornos endocrinológicos, comportamentais e de aprendizagem.
- B Na faixa etária pediátrica, são contraindicados os psicoestimulantes e antidepressivos.
- C Crianças afetadas geralmente apresentam insucesso acadêmico, problemas de relacionamento interpessoal e baixa autoestima, com resolução na vida adulta.
- D É o terceiro transtorno neurocomportamental mais comum da infância.
- E O TDAH é caracterizado por desatenção, incluindo aumento da distração e dificuldade em manter a atenção; controle de impulso pobre e diminuição da capacidade de autoinibição; hiperatividade e inquietação motora.

4000163525

Questão 17 Tratamento do TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

Que fármacos são considerados de primeira linha para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade?

- A Bupropiona, metilfenidato.
- B Lisdexanfetamina, clonidina.
- C Bupropiona, nortriptilina.
- D Metilfenidato, venlafaxina.
- E Lisdexanfetamina, metilfenidato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147690](#)

Questão 18 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

Paciente de 5 anos de idade, sexo masculino, é levado por seus pais para uma consulta com o psiquiatra. Quem encaminhou foi a pediatra da família, que gentilmente fez as seguintes observações na carta de referência:

“Paciente apresenta um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, não forma frases completas e não apresenta intenção comunicativa adequada. Noto também que deu seus primeiros passos com alguns meses de atraso, pois normalmente prefere ficar sentado manuseando alguns brinquedos de maneira ritualizada e parece adorar bater palmas na sua cama durante a noite. Quando chamado pelo nome, parece não ouvir, além disso, demonstra pouco apego pelos pais. Solicito sua avaliação”

Diante desse quadro, assinale o provável diagnóstico.

- A Surdez
- B TDAH com predomínio desatento
- C Autismo
- D Esquizofrenia infantil
- E Transtorno de oposição e desafio

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147689](#)

Questão 19 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

O autismo é um transtorno _____, cerca de 5 vezes mais prevalente no sexo _____. Normalmente, seus primeiros sinais e sintomas são identificados perto dos _____ pelos familiares, contudo, seu diagnóstico ocorre ao redor dos _____ de vida.

- A Neurodegenerativo - feminino - 3 anos - 18 meses
- B Neurodesenvolvimental - feminino - 6 meses - 18 meses
- C Neurodegenerativo - masculino - 2 anos - 12 meses
- D Neurodesenvolvimental - masculino - 18 meses - 3 anos
- E Neurodesenvolvimental - masculino - 18 meses - 6 anos

4000147199

Questão 20 Tratamento do TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

A dificuldade de aprendizado é umas das principais queixas no período escolar, geralmente referida pelo professor como "aquele aluno que se relaciona mal com os colegas, desligado, parece que não se interessa por nada e se distrai facilmente com barulhos, por exemplo, quando um lápis cai ao chão." Sintomas dessa natureza vêm sendo diagnosticados como Déficit de Atenção e têm levado à medicalização excessiva. O medicamento mais utilizado em crianças para esse problema é:

- A Metilfenidato.
- B Topiramato.
- C Carbamazepina.
- D Fenitoína.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127979

Questão 21 Tratamento do TDAH Diagnóstico do TDAH

Uma criança do sexo masculino com 8 anos de idade é atendida em consulta com médico de Unidade Secundária de Saúde para avaliação de transtorno de comportamento. A mãe relata que o filho perde material escolar com frequência, costuma esquecer as tarefas do dia-a-dia e demora a atender quando chamado pelo nome. Informa, ainda, que a criança é repreendida na escola por não parar no mesmo lugar, levantar-se o tempo todo da cadeira, falar demais e intrometer-se na conversa alheia, além de ter notas ruins. O exame clínico evidencia anormalidades. O diagnóstico e a conduta adequados ao caso são

- A desenvolvimento normal, com comportamentos comuns na infância; orientar a família.
- B transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; iniciar tratamento com risperidona.
- C transtorno de espectro autista; encaminhar o paciente para atendimento especializado.
- D transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; iniciar tratamento com metilfenidato.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127927

Questão 22 Diagnóstico do Autismo

A Equipe de Saúde da Família (ESF) de uma Unidade Básica de Saúde observou aumento no número de crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor no seu território de atuação. Uma pesquisa mostrou que 90% desses casos

são representados por filhos de imigrantes latinos, de língua espanhola, que trabalham em oficinas de costura. Após diversas visitas a essas oficinas de costuras, a equipe da ESF concluiu que o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é causado por falta de estímulo adequado: os pais trabalham ininterruptamente e não têm tempo de dispensar atenção e estímulo necessários a essas crianças, que ficam muito tempo deitadas, ao lado dos pais, enquanto eles costuram. Considerando os fatores ambientais, sociais e ocupacionais que prejudicam a saúde das crianças que vivem nessas condições, a ESF deve

- ☐ A encaminhar as crianças ao CAPS-infantil para iniciar tratamento medicamentoso.
- ☐ B notificar o Conselho Tutelar e denunciar à Polícia local os maus tratos recebidos pelas crianças.
- ☐ C encaminhar as crianças ao Serviço de Neurologia infantil de referência para exames complementares de imagem.
- ☐ D realizar abordagem nas oficinas, envolvendo os membros da comunidade, a fim de conscientizá-los da falta de estímulo adequado às crianças e construir possíveis soluções.

4000126863

Respostas:

1	A	2	D	3	B	4	C	5	B	6	B	7	C	8	A	9	C	10	C	11	B
12	A	13	C	14	C	15	E	16	E	17	E	18	C	19	D	20	A	21	D	22	D