

Questão 1 **Cirurgia** **Fios de Sutura**

Uma paciente com 40 anos de idade procura a Unidade Básica de Saúde com ferimento cortocontuso de 7 cm de extensão na face anterior da coxa direita, de bordas regulares, acometendo pele, tecido subcutâneo e musculatura, causado por vidro. O sangramento local é de pequena monta. Informa reforço de vacina antitetânica há 1 ano.

Após antisepsia local, bloqueio anestésico e limpeza da ferida, tendo-se constatado que não há corpos estranhos, deve-se realizar o reparo da ferida com

- ☐ A fio absorvível 3-0 para a musculatura, fio absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 3-0 para a pele.
- ☐ B fio absorvível 5-0 para a musculatura, fio absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio absorvível 4-0 para a pele.
- ☐ C fio não absorvível 3-0 para a musculatura, fio não absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 3-0 para a pele.
- ☐ D fio não absorvível 5-0 para a musculatura, fio não absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 4-0 para a pele.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176682](#)

Questão 2 **Cirurgia** **Fios de Sutura**

A tecnologia e o desenvolvimento de novos materiais proporcionaram ao cirurgião uma gama de novos fios de sutura com diferentes aplicabilidades. Qual das assertivas abaixo só contém fios trançados?

- ☐ A Nylon, polipropileno e seda.
- ☐ B Poliéster, caprolactona e polidoxanona.
- ☐ C Seda, poliéster e poliglactina.
- ☐ D Algodão, catgut e ácido poliglicólico.
- ☐ E Polidoxanona, seda e algodão.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000173543](#)

Questão 3 **Temas Gerais em Cirurgia** **Cirurgia**

O conceito da cirurgia robótica pode ser sumarizado com o uso do robô para aumentar as capacidades do cirurgião em comparação à cirurgia aberta tradicional. Qual das características abaixo NÃO está relacionada aos avanços da cirurgia robótica?

- A Cirurgiã(o) opera sentado(a) numa situação mais ergonômica e confortável.
- B A visão oferecida pelo equipamento é binocular estereoscópica.
- C Os instrumentos podem ser controlados pelas mãos e pelos pés.
- D O robô fornece um feedback de sensação tátil dos tecidos.
- E Existe uma maior amplitude e destreza dos movimentos oferecidos pelo robô.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000173537](#)

Questão 4 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

A manobra de Pringle pode ser usada no controle hemorrágico da cirurgia hepática através da compressão extrínseca do pedículo biliar, que contém os vasos responsáveis por irrigar o parênquima hepático. Se houver compressão extrínseca somente do segmento arterial hepático, excluindo a veia porta, é esperado que a oxigenação hepática diminua, aproximadamente, de:

- A 20 a 35%
- B 35 a 50%
- C 60 a 75%
- D 70 a 85%

4000170994

Questão 5 Princípios da Cirurgia Oncológica Cirurgia

Com relação aos princípios básicos da cirurgia oncológica, pode-se afirmar que

- A na ressecção R1 há doença macroscópica residual.
- B a biópsia incisional consiste na remoção completa da lesão e tem papel terapêutico.
- C a biópsia por agulha fina permite a obtenção de amostra tecidual satisfatória.
- D o critério de operabilidade diz respeito às condições clínicas do paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170076](#)

Questão 6 Temas Gerais em Cirurgia Conceitos Básicos e Complicações em Cirurgia Laparoscópica Cirurgia

Analise a imagem a seguir.



A abordagem cirúrgica exemplificada na imagem apresenta em estudos

- A tempo cirúrgico semelhante ao das outras opções.
- B resultados oncológicos semelhantes ao das outras opções.
- C parâmetros gerais superiores aos das outras opções.
- D custo semelhante ao das outras opções.

4000166348

Questão 7 **Hérnias da Parede Abdominal** **Temas Gerais em Cirurgia** **Cirurgia**

Há décadas, os cirurgiões buscam reduzir as complicações da parede abdominal após laparotomias, a fim de prevenir o surgimento de hérnias incisionais. De acordo com o estudo multicêntrico STITCH, dentre as recomendações mais aceitas atualmente para o fechamento da parede abdominal está(ão):

- A fechamento em massa (*mass closure*) com fio inabsorvível (polipropileno).
- B sutura contínua com fio monofilamentado de absorção lenta (polidioxanona).
- C manter a relação entre o comprimento do fio utilizado e o comprimento da incisão da aponeurose menor que 2.
- D pontos envolvendo o peritônio, aponeurose, fâscias musculares, subcutâneo e pele, passados entre 10 mm da borda (*big bites*).
- E evitar formalmente o uso de tela profilática nas laparotomias de emergência, pois estas não previnem hérnias incisionais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165275](#)

Questão 8 **Conceitos Básicos e Complicações em Cirurgia Laparoscópica** **Cirurgia** **Aderências Intestinais Bridas**

O verdadeiro desafio para o cirurgião na obstrução intestinal não é a decisão de realizar a cirurgia, mas a de quando e como realizá-la. Com base nessa premissa, assinale a alternativa correta.

- A Em 60 a 85% dos pacientes que adentram as unidades de Pronto-Socorro com obstrução intestinal por bridas, a cirurgia é desnecessária.
- B A realização de laparoscopia para a abordagem da obstrução intestinal por aderências é a opção mais indicada atualmente.
- C Na presença de comprometimento cardiovascular grave e instabilidade hemodinâmica, a laparoscopia é preferencial à laparotomia.
- D Diante de uma distensão intestinal excessiva, o pneumoperitônio ocasionado pela laparoscopia não constitui contraindicação.
- E As taxas de conversão da laparoscopia são baixas, em torno de 3 a 5% dos casos de abordagem para obstrução intestinal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165268](#)

Questão 9 **Temas Gerais em Cirurgia** **Cirurgia**

O método mais adequado de fechamento da parede abdominal quando de uma cavidade grosseiramente contaminada é fechar:

- A somente a aponeurose e deixar a pele aberta
- B a pele para lavar a cavidade 24 horas mais tarde
- C completamente todas as camadas
- D a pele e aponeurose hermeticamente para prevenir deiscência

4000164949

Questão 10 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

Em relação ao ambiente cirúrgico, a partir de qual momento é obrigatório o uso de avental estéril pelo cirurgião?

- A Na entrada do bloco cirúrgico.
- B A partir do vestiário.
- C No momento do início da cirurgia.
- D Na condução do paciente à sala de recuperação.

4000164500

Questão 11 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

Em relação aos fundamentos da cirurgia, assinale a alternativa que está relacionada com a evolução pós-operatória mais segura para o paciente.

- A Anestesia geral.
- B Informação.
- C Uso de materiais adequados.
- D Sala de recuperação com cama elétrica.

4000164499

Questão 12 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

Qual a incisão mais adequada para uma cirurgia gástrica com paciente instável hemodinamicamente?

- A Mediana supraumbilical.
- B Kocher.
- C Mediana infraumbilical.
- D Xifo-púbica.

4000164498

Questão 13 Cirurgia Procedimentos à Beira Leito

A utilização de cateter venoso central é um recurso, por vezes, responsável pela manutenção do tratamento ou outras indicações. Nesse sentido, consiste em uma indicação formal de acesso venoso central a necessidade de:

- A Analgesia endovenosa.
- B Reposição sanguínea.
- C Nutrição Parenteral Total.
- D Infusão de Ringer Lactato para expansão volumétrica.

4000164493

Questão 14 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

Em uma paciente que será submetida a gastrectomia por laparotomia, como deve ser disposto o material de diérese, hemostasia, afastadores e síntese?

Dados:

Considere a mesa de instrumentos cirúrgicos dividida em quadrantes: superior direito **(SD)**, inferior direito **(ID)**, superior esquerdo **(SE)** e inferior esquerdo **(IE)**

- A Diérese (ID), hemostasia (IE), afastadores (SE), síntese (SD).
- B Diérese (IE), hemostasia (ID), afastadores (SE), síntese (SD).
- C Diérese (ID), hemostasia (IE), afastadores (SD), síntese (SE).
- D Diérese (SD), hemostasia (SE), afastadores (IE), síntese (ID).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164391](#)

Questão 15 Princípios Básicos do Tratamento de Lesões Cortocontusas

Tipos de Sutura e Suas Principais Características

Criança de seis anos chega à emergência após queda de patins. Apresenta ferimento linear aberto em face, sem sangramento ativo. Após anestesia e limpeza da ferida, o ideal para reparo é:

- A Pontos separados, com agulha cilíndrica e fio absorvível;
- B Pontos intradérmicos, com agulha cilíndrica e fio absorvível;
- C Pontos intradérmicos, com agulha cortante e fio inabsorvível;
- D Pontos separados, com agulha cortante e fio inabsorvível;

Essa questão possui comentário do professor no site [4000151617](#)

Questão 16 Segurança do Paciente

Paciente será submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal no lado direito. Antes da indução anestésica, seguindo a lista de verificação de segurança cirúrgica desenvolvida pela OMS, deve ser confirmado:

- A Identificação do paciente, análise dos pontos importantes da recuperação pós-operatória e passos críticos da cirurgia.
- B Revisão da correta esterilização dos instrumentais, passos críticos da cirurgia, confirmação da cirurgia a ser realizada e local da cirurgia.
- C Identificação do paciente, confirmação da cirurgia a ser realizada, termo de consentimento e sítio cirúrgico correto da cirurgia.
- D Verificação se antibioticoprofilaxia foi realizada avaliação de via aérea difícil e confirmação de todos os profissionais que participarão da cirurgia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000151614](#)

Questão 17 **Cirurgia** **Fios de Sutura**

Considerando os fios cirúrgicos utilizados para sutura, assinale a alternativa correta.

- A O fio de PDS é monofilamentar e inabsorvível.
- B O fio de catgut é um dos que causam menor reação tecidual.
- C O fio de Vicryl permanece com sua força tênsil em mais de 50% em 5 semanas.
- D O fio de Monocryl é monofilamentar e produz reação tecidual mínima.
- E O fio de Prolene é multifilamentar e absorvível.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146986](#)

Questão 18 **Temas Gerais em Cirurgia** **Cirurgia**

A proceder com a instalação de um cateter para acesso venoso central. A veia periférica de primeira escolha é a:

- A Cefálica.
- B Basílica.
- C Jugular externa.
- D Jugular interna.
- E Subclávia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146873](#)

Questão 19 **Temas Gerais em Cirurgia**

Um homem com 26 anos de idade procura equipe de Saúde da Família Ribeirinha devido a um acidente com anzol. O paciente refere que é pescador experiente, porém, ao se distrair para pegar a isca, acabou fisingando a própria perna com o anzol. Ao realizar o exame físico, o médico identifica que se trata de um anzol de duas pontas e que uma das pontas perfurou profundamente a panturrilha direita do paciente. Sobre o procedimento para a remoção do anzol, é correto afirmar que se deve

- A realizar, com um alicate, o corte da ponta livre do anzol, para que não haja risco de novo acidente enquanto se está removendo a ponta perfurante.
- B realizar a técnica de bloqueio de campo regional para a anestesia no local de entrada do anzol e posterior remoção.
- C realizar, com um bisturi, uma incisão para ampliar o orifício de entrada do anzol, a fim de que ele possa ser retirado.
- D realizar a tração do anzol até efetuar a sua retirada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146546](#)

Questão 20 Tipos de Sutura e Suas Principais Características Cirurgia


O material de sutura ideal para o fechamento da parede abdominal deve incluir as seguintes características:

- A resistência adequada a tensão, mínima lesão tecidual e ser inabsorvível
- B resistência adequada a tensão, mínima lesão tecidual e ser absorvível
- C resistência a infecção e ser inabsorvível
- D grande lesão tecidual e ser absorvível

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145815](#)

Questão 21 Tipos de Sutura e Suas Principais Características Cirurgia

Sobre a técnica ilustrada na figura abaixo, de sutura com pontos separados, para tratamento de ferida corto-contusa, é CORRETO afirmar:



- A É o ponto de escolha para suturas na região da face
- B É uma boa escolha para quando há tensão nas bordas da ferida
- C Não promove boa hemostasia
- D Tende a provocar invaginação das bordas da ferida

4000145480

Questão 22 Temas Gerais em Cirurgia

No período de preparo para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, houve priorização para tratamento cirúrgico dos pacientes com necessidades que configurassem urgência ou emergência, visando garantir a capacidade hospitalar adequada para atender a um fluxo antecipado de pacientes com Covid-19. Dentre os quatro casos apresentados, nas circunstâncias da pandemia de Covid 19, qual seria incluído como alta priorização para tratamento cirúrgico, com

disponibilidade de anestesia geral, nos próximos 7 dias?

- A Mulher, 34 anos, para reconstrução do trânsito intestinal após peritonite por trauma fechado, ressecção parcial de jejuno e íleo, há 2 meses, estável, em nutrição parenteral total hospitalar.
- B Mulher, 25 anos, disfagia progressiva de líquidos para sólidos com acalasia idiopática do esôfago e megaesôfago grau 111, emagrecida, atendida mediante encaixe de urgência no ambulatório.
- C Homem, 61 anos, dor epigástrica, plenitude pós prandial, síndrome consumptiva há 1 mês com vômitos alimentares, desidratado, oligúrico, admitido há 8 horas na sala de urgência.
- D Homem, 63 anos, síndrome consumptiva há 2 meses, colestase há 15 dias com neoplasia de confluência biliopancreática localmente avançada, aguardando início de quimioterapia.

4000144212

Questão 23 **Temas Gerais em Cirurgia**

Com relação a utilização de sondas e drenos é **CORRETO** afirmar:

- A Quanto mais longo o circuito do dreno, mais eficiente a drenagem.
- B As sondas são inseridas normalmente através de orifícios realizados de forma cruenta.
- C Drenos são colocados normalmente através de orifícios naturais.
- D Podemos utilizar drenos com a finalidade de nutrição.
- E Podemos utilizar sondas com a finalidade de esvaziamento.

4000143172

Questão 24 **Temas Gerais em Cirurgia** **Cirurgia**

O transplante de órgãos sólidos e a cirurgia laparoscópica foram as principais conquistas da cirurgia moderna do Séc. XX. A perseverança de pioneiros tornou realidade a troca de rim, fígado e coração.

Assinale a alternativa que relembra respectivamente esses cirurgiões.

- A Kelly, Claude Couinaud e DeBakey.
- B Roy Calne, Lortat Jacob e Blalock.
- C Addison, Blumgart e Taussig.
- D Bilioth, Jenner e Vivian Thomas.
- E Joseph Murray, Starlz e Barnard.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141798

Questão 25 **Princípios da Cirurgia Oncológica** **Cirurgia**

A cirurgia é a principal modalidade de tratamento dos tumores sólidos. Quanto à biópsia que permite a avaliação histológica do tumor, é CORRETO afirmar:

- A A biópsia incisional retira a lesão inteira e permite a avaliação histológica do tumor.
- B A biópsia excisional retira apenas parte da lesão e permite a avaliação histológica do tumor.
- C A biópsia por punção com agulha grossa permite a avaliação histológica do tumor.
- D A punção aspirativa por agulha fina permite a avaliação histológica do tumor.

4000141361

Questão 26 Conceitos Básicos e Complicações em Cirurgia Laparoscópica Cirurgia

Com o advento das fibras ópticas de iluminação, conjugado com o desenho de instrumentais cirúrgicos que possibilitavam a manipulação dos órgãos internos com menores áreas de dissecação, surgiram os primeiros procedimentos videolaparoscópicos.

Uma desvantagem da cirurgia laparoscópica é:

- A O custo do procedimento em termos de equipamentos e manutenção.
- B O tempo de permanência hospitalar e o retorno às atividades normais.
- C A quantidade de trauma cirúrgico e a dor pós-operatória.
- D O efeito estético e a resposta metabólica ao trauma.

4000141353

Questão 27 Tipos de Sutura e Suas Principais Características Cirurgia Fios de Sutura

Considerando os tipos de fios e técnicas de suturas, o material utilizado para fechamento ósseo após esternotomia é:

- A Grampos metálicos.
- B Fio de seda.
- C Categute.
- D Fio de aço.

4000141350

Questão 28 Conceitos Básicos e Complicações em Cirurgia Laparoscópica

Pode ser considerada uma contraindicação à realização de uma cirurgia videolaparoscópica:

- A asma brônquica.
- B cirurgia abdominal prévia.
- C idade maior do que 65 anos.
- D obesidade.
- E doença cardiovascular restritiva importante.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141046

Questão 29 Segurança do Paciente Cirurgia

Um paciente será submetido a nefrectomia radical direita e, no hospital, aplica-se corretamente o **checklist** de cirurgia segura da OMS. Esse **checklist** divide a cirurgia em três fases: antes da indução anestésica ou **sign-in**; antes da incisão cirúrgica ou **time-out**; e antes do paciente sair da sala de operações ou **sign-out**.

Nesse caso, a ação que deve ser tomada na fase **sign-in** é

- A confirmar, com cirurgião, anestesista e enfermeiro, o nome do paciente e a cirurgia a ser realizada.
- B verificar se a cefazolina foi administrada nos últimos 60 minutos antes da incisão.
- C verificar a tomografia computadorizada que corrobora o diagnóstico disponível.
- D confirmar se há risco de perda sanguínea maior que 500 ml e se há acesso endovenoso adequado.

4000140651

Questão 30 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

Drenos que possuem um sistema de insuflação de ar, que mantém o lúmen do cateter aberto, mesmo quando não há passagem de líquido por ele, e devem estar conectados a uma bolsa de drenagem fechada. São especialmente úteis quando a quantidade de drenagem é grande ou quando a drenagem puder ser conectada a outros tipos de drenos.

- A Dreno suctor
- B Dreno de Penrose
- C Dreno de Sump
- D Dreno de Kher
- E Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000138306

Questão 31 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

A criação de pneumoperitônio deve ser preferencialmente realizada utilizando um tipo de gás na realização de qualquer cirurgia abdominal minimamente invasiva, que utilize a plataforma laparoscópica ou robótica.

O tipo de gás utilizado nessa cirurgia e seus níveis pressóricos, respectivamente, são:

- A CO_2 / 14-15mmHg
- B N_2O / 16-17mmHg
- C N_2O / 18-18mmHg
- D CO_2 / 20-21mmHg

Essa questão possui comentário do professor no site 4000133717

Questão 32 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

Entre as lesões a seguir, aquela que demanda tratamento cirúrgico de urgência é:

- A Hemangioma rubi.
- B Cisto epidérmico com abscesso.
- C Lipoma.
- D Acrocórdon.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000132786](#)

Questão 33 **Cirurgia** **Procedimentos à Beira Leito**

Assinale a assertiva correta sobre acesso venoso central.

- A O transdutor ultrassonográfico indicado na punção ecoguiada é o convexo de baixa frequência, por facilitar a identificação de estruturas superficiais.
- B A presença de incompressibilidade venosa pelo transdutor ultrassonográfico é critério para seleção de outro sítio de punção
- C A veia jugular interna localiza-se em posição anterolateral à artéria carótida comum na maioria dos casos
- D O acesso venoso femoral é indicado preferencialmente ao subclávio, por apresentar menor risco de infecção

4000129190

Questão 34 **Instrumental Cirúrgico** **Cirurgia**

Você foi chamado para auxiliar um cirurgião e um assistente e será o instrumentador em uma cirurgia de uma apendicite aguda. VOCÊ POSICIONARÁ A MESA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO À:

- A Esquerda do paciente e à esquerda do primeiro assistente.
- B Esquerda do paciente e à direita do primeiro assistente.
- C Direita do paciente e do lado direito do cirurgião principal.
- D Direita do paciente e do lado esquerdo do cirurgião principal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130304](#)

Questão 35 **Cirurgia** **Procedimentos à Beira Leito**

Quatorze dias após a admissão no hospital, por uma queimadura de segundo grau, com 30% de área queimada e instabilidade hemodinâmica que necessitou acesso venoso central, um paciente desenvolveu picos febris. No exame físico, o local de inserção do cateter venoso central estava vermelho, sensível e quente.

O melhor tratamento para essa complicação é

- A a troca do cateter venoso central com fio-guia, cultura da ponta do cateter anterior.
- B tratar o paciente com antibióticos intravenosos até as hemoculturas tornarem-se negativas.
- C remoção do cateter venoso central, cultura da ponta do cateter, colocação de novo cateter contralateral e administração de antibióticos.
- D remoção do cateter e tratamento com antibióticos orais e analgésicos, conforme necessário.

