

Questão 1 **Diagnóstico do Autismo** **Transtorno do Espectro Autista TEA**

Sinais precoces de Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem ser observados desde os primeiros meses de vida e devem ser investigados durante as consultas de puericultura. Todo contato com a criança deve ser visto como um momento interventivo, de avaliação e acompanhamento de seu desenvolvimento. Qual dos eventos abaixo NÃO pode ser considerado sinal precoce sugestivo de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor:

- ☐ A Ansiedade de separação e indiferença quando os pais se ausentam
- ☐ B Atraso em adquirir o sorriso social
- ☐ C Irritabilidade quando ninado no colo
- ☐ D Preferência por dormir sozinho no berço

4000185509

Questão 2 **Intoxicações Exógenas** **Síndrome Colinérgica**

Homem, 55 anos, é trazido ao pronto-socorro após ingerir grande quantidade de uma substância que causou quadro de sudorese profusa, bradicardia, miose, hipotensão e broncorreia.

Qual é a substância que apresentaria efeito similar quando ingerida em grande quantidade?

- ☐ A Loperamida.
- ☐ B Rivastigmina.
- ☐ C Escopolamina.
- ☐ D Imipramina.

4000184116

Questão 3 **Psiquiatria Infantil** **Transtornos Ansiosos**

Sobre transtornos ansiosos na infância e na adolescência, analise as assertivas abaixo:

- I. São pouco comuns e facilmente identificáveis.
- II. O transtorno de ansiedade de separação e fobias específicas comumente se desenvolvem na infância.
- III. Considerando o impacto social na funcionalidade e desenvolvimento de outros transtornos mentais, a Atenção Básica tem papel central no reconhecimento precoce desses quadros.

Quais estão corretas?

- A Apenas I.
- B Apenas II.
- C Apenas II e III.
- D I, II e III.

4000183378

Questão 4 Intoxicações Exógenas

Uma mulher de 56 anos de idade foi levada inconsciente ao hospital pelo SAMU. Na entrada, apresentava-se sonolenta, e seus dados eram os seguintes: frequência cardíaca de 40 bpm; pressão arterial de 100 mmHg x 55 mmHg; saturação de 97%; pupilas mióticas pouco fotorreagentes. O restante do exame físico resultou normal. Durante seu tratamento, a paciente evoluiu com FC de 120 bpm, ausculta com estertores crepitantes bilaterais difusos e saturação de 85%.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o quadro provavelmente associado a esse caso clínico e a medicação indicada.

- A síndrome anticolinérgica; atropina
- B edema pulmonar cardiogênico; flumazenil
- C edema pulmonar hipertensivo; dexametasona
- D edema pulmonar cardiogênico; adrenalina
- E edema pulmonar não cardiogênico; naloxona

4000183288

Questão 5 Síndrome Adrenérgica

Um menino de dois anos de idade, previamente hígido, foi levado ao pronto-socorro infantil com histórico de sonolência súbita. O pai relatou que o menino estava tratando um quadro de infecção de vias aéreas superiores com lavagem nasal e inalação com soro fisiológico havia três dias. No presente dia, pela manhã, o pai não havia achado o soro fisiológico para realizar a lavagem nasal, então usou a medicação que ele utilizava normalmente para “descongestionar o nariz”.

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a provável causa da intoxicação exógena no caso clínico acima e o seu tratamento adequado, respectivamente

- A morfina — naloxona
- B nafazolina — naloxona
- C nafazolina — medidas de suporte
- D morfina — medidas de suporte
- E morfina — flumazenil

4000183241

Questão 6 Diagnóstico do TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

Após o período de isolamento em razão da pandemia por covid-19, registrou-se aumento no número de crianças e

adolescentes com queixas atencionais nos consultórios pediátricos. Sabe-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é prevalente e que o diagnóstico é clínico, havendo critérios essenciais para seu correto reconhecimento. Assinale a alternativa que contempla o critério que necessariamente deverá ser identificado.

- A Início dos sintomas até os 10 anos
- B Associação de desatenção e hiperatividade/impulsividade
- C Resposta ao tratamento farmacológico com metilfenidato
- D Existência de sintomas em mais de um ambiente

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182781](#)

Questão 7 Diagnóstico do TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsiquiátrica que afeta pré-escolares, crianças, adolescentes e adultos em todo o mundo e apresenta como características uma diminuição na atenção e um padrão de impulsividade e hiperatividade aumentadas. Sobre o TDAH, assinalar a alternativa CORRETA:

- A Os dados, até o momento, sugerem que esse é um transtorno basicamente ambiental, com pouca influência de fatores genéticos.
- B O curso desse transtorno é variável, mas raramente os sintomas persistem na adolescência.
- C As taxas de incidência desse transtorno são mais elevadas em crianças com nascimento prematuro cujas mães tiveram infecções durante a gestação.
- D As anfetaminas, consideradas medicações de primeira escolha para esse transtorno, são agonistas serotoninérgicos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182687](#)

Questão 8 Sumário dos Tóxicos e Antídotos Intoxicações Exógenas

Em relação aos quadros de intoxicação exógena, assinale a alternativa correta.

- A O diagnóstico da intoxicação por opioide é feito por meio de dosagem na urina, que apresenta boa correlação com a gravidade dos sintomas.
- B A alcalinização da urina com bicarbonato de sódio está indicada em casos graves de intoxicação por benzodiazepínicos.
- C A intoxicação pelo etilenoglicol, rotineiramente, inicia-se com acidose metabólica com ânion gap diminuído, hiperventilação e edema agudo de pulmão.
- D O glucagon é o tratamento inicial de escolha no paciente intoxicado com betabloqueador, apresentando bradicardia e hipotensão sintomáticos.
- E Haloperidol é a droga de escolha para o controle da agitação e sintomas adrenérgicos nos quadros de intoxicação aguda por cocaína.

[4000182573](#)

Questão 9 Sumário dos Tóxicos e Antídotos

Menino, 2 anos de idade, é levado à UPA com relato de sonolência, náuseas e vômitos há 50 minutos. Após início do quadro, foi constatado que o menor ingeriu bolinhas de naftalina. A genitora informa ter colocado o produto, há dois dias, na gaveta que se encontrava aberta; que as bolinhas estavam em um pacote com 5 unidades, de menos de 1cm de diâmetro, e

que 3 delas foram encontradas.

Ao exame, criança hipoativa, hidratada, eupneica, corada, afebril. Observa-se hipersalivação. Sem outros achados anormais no momento.

No caso de ocorrer a complicação, considere as opções abaixo e indique a conduta adequada:

- ☐ A Administrar carvão ativado.
- ☐ B Fazer lavagem gástrica.
- ☐ C Administrar azul de metileno.
- ☐ D Administrar atropina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182423](#)

Questão 10 **Diagnóstico do Autismo** **Transtorno do Espectro Autista TEA**

Uma criança de quatro anos com deficiência intelectual e diagnóstico de síndrome de Down é avaliada por atraso de falo. Apresenta déficit de comunicação, socialização, estereotípias motoras e hipersensibilidade aos estímulos auditivos e táteis. Qual a provável comorbidade dessa criança?

- ☐ A Transtorno do movimento estereotipado.
- ☐ B Apraxia de fala na infância.
- ☐ C Transtorno do espectro autista.
- ☐ D Déficit de atenção e hiperatividade

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182109](#)

Questão 11 **Intoxicações Exógenas**

Uma mulher de 23 anos de idade foi encaminhada para a UTI, após tentativa de suicídio, com quadro de agitação, delirium, em midríase, hipertérmica, taquicárdica, hipertensa, pele seca, quente e avermelhada. As mucosas estão secas. A causa mais provável pela sintomatologia de intoxicação exógena da paciente, dentre as substâncias abaixo, é

- ☐ A tramadol.
- ☐ B diazepam.
- ☐ C aldicarb ("chumbinho").
- ☐ D imipramina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181688](#)

Questão 12 **Diagnóstico do TDAH** **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH**

Os pais levam Miguel de 8 anos para consulta, pois a diretora da escola disse que ele é desatento e tem dificuldade em aprender. A conduta inicial do médico da Atenção Primária nessa situação deve ser

- A encaminhar Miguel ao neuropediatra.
- B avaliar os ambientes familiar e escolar da criança.
- C solicitar avaliação adicional tanto auditiva como visual.
- D realizar testes de aptidão intelectual.
- E solicitar eletroencefalograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181667](#)

Questão 13 **Síndrome Anticolinérgica**

Jovem, 21 anos, é admitido no pronto atendimento com suspeita de intoxicação exógena por droga anticolinérgica. Acompanhantes que o trouxeram referem que estavam em uma festa tomando chá alucinógeno.

Assinale a alternativa que apresenta o quadro clínico mais compatível.

- A Midríase, hipertensão, taquicardia, hipertermia, hiperemia cutânea e mucosas secas.
- B Midríase, hipertensão, bradicardia, hipotermia, hiperemia cutânea e hipersecreção.
- C Miose, hipotensão, bradicardia, hipertermia, palidez cutânea e hipersecreção.
- D Miose, hipertensão, taquicardia, hipertermia, hiperemia cutânea e hipersecreção.
- E Midríase, hipotensão, bradicardia, hipotermia, palidez cutânea e mucosas secas.

4000181260

Questão 14 **Transtorno de Pânico** **Agorafobia** **Transtorno de Ansiedade Generalizada TAG**

Uma mulher de 43 anos compareceu a uma unidade de saúde da família, com queixas de estresse e ansiedade. Informa que iniciou, há 10 semanas, o tratamento com sertralina 50 mg/dia e que, nesse período, apresentou uma melhora discreta dos sintomas. Entretanto, nas últimas 4 semanas, tem tido ataques recorrentes de ansiedade intensa quando precisa sair de casa, o que tem limitado seu desempenho, inclusive para atividades do dia a dia, como ir ao supermercado e buscar os filhos no colégio. Conforme relato dela, no dia desta consulta, teve muita dificuldade para sair de casa.

Nesse caso, qual é a conduta adequada?

- A Prescrever um benzodiazepínico e encaminhar a paciente para a emergência de um hospital psiquiátrico.
- B Manter a sertralina na dose atual e monitorar a evolução da paciente.
- C Encaminhar a paciente para um serviço com psicoterapia estruturada e reavaliar a medicação em uso.
- D Substituir a sertralina por fluoxetina 20 mg, clonazepam 0,5 mg e clorpromazina 25 mg.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178615](#)

Questão 15 **Síndrome Anticolinérgica**

Pré-escolar de três anos de idade, sexo masculino, previamente hígido, foi levado à emergência, apresentando agitação psicomotora, midríase, boca seca e rubor facial. A mãe dele informou que tinha percebido os sintomas havia uma hora, ao chegar do trabalho. O menor fica em casa com a irmã, de 10 anos, durante o período da tarde, até a mãe retornar do trabalho.

Conforme o quadro clínico apresentado, trata-se de intoxicação por

- A dipirona.
- B salbutamol.
- C clorpromazina.
- D dexclorfeniramina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178537](#)

Questão 16 Antipsicóticos Síndrome Extrapiraminal SEP Intoxicações Exógenas

Pré-escolar de 3 anos e 4 meses de idade deu entrada no pronto-socorro apresentando rigidez e espasmos musculares e hipertermia. Não apresentava dificuldade respiratória. Ausculta cardíaca sem anormalidades. Sem história prévia de doença cardíaca. O paciente estava recebendo oxigenoterapia quando um primo dele, de quatro anos, deu entrada no mesmo hospital, com quadro semelhante. Ambos haviam passado as últimas 12 horas na casa da avó materna, que há anos faz tratamento de esquizofrenia e hipertensão arterial.

As evidências clínicas dessa história induzem a necessidade de o médico investigar

- A cardiopatia congênita cianótica.
- B intoxicação exógena por captopril.
- C intoxicação exógena de haloperidol.
- D ingestão exógena por benzodiazepínico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178532](#)

Questão 17 Psiquiatria Infantil

Uma médica da Estratégia de Saúde da Família percebeu que, nas consultas de Puericultura, houve um aumento das queixas de agitação, irritabilidade e tristeza nas crianças, durante o período da pandemia da COVID-19. Muitos genitores, preocupados com as mudanças comportamentais dos filhos, estão solicitando a prescrição de medicamentos e encaminhamentos para consulta com Psicólogos.

Nesse cenário, atenta à situação, a médica, em conjunto com a equipe de saúde, deve planejar e executar ações de saúde no território que contemplem esse novo momento.

Considerando as informações apresentadas e com base na Educação Popular em Saúde, a principal ação a ser realizada com as famílias dessas crianças é a

- A promoção de reuniões com profissionais do Centro de Atenção Psicossocial infantil e familiares para esclarecer o manejo medicamentoso dos casos.
- B escuta ativa das queixas trazidas pelos familiares, para a compreensão do problema e construção dialogada da solução.
- C utilização pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde de uma série de técnicas de convencimento dos familiares para evitar a medicalização do sofrimento das crianças.
- D elaboração de uma série de palestras informativas, com exposição das melhores evidências científicas para o tratamento das doenças neurodegenerativas da infância.

4000176680

Questão 18 **Transtornos Ansiosos** **Transtorno de Ansiedade Generalizada TAG**

Uma mulher com 30 anos de idade vem a primeira consulta na Unidade Básica de Saúde queixando-se de tonturas, tremores, tensão muscular e relata que há 1 mês apresentou três crises de palpitações repentinas, acompanhadas de dor em hemitórax esquerdo, com duração de até meia hora e resolução espontânea. Nega doenças pregressas, tabagismo, etilismo ou uso de outras drogas. Relata que procurou serviços de emergência três vezes achando que teria um infarto. Traz resultados recentes e normais de hemograma, TSH, perfil lipídico completo, glicemia, troponina e CPK e eletrocardiograma. Acredita que esses exames foram insuficientes e pede outros exames para ver se o coração está bem. Por exercer a prostituição desde a adolescência, faz exames rotineiramente para infecções sexualmente transmissíveis, últimos há 15 dias e com resultados negativos. Usa Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre há 5 anos e preservativo. Não teve filhos ou abortamento. Apresenta sono reparador, exceto quando tem as crises. Nega ideação suicida. Desde o início da pandemia da COVID-19 não faz mais programas. Exame físico inalterado.

Nesse caso, a melhor abordagem é

- A referenciar a paciente ao serviço de urgência e emergência para realização de novos eletrocardiogramas (ECG) e enzimas cardíacas e solicitar avaliação de especialistas focais.
- B solicitar novos exames para descartar outras doenças orgânicas de base e iniciar tratamento farmacológico com betabloqueador e benzodiazepínico.
- C explicar que novos exames são desnecessários, indicar atividades físicas, apoio psicológico e retorno, em um *continuum* de complexidade de tratamento.
- D explicar que novos exames são desnecessários, iniciar benzodiazepínico nas crises e antidepressivo tricíclico; indicar apoio psicológico e retorno em 6 semanas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176675](#)

Questão 19 **Psiquiatria Infantil**

O ensaio publicado em maio de 2020 pela Revista Ciência e Saúde Coletiva, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, intitulado "O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no contexto da Covid-19 e os riscos para violências autoinflingidas", traz reflexões referentes aos impactos do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e sobre o uso intensivo da internet entre crianças e adolescentes e suas possíveis consequências para a prática de violências autoinflingidas. Quanto à saúde mental de crianças e adolescentes, dentre as considerações abaixo, qual é considerada ERRADA:

- A Há algumas práticas de autoagressões, que não necessariamente envolvem transtornos de ordem emocional ou quadros depressivos e que são vistos como práticas culturais aceitas socialmente no universo online.
- B Não é considerada necessária a criação de protocolos e medidas exclusivas para os adolescentes quanto à prevenção das formas de violências autoinflingidas
- C O uso excessivo da internet pode também gerar uma forma de adição, um transtorno que gera dependência, podendo se expressar em várias formas: cyber sexo, relacional (das redes sociais), adição por jogos
- D Pode ocorrer acirramento de vulnerabilidades para ideações e tentativas de suicídio quando a criança ou o adolescente apresenta, previamente, condições específicas da saúde mental que demandem monitoramento

4000168723

Questão 20 **Psiquiatria Infantil** **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH**

Sobre transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), é correto afirmar:

- A Ocorre simultaneamente com outros transtornos emocionais, transtornos endocrinológicos, comportamentais e de aprendizagem.
- B Na faixa etária pediátrica, são contraindicados os psicoestimulantes e antidepressivos.
- C Crianças afetadas geralmente apresentam insucesso acadêmico, problemas de relacionamento interpessoal e baixa autoestima, com resolução na vida adulta.
- D É o terceiro transtorno neurocomportamental mais comum da infância.
- E O TDAH é caracterizado por desatenção, incluindo aumento da distração e dificuldade em manter a atenção; controle de impulso pobre e diminuição da capacidade de autoinibição; hiperatividade e inquietação motora.

4000163525

Questão 21 **Toxicologia ocupacional** **Intoxicação por Metais Pesados** **Intoxicações Exógenas**

Paulo, 57 anos, mecânico, tem histórico de antecedentes pessoais de diabetes há poucos meses, também um histórico de bebida alcoólica, e, às vezes, faz uso de drogas. Há dias vem sentindo fraqueza e muitas dores nas pernas, reclama que o simples toque provoca dores intensas, que lhe causam insônia. Diz que a dor se parece com algo que lhe queima as pernas, anda muito irritado, com dificuldades de concentração, redução da libido e dores abdominais. Ao exame físico, apresenta sudorese e com tremores nas extremidades. Sinais vitais: FC 90, FR 22, PA 160X100 mmHg e temperatura de 37,20 °C.

Qual é a neuropatia de Paulo?

- A Intoxicação por Chumbo
- B Uso abusivo de álcool
- C Hipovitaminose E
- D Diabetes Mellitus

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127905](#)

Questão 22 **Tratamento do TDAH** **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH**

A dificuldade de aprendizado é umas das principais queixas no período escolar, geralmente referida pelo professor como "aquele aluno que se relaciona mal com os colegas, desligado, parece que não se interessa por nada e se distrai facilmente com barulhos, por exemplo, quando um lápis cai ao chão." Sintomas dessa natureza vêm sendo diagnosticados como

Déficit de Atenção e têm levado à medicalização excessiva. O medicamento mais utilizado em crianças para esse problema é:

- A Metilfenidato.
- B Topiramato.
- C Carbamazepina.
- D Fenitoína.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127979](#)

Questão 23 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por um espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a comportamentos repetitivos e interesses restritos pronunciados. Os TEA apresentam ampla gama de severidade e prejuízos, sendo frequentemente a causa de deficiência grave, representando importante problema de saúde pública. Há uma grande heterogeneidade na apresentação fenotípica do TEA, em relação à configuração e severidade dos sintomas comportamentais. A atual dificuldade de identificação de subgrupos de TEA que poderiam direcionar tratamentos e viabilizar melhores prognósticos inibe progressos no desenvolvimento de novas abordagens de tratamento desses pacientes. Para fazer o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, analise os critérios diagnósticos abaixo especificados.

I - Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestados de todas as maneiras seguintes:

- a) Déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação social;
- b) Falta de reciprocidade social;
- c) Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento.

II - Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo menos duas das maneiras abaixo:

- a) Comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou comportamentos sensoriais incomuns;
- b) Excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento;
- c) Interesses restritos, fixos e intensos.

III - Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades.

IV- A gravidade baseia-se em prejuízo na comunicação social e em padrões de comportamento restritos e repetitivos. São critérios diagnósticos do DSM-V:

- A I, II, III e IV.
- B I, II e IV, apenas.
- C II, III e IV, apenas.
- D I e III, apenas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127975](#)

Questão 24 Tratamento do TDAH Diagnóstico do TDAH

Uma criança do sexo masculino com 8 anos de idade é atendida em consulta com médico de Unidade Secundária de Saúde para avaliação de transtorno de comportamento. A mãe relata que o filho perde material escolar com frequência, costuma esquecer as tarefas do dia-a-dia e demora a atender quando chamado pelo nome. Informa, ainda, que a criança é repreendida na escola por não parar no mesmo lugar, levantar-se o tempo todo da cadeira, falar demais e intrometer-se na conversa alheia, além de ter notas ruins. O exame clínico evidencia anormalidades. O diagnóstico e a conduta adequados ao caso são

- A desenvolvimento normal, com comportamentos comuns na infância; orientar a família.
- B transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; iniciar tratamento com risperidona.
- C transtorno de espectro autista; encaminhar o paciente para atendimento especializado.
- D transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; iniciar tratamento com metilfenidato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127927](#)

Questão 25 Intoxicação por Paracetamol Acetaminofeno

Uma menina com 4 anos de idade, pesando 18 kg, é trazida pelos pais ao Pronto Atendimento após detectarem que ela ingeriu 6 comprimidos de 750 mg de paracetamol há aproximadamente 3 horas. No momento da consulta, a criança apresenta náuseas e dor abdominal. Diante desse quadro, a conduta imediata é:

- A Administrar piridoxina.
- B Administrar N-acetilcisteína.
- C Administrar xarope de ipeca.
- D Realizar lavagem gástrica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126884](#)

Questão 26 Intoxicação por Metais Pesados

Um homem de 45 anos de idade procura a Unidade Básica de Saúde, queixando-se de redução da libido, dificuldade de concentração, perda de memória e formigamento nos braços e mãos. Relata também fadiga, cefaleia e constipação crônicas e afirma fazer tratamento para hipertensão arterial sistêmica e gota há 5 anos. Informa que trabalha com reforma de baterias de automóveis há mais de 30 anos, na garagem da sua casa, com pouca ventilação e espaço reduzido e que nunca fez uso de equipamentos de proteção. Com base nas informações apresentadas, a hipótese diagnóstica mais provável e os exames complementares necessários para confirmá-lo são

- A mercurismo; dosagem de mercúrio sérico e hemograma completo.
- B manganismo; dosagem de manganês sérico e hemograma com contagem de plaquetas.
- C saturnismo; dosagem de chumbo sérico e de ácido delta aminolevulínico (ALA-U) na urina.
- D benzenismo; dosagem de metahemoglobina sérica e de ácido transmucônico (AttM-U) na urina.

4000126869

Questão 27 Diagnóstico do Autismo

A Equipe de Saúde da Família (ESF) de uma Unidade Básica de Saúde observou aumento no número de crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor no seu território de atuação. Uma pesquisa mostrou que 90% desses casos são representados por filhos de imigrantes latinos, de língua espanhola, que trabalham em oficinas de costura. Após diversas visitas a essas oficinas de costuras, a equipe da ESF concluiu que o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é causado por falta de estímulo adequado: os pais trabalham ininterruptamente e não têm tempo de dispensar atenção e estímulo necessários a essas crianças, que ficam muito tempo deitadas, ao lado dos pais, enquanto eles costuram. Considerando os fatores ambientais, sociais e ocupacionais que prejudicam a saúde das crianças que vivem nessas condições, a ESF deve

- A encaminhar as crianças ao CAPS-infantil para iniciar tratamento medicamentoso.
- B notificar o Conselho Tutelar e denunciar à Polícia local os maus tratos recebidos pelas crianças.
- C encaminhar as crianças ao Serviço de Neurologia infantil de referência para exames complementadores de imagem.
- D realizar abordagem nas oficinas, envolvendo os membros da comunidade, a fim de conscientizá-los da falta de estímulo adequado às crianças e construir possíveis soluções.

4000126863

Questão 28 Toxicologia ocupacional Intoxicação por Agrotóxicos Intoxicações Exógenas

Numere os inseticidas recomendados pela Organização Mundial da Saúde para controle de vetores de acordo com os grupos químicos.

- 1 - Organofosforado
- 2 - Organoclorado
- 3 - Piretroide
- 4 - Carbamato

- () Alfacipermetrina
- () DDT
- () Malathion
- () Pririmifós-metil
- () Propoxur.

Assinale a sequência correta.

- A 2, 3, 2, 4, 1
- B 1, 4, 3, 2, 3
- C 4, 1, 4, 3, 2
- D 3, 2, 1, 1, 4

4000126980

Questão 29 **Síndrome Colinérgica** **Intoxicação por Carbamatos e Organofosforados**

Em relação à intoxicação por organofosforados e carbamatos, assinale a afirmativa CORRETA.

- A Os organofosforados apresentam mais receptores específicos no tecido neural quando comparados aos carbamatos.
- B Os carbamatos apresentam absorção mais rápida e intensa, sendo mais neurotóxicos.
- C Os carbamatos e os organofosforados reagem com os mesmos receptores, não diferindo nas manifestações clínicas e sua intensidade.
- D As manifestações neurológicas são mais frequentes e intensas com os organofosforados, por serem lipofílicos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126950](#)

Questão 30 **Transtornos Específicos de Aprendizagem**

Um menino de 10 anos de idade é trazido pelo pai à consulta pediátrica e relata grande dificuldade escolar do filho. O pai comenta que a professora queixou-se à família que a criança é dispersa em sala de aula, não acompanhando os colegas nas atividades propostas. Durante a consulta com o médico e enfermeira da Equipe de Saúde da Família, o menino comporta-se normalmente e responde de forma adequada às perguntas realizadas. Os exames físicos realizados indicam ausência de anormalidade ou alterações. Considerando as informações apresentadas, qual o conceito em que se deve basear um projeto terapêutico adequado ao caso?

- A O diagnóstico diferencial com distúrbios visuais e de audição é necessário em crianças mais jovens e dispensável no caso apresentado.
- B A compreensão do contexto familiar é necessária na avaliação de fatores associados ao baixo desempenho escolar, como violência e negligência.
- C As crianças com dificuldade escolar devem ser avaliadas por neuropediatra para definição da necessidade de uso de psicoestimulantes.
- D A família deve ser orientada a ser mais firme com a criança frente ao baixo desempenho, por meio de imposição de cronogramas mais rígidos para execução das tarefas escolares.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126645](#)

Questão 31 **Intoxicação por Carbamatos e Organofosforados**

Um homem de 23 anos de idade procura a Unidade de Saúde da Família mais próxima da fazenda em que trabalha com queixa de forte dor de cabeça, náuseas, dor abdominal em cólica e salivação excessiva. Apresenta-se prostrado e relata quatro episódios de vômitos. Ao exame clínico, o paciente apresenta dispneia e sudorese de intensidade leve a moderada após a pulverização da lavoura. Diante do caso de intoxicação por organofosforado que deve ser notificado à vigilância, qual a gravidade do caso e a conduta mais apropriada?

- A** Intoxicação aguda grave; atendimento inicial pela equipe, que estabiliza o paciente, solicita exames laboratoriais (hemograma completo com reticulócitos e dosagem da acetilcolinesterase) e acompanha o paciente no ambulatório.
- B** Intoxicação aguda moderada; atendimento inicial pela equipe, que administra hidratação oral e antiemético, para, então, encaminhá-lo ao Serviço de Urgência para diagnóstico clínico-laboratorial (incluindo a dosagem plasmática da acetilcolinesterase) e tratamento.
- C** Intoxicação aguda leve; atendimento inicial pelo médico da equipe, que prescreverá antiemético e solicitará exames laboratoriais (dosagem plasmática da acetilcolinesterase e glicemia de jejum), recomendando retorno breve para acompanhamento na Unidade de Saúde da Família.
- D** Intoxicação crônica leve; atendimento inicial pelo médico da equipe, que administra hidratação oral e antiemético, para, então, encaminhá-lo ao ambulatório especializado de referência em saúde do trabalhador para diagnóstico clínico-laboratorial (incluindo a dosagem de acetilcolinesterase) e tratamento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126586](#)

Questão 32 **Transtornos Específicos de Aprendizagem** **Psiquiatria Infantil**

Estudante, com 9 anos de idade, vem apresentando dificuldades de aprendizagem e atos de indisciplina frequentes em relação aos professores, principalmente aos novos, que tiveram de ser substituídos por três vezes nos últimos dois meses, por problemas de saúde. A escola solicitou que a mãe procurasse um "neurologista" para o menino, esta levou a criança inicialmente ao pediatra, referindo que ele tinha boa índole, ajudava nas tarefas de casa e tomava conta do irmão com 5 anos. Notou que tem apresentado notas mais baixas e reclama muito dos professores ultimamente. Nega atos indisciplinados que não sejam próprios da idade. O menino não gosta de ficar na rua, costuma brincar em casa e jogar futebol no final de semana com os amigos e primos. Em casa não tem computador e a mãe acha que esse é o motivo do mau desempenho escolar. A criança perdeu o pai há um ano, vítima de atropelamento. Ao exame físico, o pediatra não encontrou alterações. Com base nessa narrativa, a suspeita clínica e a conduta do pediatra devem ser:

- A** transtorno de distúrbio de comunicação (provavelmente linguagem); encaminhar para avaliação com o neurologista infantil.
- B** déficit de atenção e hiperatividade; encaminhar para avaliação com o neurologista e com o psiquiatra infantil.
- C** comportamento aceitável para a idade; avaliar melhor com seguimento e então decidir se encaminha ao psiquiatra infantil.
- D** comportamento antissocial decorrente da perda familiar; encaminhar de imediato para avaliação com o psiquiatra infantil.
- E** transtorno de conduta (comportamento desafiador opositor); encaminhar para avaliação com o psiquiatra infantil.

4000127218

Questão 33 **Reforma Psiquiátrica e Psiquiatria Social** **Transtornos Específicos de Aprendizagem**

Criança com 11 anos de idade, frequentando o quarto ano do ensino fundamental, é encaminhada ao pediatra pela escola por apresentar indisciplina e problemas de aprendizagem. A diretora solicita encaminhamento para o neurologista, psicólogo e oftalmologista. Na consulta em Unidade Básica de Saúde, a mãe conta que a classe da criança já teve três trocas de professora no ano corrente, e que em casa a criança é muito esperta e cuida do irmão de 5 anos, no horário em que ela está trabalhando. Levando em consideração a Reforma Psiquiátrica Brasileira, o Movimento de Luta Antimanicomial e a Política Nacional de Saúde Mental, a conduta adequada é:

- A Valorizar o prejuízo que a criança já tem em decorrência do atraso na escolarização, instituindo tratamento clínico para transtorno de hiperatividade e déficit de atenção com ritalina e psicoterapia no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
- B Prevenir a piora do quadro e a possibilidade de internação em hospital psiquiátrico por intermédio da pronta referência do caso ao psiquiatra, antes que ocorra recrudescimento e seja imperioso o tratamento manicomial.
- C Agendar os procedimentos ambulatoriais requisitados, em cumprimento ao princípio da intersetorialidade da Lei n.º 8.080/1990, com cobertura pelo benefício financeiro do Programa "De Volta Para Casa".
- D Acionar o Conselho Tutelar mediante denúncia de bullying e assédio moral da escola contra a criança, pela repetência serial e tentativa de culpabilizar a vítima pelo próprio agravo sofrido.
- E Orientar a mãe a respeito da possibilidade de o comportamento da criança dever-se a situações sociais do entorno escolar e/ou doméstico, e viabilizar contato da Equipe de Saúde da Família com a escola.

4000127156

Questão 34 Estabilizadores do Humor Intoxicação por Lítio

Uma mulher de 47 anos de idade encontra-se em tratamento de longa data para transtorno do humor. Comparece ao ambulatório com queixa de astenia, sonolência, alteração na fala, intolerância ao frio, constipação intestinal e déficit de memória. Ao exame, nota-se frequência cardíaca = 55 bpm, pele seca e descamativa, reflexos tendinosos diminuídos bilateralmente. O quadro clínico apresentado está relacionado a efeito adverso do tratamento com:

- A lítio.
- B fluoxetina.
- C paroxetina.
- D amitriptilina.
- E inibidores da mono-amino-oxidase

4000129290

Questão 35 Psiquiatria Infantil

Quanto ao comportamento na adolescência, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A Para se autoafirmar, o jovem agride e desvaloriza seus pais, embora goste e necessite deles.
- B O adolescente investe calorosamente em tudo o que faz; a entrega é total e a paixão juvenil.
- C Na busca de si mesmo e da identidade adulta, o adolescente substitui o grupo pelos pais.
- D Questiona os valores, afasta-se da família em busca de novos modelos de identificação.
- E Dentro do padrão, existe a individualização: os turbulentos, os contestadores, os alegres e os tristes.

4000153814

Respostas:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | A | 2 | B | 3 | C | 4 | E | 5 | C | 6 | D | 7 | C | 8 | D | 9 | C | 10 | C | 11 | D |
| 12 | B | 13 | A | 14 | C | 15 | D | 16 | C | 17 | B | 18 | C | 19 | B | 20 | E | 21 | A | 22 | A |
| 23 | A | 24 | D | 25 | B | 26 | C | 27 | D | 28 | D | 29 | D | 30 | B | 31 | B | 32 | C | 33 | E |
| 34 | A | 35 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |