

**Questão 1** **Pediatria** **Técnicas de amamentação**

Lactente de 30 dias, portadora de síndrome de Down, apresenta sucção fraca e dificuldade de ganho de peso. Ela necessita ser encaminhada para acompanhamento de equipe multidisciplinar.

Nessa situação, a orientação inicial a ser dada à mãe é

- ☐ A oferecer o seio, realizar ordenha de 3 em 3 horas e iniciar fórmula de partida à noite.
- ☐ B estimular a região perioral da criança e iniciar fórmula de partida exclusiva, para evitar broncoaspiração.
- ☐ C evitar oferecer o seio, mesmo que a criança estabeleça coordenação entre sucção, deglutição e respiração.
- ☐ D contraindicar amamentação, pois a hipotonia dificulta o aleitamento materno.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178552](#)

**Questão 2** **Pediatria** **Amamentação Aleitamento Materno**

O aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar são temas cruciais na prática do médico de Família e Comunidade da equipe de Atenção Primária à Saúde (APS). Em relação aos benefícios do aleitamento materno, é correto afirmar que:

- ☐ A aumenta a perda de peso inicial do recém-nascido, mas favorece sua recuperação
- ☐ B em relação aos benefícios maternos, leva a recuperação do peso pré-gestacional de forma mais lenta
- ☐ C períodos mais prolongados de amamentação reduzem a probabilidade da criança evoluir com obesidade
- ☐ D diminui a morbidade especificamente relacionada às infecções, mas não reduz o risco de hospitalização por bronquiolite

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171026](#)

**Questão 3** **Pediatria** **Amamentação Aleitamento Materno**

A prática bem-sucedida do aleitamento depende, em grande parte, das orientações recebidas pelas mães. A composição bioquímica do leite materno é altamente específica, atendendo às necessidades nutricionais e assegurando um ótimo padrão de crescimento e desenvolvimento. Com relação ao leite materno, assinale a alternativa correta.

- ☐ A A frutose é o carboidrato predominante no leite.
- ☐ B Os ácidos graxos de cadeia longa não estão presentes no leite humano.
- ☐ C A água contribui com 30% da composição do leite materno.
- ☐ D O leite materno apresenta, proporcionalmente, mais caseína que proteínas do soro (lactoalbuminas), sendo semelhante ao leite de vaca.
- ☐ E O fator bifidogênico propicia o crescimento de uma microbiota intestinal adequada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170601](#)

#### Questão 4 Amamentação Aleitamento Materno

Sobre o aleitamento materno, é correto afirmar que

- A as fases do leite materno são duas: o colostro e o leite maduro, sendo que o primeiro contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro.
- B o leite materno apresenta composição semelhante para todas as mulheres, porém é individualizado para cada mãe e seu bebê.
- C o leite do Banco de Leite Humano é pasteurizado e está disponível para todos os bebês cujas mães não conseguem amamentar.
- D há a indicação de suspender a amamentação em caso de infecção da mãe pela covid-19.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170006

#### Questão 5 Duração do aleitamento materno Amamentação Aleitamento Materno

Segundo o Ministério da Saúde, os primeiros dias após o parto são fundamentais para o sucesso da amamentação. Assinalar a alternativa que apresenta um aspecto que deve ser abordado com as mães que planejam amamentar seus filhos:

- A Importância de oferecer água no intervalo das mamadas nos meses de verão, pelo elevado risco de desidratação.
- B Recomendação quanto à duração da amamentação de dois anos ou mais, sendo exclusiva somente nos primeiros quatro meses.
- C Cuidar com o tempo de mamada em cada seio, controlando para que sejam sempre iguais.
- D Importância de oferecer o aleitamento materno sob livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser mamar.

4000169490

#### Questão 6 Pediatria Amamentação Aleitamento Materno

O leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido, com evidências de inúmeros efeitos positivos da amamentação na saúde ao longo da vida. Em relação ao aleitamento materno, a suas indicações e a seus benefícios, assinale a alternativa correta.

- A O aleitamento materno deve ser praticado e estimulado e o leite materno deve ser ofertado de forma exclusiva até os seis meses de vida.
- B O aleitamento materno não diminui, de forma significativa, o risco de morte em lactentes por doenças como diarreia e infecções respiratórias.
- C Além de ser um alimento, o leite materno contém hormônios, fatores de crescimento, anticorpos e bactérias, que não são benéficas à saúde do bebê.
- D O aleitamento materno não diminui o risco de doenças metabólicas na vida adulta, como, por exemplo, obesidade e diabetes *mellitus*.
- E O contato pele a pele ao nascimento (*golden hour*) está estreitamente relacionado ao sucesso do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000169410

#### Questão 7 Retorno da mulher ao trabalho

A mãe de um lactente de quatro meses em aleitamento materno exclusivo procura orientação porque vai trabalhar em 15

dias. A orientação adequada é que a mãe retire seu leite e armazene em frascos de vidro com tampa plástica:

- A** Na geladeira por até 02 horas ou congelador/freezer por até 12 horas, oferecer preferencialmente no copinho.
- B** Na geladeira por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas, oferecer preferencialmente por copinho.
- C** Na geladeira por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas, oferecer preferencialmente por mamadeira.
- D** Na geladeira por até 24 horas ou congelador/freezer por até quatro semanas, oferecer preferencialmente por mamadeira.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168924](#)

#### **Questão 8**   **Pediatria**   **Amamentação Aleitamento Materno**

Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa CORRETA:

- A** Em regiões muito secas e quentes, pode ser necessário completar a amamentação de crianças de 4 a 6 meses com água filtrada para evitar a desidratação.
- B** O leite materno, até os 6 meses de idade da criança, quando oferecido exclusivamente, fornece a quantidade necessária de vitamina D e zinco para a criança.
- C** Em mulheres que possuem mamilos planos ou invertidos é importante já no pré-natal orientar exercícios de tração para os mamilos no intuito de torná-los preparados para a amamentação.
- D** Na situação em que ocorre mastite e que pode cursar com infecção bacteriana, o tratamento com antibiótico adequado pode ser necessário e a amamentação pode ser mantida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168719](#)

#### **Questão 9**   **Amamentação Aleitamento Materno**

Paciente grávida de 3 meses (gestação prévia e atual sem intercorrências) demonstrou interesse em continuar amamentando o filho de 2 anos após o nascimento do bebê, mas tinha dúvida de que seu desejo pudesse ser prejudicial para a gestação ou para alguma das crianças. Qual a recomendação mais adequada nessa situação?

- A** Desmamar o filho mais velho imediatamente.
- B** Desmamar o filho mais velho gradualmente antes do nascimento do outro filho.
- C** Desmamar o filho mais velho assim que o outro filho nascer.
- D** Manter a amamentação do filho mais velho se essa for a vontade materna.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168263](#)

#### **Questão 10**   **Situações em que há restrições ao aleitamento materno**

O aleitamento materno será permitido em um lactente de 6 meses de idade quando se trata de

- A lactante com citomegalovírus em uso de ganciclovir há 15 dias.
- B lactante portadora de vírus HTLV 1.
- C lactante em tratamento para tuberculose pulmonar com etambutol há 4 semanas.
- D lactante em uso de amiodarona por taquicardia ventricular há 60 dias.
- E lactante epiléptica em uso de zonisamida.

4000167532

**Questão 11** **Pediatria** **Situações em que há restrições ao aleitamento materno**

São fatores que interferem na amamentação, exceto:

- A Hipogalactia.
- B Incentivo da mídia ao uso de fórmulas infantis.
- C Prótese mamária.
- D Depressão materna pós-parto.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166582](#)

**Questão 12** **Pediatria** **Situações em que há restrições ao aleitamento materno**

Na vigência de infecção materna por HTLV 1 e 2, a lactação deve ser

- A suspensão, exceto em situações socioeconômicas específicas.
- B mantida até no máximo doze meses.
- C mantida por pelo menos três meses.
- D suspensão, exceto quando a carga viral materna estiver indetectável.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166417](#)

**Questão 13** **Pediatria** **Situações em que há restrições ao aleitamento materno**

Recém-nascido a termo, peso de nascimento de 3 250 g, adequado para a idade gestacional, nascido de parto cesáreo, chega à primeira consulta com dez dias de vida. A mãe é primípara e hígida. Atualmente, a criança está recebendo leite materno em pequena quantidade e fórmula láctea a cada três horas, iniciada há um dia. Ao exame, observa-se fissuras em ambos os mamilos; à tentativa de amamentar, a criança abocanha o mamilo e a mãe apresenta dor intensa. Assinale as medidas que poderiam ter sido adotadas para evitar a situação atual.

- A Observação com correção do posicionamento e da pega desde as primeiras mamadas e continuidade da orientação após a alta
- B Suplementação com fórmula apropriada em bico ortodôntico, orientada antes da alta hospitalar e uso de conchas para amamentação
- C Aumento do intervalo entre as mamadas, estímulo à sucção com uso de chupeta e uso de sutiã apropriado para lactantes.
- D Uso de hidratante na região da aréola durante a gestação e introduzir o dedo indicador na boca da criança para interromper a sucção se for necessário.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166291](#)

**Questão 14** **Pediatria** **Amamentação Aleitamento Materno**

Uma gestante com quadro de febre há dois dias, tosse, coriza e anosmia deu entrada na maternidade em trabalho de parto. Está na 39ª semana de gestação e nega contato com outras pessoas com síndrome gripal. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- A A amamentação é contraindicada e deve ser oferecida uma fórmula infantil em copinho para o neonato até que os resultados dos exames da mãe sejam recebidos.
- B A amamentação é contraindicada e deve ser oferecido leite materno ordenhado para o neonato até que saiam os resultados dos exames da mãe.
- C A amamentação é contraindicada e deve ser oferecido leite materno pasteurizado para o neonato até que saiam os resultados dos exames da mãe.
- D Não há contraindicação à amamentação nem ao aleitamento materno, independentemente do resultado dos exames da mãe, mas, mesmo que haja leite materno excedente, há contraindicação para a doação de leite humano.
- E Não há contraindicação à amamentação nem ao aleitamento materno, independentemente do resultado dos exames da mãe e, se houver leite materno excedente, não há contraindicação para a doação de leite humano.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166143](#)

**Questão 15** **Prevenção e manejo dos principais problemas relacionados à amamentação** **Pediatria**

Menina, 15 dias de vida, nascida a termo, em aleitamento materno exclusivo, está mamando mais vezes e por mais tempo nos últimos 3 dias. A mãe sente-se cansada e teme que seu leite não seja mais suficiente. Não sente mais o peito tão cheio como nos primeiros dias após o nascimento. O exame físico do bebê é normal, e o ganho de peso foi de 28 g/dia. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico adequado ao quadro.

- A A criança precisa de contato com o corpo da mãe; acomodar o bebê junto ao corpo com ajuda de faixas vai normalizar as mamadas.
- B É o início do período de cólicas do primeiro trimestre, com o uso de paracetamol a cada 8 horas, as mamadas serão mais espaçadas.
- C A produção de leite é insuficiente, prescrever metoclopramida para estímulo de produção de leite e suplementar com fórmula láctea durante o período noturno, para o descanso da mãe.
- D A mãe retornou aos ciclos hormonais pré-gestacionais; deve ingerir mais líquidos e retornar para reavaliação em 15 dias.
- E A criança experimenta período de aceleração de crescimento e as mamadas voltarão ao ritmo habitual de 2 a 3 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165282](#)

**Questão 16** **Pediatria** **Situações em que há restrições ao aleitamento materno**

O aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar são temas cruciais na prática do médico de família e comunidade e da equipe multiprofissional na Atenção Básica à Saúde. Assinale a alternativa que apresenta a condição materna que contraindica permanentemente o aleitamento materno.

- A Mastite aguda.
- B Tuberculose bacilífera.
- C Infecção por coronavírus.
- D Uso de anti-inflamatórios não esteróides.
- E Portadora do vírus da imunodeficiência humana.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165171](#)

**Questão 17** **Retorno da mulher ao trabalho** **Pediatria**

Mãe amamentando seu filho de quatro meses exclusivamente no peito retornou ao trabalho. Foi orientada a retirar e guardar o seu leite para ser oferecido a seu filho enquanto estiver fora de casa. Analise as seguintes orientações dadas à mãe:

- I. O leite retirado da mama pode ser conservado em geladeira por até 12 horas e no freezer ou no congelador por até 15 dias.
- II. O leite materno retirado deve ser oferecido, de preferência, em um copo, uma xícara ou uma colher.
- III. O leite materno retirado não deve ser fervido e nem levado ao micro-ondas, apenas aquecido em banho-maria.

Quais estão corretas?

- A Apenas I e II.
- B Apenas I e III.
- C Apenas II e III.
- D I, II e III.

**Questão 18**    **Prevenção e manejo dos principais problemas relacionados à amamentação**    **Pediatria**

Criança de 2 meses e 10 dias de idade, internada por bronquiolite viral aguda, com possibilidade de realimentação após um breve período de suspensão alimentar. Vinha recebendo aleitamento materno exclusivo. A mãe, 19 anos de idade, há dois dias apresenta doença diarreica, sem muco ou sangue. Em relação ao aleitamento materno, dentre as recomendações seguintes, a melhor para este caso é:

- A** liberar o aleitamento materno, com os devidos cuidados higiênicos.
- B** contraindicar o aleitamento materno pelo período de duração da diarreia.
- C** introduzir fórmula láctea para complementar o aleitamento.
- D** liberar o aleitamento uma semana após o término da diarreia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164404

**Questão 19**    **Pediatria**    **Leite Materno X Outros leites**

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o Aleitamento Materno (AM) por 2 anos ou mais, sendo esse de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Essa recomendação se deve a importância que o Leite Materno (LM) ter não apenas os aspectos nutricionais, mas também imunológicos e do desenvolvimento. Sobre a composição do LM, é CORRETO afirmar que:

- A** Apesar de rico em nutrientes, a parcela do leite que corresponde a água é baixa, sendo assim importante para a lactante sempre complementar o aleitamento ofertando água para o neonato, de forma a manter a sua hidratação.
- B** O teor energético do leite não se mantém fixo durante toda a mamada, sendo sua concentração de gorduras no leite posterior mais alto, o que torna muito importante a criança fazer um bom esvaziamento da mama, garantindo uma maior saciedade e energia.
- C** O leite maduro só é secretado por volta do 10º dia pós-parto, sendo nos primeiros dias a secreção chamada colostro. São características desse colostro concentrações menores de proteínas e maiores de gorduras, quando comparado ao leite maduro, e também seu alto teor de imunoglobulinas, principalmente a IgA.
- D** O leite materno, embora rico em ferro, contém baixas concentrações das vitaminas K e D, o que faz com que a suplementação dessas vitaminas sejam recomendadas. A vitamina K é suplementada ao nascer, e a vitamina D é suplementada diariamente até os 18 meses, para crianças com baixa exposição regular ao sol.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000163784

**Questão 20**    **Pediatria**    **Amamentação Aleitamento Materno**

Na Atenção Básica de Saúde você atende uma puérpera amamentando seu filho de 45 dias de vida. Ela informa suas dúvidas acerca do bem estar do filho por causa do ritmo de mamadas, do sono e do ganho de peso dele. Qual a alternativa correta em relação a tais aspectos?



- A Se a mãe estiver acima do peso é recomendável iniciar dieta para emagrecimento e aumentar a ingestão de líquidos.
- B Se o bebê dorme bem, está ganhando peso (curva de crescimento revela percentil 15, a quantidade de leite deve estar sendo suficiente para ele.
- C Essa puérpera deveria ter uma alimentação saudável, tomar líquidos em quantidade suficiente para saciar a sede e incluir alimentos hipercalóricos.
- D Se após a mamada, a mãe percebe que o bebê está satisfeito, mas ela ainda tem muito leite, deveria continuar oferecendo a mama até sentir que elas esvaziaram.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163689](#)

**Questão 21** **Pediatria** **Situações em que há restrições ao aleitamento materno**

Janaína, primigesta, procura o posto de saúde porque está apresentando, ao amamentar, “dor no bico do peito” desde a segunda semana pós-parto. No exame da mama, o pediatra identifica fissura mamilar. A conduta mais importante neste caso é:

- A Amamentar na mesma posição.
- B Avaliar a mamada e corrigir a técnica de amamentar.
- C Passar o próprio leite nos mamilos após as mamadas e secar ao ar livre.
- D Usar, na aréola e nos mamilos, produtos (cremes ou pomadas) cicatrizantes.
- E Manter os mamilos secos, trocando com frequência os forros absorventes usados.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163575](#)

**Questão 22** **Pediatria** **Situações em que há restrições ao aleitamento materno**

Letícia teve seu primeiro filho há 5 dias; um recém-nascido do sexo masculino, a termo, com peso e comprimento dentro da normalidade. A mesma apresentou lesões vesiculares na comissura labial hoje, sem outras queixas até o momento. A conduta recomendada quanto ao aleitamento materno é:

- A Prescrever leite humano pasteurizado de banco de leite e isolar o recém-nascido de sua mãe até a fase de crostas.
- B Orientar leite materno ordenhado, isolar o neonato de sua mãe até a fase de crostas e administrar aciclovir ao recém-nascido.
- C Contraindicar o aleitamento materno temporariamente, oferecer fórmula láctea e isolar o recém-nascido de sua mãe até a fase de crostas.
- D Manter o aleitamento materno ao seio, com lavagem de mãos, uso de máscara e proteção das lesões do contato direto com o recém-nascido.
- E Manter o aleitamento materno ao seio, com lavagem de mãos, uso de máscara e proteção das lesões do contato direto com o recém-nascido e administrar VZIG ao mesmo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163574](#)

**Questão 23** **Fases do leite materno** **Pediatria**

Nos primeiros dias, o leite materno, chamado de colostro, possui características próprias e adequadas ao recém-nascido a termo.



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, suas características.

- A Contém menos água e mais carboidrato do que o leite maduro.
- B Contém mais lactose digerível e mais sódio do que o leite maduro.
- C Contém mais gordura e mais sais minerais do que o leite maduro.
- D Contém mais ferro e mais gordura do que o leite maduro.
- E Contém mais proteína e menos gordura do que o leite maduro.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163289](#)

**Questão 24** Prevenção e manejo dos principais problemas relacionados à amamentação **Pediatria**

Um recém-nascido com 37 semanas e 2 dias, nascido de parto cesárea por descompensação materna. Peso de nascimento de 3150kg, APGAR 8/9, sem necessidade de reanimação em sala de parto. Durante a visita em alojamento conjunto após 15 horas de vida, a mãe questiona que o recém nascido está "com muita fome, pois não tenho leite". Exames físicos sem alterações, avaliação da mamada com boa técnica, sem saída de leite quando a mãe faz expressão manual das mamas.

Qual seria a melhor conduta frente a esse quadro?

- A Prescrever translactação com fórmula infantil.
- B Orientar ordenha manual nos intervalos das mamadas.
- C Prescrever lactogogos (como a domperidona) para a mãe.
- D Informar a mãe sobre a quantidade de leite produzida nos primeiros dias, que geralmente é pequena mesmo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000151660](#)

**Questão 25** Amamentação e uso de medicações e outras substâncias

Sobre as características farmacológicas das substâncias e seu uso por lactantes, assinale a alternativa correta.

- A Fármacos com alto peso molecular atingem mais facilmente o leite materno que aqueles com peso molecular menor.
- B Fármacos com alta afinidade a proteínas plasmáticas apresentam maior facilidade para atingir o compartimento lácteo, uma vez que os fármacos passam para o leite materno ligados às proteínas plasmáticas.
- C Fármacos lipossolúveis apresentam mais dificuldade para atingir o compartimento lácteo.
- D Fármacos de ação longa mantêm níveis circulantes por maior tempo no sangue materno, mas, por terem efeito mais duradouro e lento, não passam para o leite materno.
- E Fármacos com baixa biodisponibilidade são ideais para uso durante a lactação porque, mesmo quando presentes no leite, são pouco ou nada absorvidos pelo lactente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147033](#)

**Questão 26** **Pediatria** Amamentação Aleitamento Materno

O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 6 meses de idade devido a inúmeros benefícios para a saúde da mãe e do bebê. Em relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa correta.

- A O leite materno tem maior quantidade de cálcio em comparação aos níveis desse mineral presentes no leite de vaca, favorecendo o melhor desenvolvimento ósseo da criança.
- B O leite materno possui maior quantidade de proteínas em relação ao leite de vaca, por isso as crianças amamentadas apresentam melhor ganho pômdero-estatural do que as crianças que recebem leite de vaca.
- C O leite de vaca apresenta quantidades excessivas de carboidratos, por isso, crianças não amamentadas têm maior tendência a desenvolver obesidade.
- D Os oligossacarídeos do leite materno são componentes biologicamente ativos, que modulam de forma benéfica a composição da microbiota intestinal.
- E O leite materno possui quantidades elevadas de ferro, zinco e sais minerais, por isso, crianças que recebem leite materno não necessitam receber profilaxia de anemia ferropriva enquanto durar a amamentação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146360](#)

**Questão 27** Amamentação Aleitamento Materno Obstetrícia

Segundo o Ministério da Saúde, em qual das situações abaixo o aleitamento materno está contraindicado?

- A HIV positivo, em uso regular de terapia antirretroviral, com carga viral indetectável.
- B HBsAg reagente, HBeAg reagente e carga viral para HBV > 200.000 UI/mL.
- C Herpes zoster ativo em região de dorso.
- D COVID-19 assintomática.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144693](#)

**Questão 28** Pediatria Amamentação Aleitamento Materno

O aleitamento materno, além de alimentar a criança, protege mãe e filho contra algumas doenças e promove o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e o bem-estar físico e psíquico da díade mãe-filho. No aleitamento materno é correto afirmar:

- A A composição e aspecto do leite materno é bastante heterogêneo e varia com a alimentação, idade e raça da mãe.
- B Nos primeiros dias de amamentação, a secreção láctea é chamada de colostro, que contém mais lipídio e menos proteína do que o leite maduro, e é rico em imunoglobulinas, em especial a IgG.
- C O leite materno contém altas concentrações de vitamina K, vitamina D e ferro.
- D Alguns dos fatores de proteção do leite materno são totalmente ou parcialmente inativados pelo calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5°C por 30 minutos) não tem o mesmo valor biológico que o leite cru.

Essa questão possui comentário do professor no site [400014432](#)

**Questão 29** Fórmulas infantis Pediatria

Uma menina de 5 meses de idade foi amamentada exclusivamente ao seio até 15 dias atrás, pois a mãe voltou a trabalhar em tempo integral, inclusive ficando 3 dias por semana fora da cidade. No momento a criança fica com a avó e está recebendo leite de vaca pasteurizado sem diluição, cerca de 120 ml por mamada, a cada 3 horas, também de madrugada. A criança pesa 6 Kg, tem desenvolvimento adequado e não tem queixas. Você orienta a mãe que a fórmula infantil é mais adequada do que o leite de vaca, na falta do leite materno. Como você orientaria o preparo da fórmula infantil para esta lactente?

- A Preparar 120 ml de fórmula infantil diluindo 3 medidas do pó nesse volume de água.
- B Preparar 150 a 180 ml de fórmula infantil diluindo 5 medidas do pó em 150 ml ou 6 medidas em 180 ml de água.
- C Preparar 150 a 180 ml de fórmula infantil diluindo 3 medidas do pó em 150 ml ou 4 medidas em 180 ml de água.
- D Preparar 120 ml de fórmula infantil diluindo 4 medidas do pó nesse volume de água.

4000144282

**Questão 30** Fases do leite materno Pediatria

Em relação ao leite materno, identifique as seguintes afirmações como verdadeiro ou falso.

- I – O colostro contém mais proteínas e menos lipídios que o leite maduro
- II – A principal imunoglobulina do leite materno é a IgG
- III – Durante a mamada, o teor de gordura aumenta e o leite no fim da mamada é mais rico em teor calórico

- A Todas são verdadeiras.
- B I e II são verdadeiras.
- C II e III são verdadeiras.
- D I e III são verdadeiras.
- E Todas são falsas.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144069

**Questão 31** Pediatria Fases da lactação

Em relação à composição do leite humano está correto afirmar que:

- A A água é, proporcionalmente, o maior constituinte presente no leite humano
- B O ferro presente no leite humano apresenta-se quelado pela lactoalbumina
- C O fator bifido do leite humano alcaliniza as fezes dificultando o crescimento de patógenos.
- D O leite humano maduro não apresenta imunoglobulinas da classe IgA.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000142948

**Questão 32** Amamentação Aleitamento Materno Obstetrícia

Em relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa correta.

- A As infecções maternas por retrovírus como o HTLV1 e HTLV2 são contraindicações relativas para a amamentação, devendo-se analisar a carga viral materna.
- B O Ministério da Saúde não contraindica a amamentação em mães infectadas pelo vírus da hepatite C, porque, apesar de teoricamente possível, a transmissão pelo leite materno não foi documentada.
- C A mãe que usa medicamento contínuo deverá amamentar a criança logo após a sua ingestão, de forma a haver um período de tempo de, pelo menos, meia hora até a próxima mamada.
- D No recém-nascido cardiopata, a amamentação está contraindicada devido à possibilidade de aumento do trabalho cardíaco.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141607](#)

**Questão 33** COVID 19 Amamentação Aleitamento Materno

Gestante saudável, sem morbidades pregressas, 39 semanas de idade gestacional. No momento do parto está clinicamente bem e com infecção pelo SARS-CoV-2.

**A CONDUTA COM O RECÉM-NASCIDO (RN) APÓS O PARTO É:**

- A Separar mãe do RN por 14 dias e contraindicar o aleitamento materno.
- B Separar mãe do RN por 14 dias e oferecer leite materno ordenhado.
- C Manter mãe e RN em quarto privativo e contraindicar o aleitamento materno.
- D Manter mãe e RN em quarto privativo e promover o aleitamento materno.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141140](#)

**Questão 34** Importância do aleitamento materno Pediatria Orientações gerais de puericultura Sinais de alerta

O agente comunitário traz para a reunião da equipe de Saúde da Família o caso de uma puérpera de 17 anos de idade que está em casa com seu recém-nascido (RN) de 3 dias de vida, após alta do Hospital Universitário naquele dia. Fez pré-natal na Unidade Básica de Saúde a partir dos cinco meses de gestação, sem intercorrências e os exames de rotina foram normais. Segundo informações do hospital, a criança nasceu de parto vaginal, a termo, Peso= 2.800g, sem intercorrências. Saiu do hospital com aleitamento materno exclusivo, recebeu BCG e uma dose da vacina para o vírus da hepatite B, foi registrada.

Qual é a medida imediata que deve ser adotada neste caso?

- A Agendar para a semana seguinte uma consulta médica com o pediatra do Hospital Universitário pois a primeira semana de vida é o período de maior risco para esse RN de mãe adolescente.
- B Agendar uma consulta com o médico de família quando o RN fizer 1 mês de vida, pois a gestação foi de baixo risco, não houve intercorrências no parto e a criança nasceu saudável.
- C Inscrever a puérpera no grupo de apoio às mães adolescentes que fazem encontros semanais, para que ela possa receber orientações sobre os cuidados com o RN.
- D Realizar uma visita domiciliar ainda na primeira semana de vida do RN para verificar a saúde do binômio mãe-filho, e garantir a manutenção da amamentação exclusiva.

4000140662

**Questão 35** Prevenção e manejo dos principais problemas relacionados à amamentação Pediatria

São contra indicações à amamentação, exceto:

- A Galactosemia
- B Psicose puerperal sem avaliação psiquiátrica
- C Tuberculose pulmonar ativa materna
- D Uso materno vigente de amiodarona
- E Infecção pelo HTLV

Essa questão possui comentário do professor no site [4000131018](#)

**Questão 36** Como devem ser as mamadas ao longo do dia

**Prevenção e manejo dos principais problemas relacionados à amamentação**

**Início da amamentação**

Menino, de 15 dias de vida, foi levado a UESF para consulta de puericultura pela mãe e a avó paterna. Mãe relata que seu leite é fraco, que não sustenta o filho, ele chora muito, acha que tem muitas cólicas. Há uma semana vem oferecendo água (que ele não aceita), chás de erva-doce e de camomila sem açúcar. Há 5 dias a avó comprou leite em pó e está complementando à noite com uma mamadeira de leite + 1 colher de chá de Maizena e ofereceu chupeta, ele passou a dormir melhor. AF: mãe 18 anos, G1P1AO, solteira, não fez pré-natal, parto cesariana. PN: 3.100g, C= 49 cm, PC: 34 cm, Apgar 8 e 9. Vacinas BCG e Hepatite B. Peso atual: 3.180g. Exame físico sem alteração. Após, o médico pediu para colocar a criança para sugar e observou que a mãe faz uso de protetores (intermediários) de mamilos, diz que é para diminuir a dor e evitar o trauma dos mamilos. Porém, chorou de dor quando o filho começou a sugar. Pediu permissão para examinar as mamas da mãe: estavam túrgidas, distendidas, os mamilos pouco protusos com fissuras perimamílares bilateralmente, à expressão manual saída de leite fluido. O médico percebeu que o risco de desmame precoce é alto e a sua prevenção é muito importante. Analise as orientações seguintes:

I - Retirada da mamadeira e da chupeta.

II- Amamentação com técnica adequada (posicionamento e pega adequados).

III - Manter o uso de protetores (intermediários) de mamilos para diminuir a dor e evitar o trauma mamilar.

IV - Amamentação em livre demanda – a criança é colocada no peito assim que dá os primeiros sinais de que quer mamar.

V - A higiene dos mamilos antes da amamentação com produtos como sabões e álcool gel protege o mamilo e evita infecção.

Quais orientações são adequadas a fim de permitir a continuidade da amamentação e evitar o desmame precoce da criança?

- A I, II e III, apenas.
- B III, IV e V, apenas.
- C I, II e IV, apenas.
- D I, II, III, IV e V.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142340](#)

### Respostas:

1	A	2	C	3	E	4	B	5	D	6	A	7	B	8	D	9	D	10	C	11	C
12	A	13	A	14	D	15	E	16	E	17	D	18	A	19	B	20	B	21	B	22	D
23	E	24	D	25	E	26	D	27	A	28	D	29	B	30	D	31	A	32	B	33	D
34	D	35	C	36	C																