

Questão 1 **Prevenção Quaternária**

Qual é a definição que mais bem se encaixa no conceito de prevenção quaternária?

- ☐ A Redução de prejuízos funcionais de um indivíduo secundários a problema agudo ou crônico.
- ☐ B Rastreamento para diagnóstico precoce da doença.
- ☐ C Prevenção de danos ao paciente, atuando na equipe de saúde.
- ☐ D Impedimento da ocorrência de doenças.
- ☐ E Prevenção de hipermedicalização e intervenções desnecessárias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171110](#)

Questão 2 **Prevenção Quaternária**

Na APS, o médico de família lida com diversos níveis de prevenção da saúde. Um exemplo de intervenção médica INCOMPATÍVEL com a prevenção quaternária é o(a):

- ☐ A oferta de exames de rastreio para grupos populacionais selecionados a partir do perfil epidemiológico
- ☐ B oferta de exames de rastreio para pessoas saudáveis e sem fatores de risco relevantes
- ☐ C uso de medicamentos para tratamento e controle de sinais e sintomas
- ☐ D solicitação de exames complementares para investigação diagnóstica

4000171030

Questão 3 **Atenção Primária à Saúde APS no Brasil** **Modelos Explicativos de Saúde e Doença**

Giovanna, uma criança com nove meses de vida, que frequenta a creche, foi levada ao acolhimento da UBS, para consulta com médica da família, por queixa de tosse, coriza e febre há dois dias. Na creche da paciente, está tendo um surto de bronquiolite e Ana, sua mãe, chegou à UBS muito assustada, com medo de a criança ter “prego a tal doença”. Ao exame físico, a criança está em bom estado geral, hidratada, com saturação de 96% e frequência respiratória de 30 ipm. Na ausculta pulmonar, há sibilos esparsos, porém sem tiragem intercostal ou subcostal. Não está febril e há diurese na fralda.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, na comparação entre o manejo na APS e o manejo no pronto-socorro, as principais ferramentas que se pode utilizar na APS são

- ☐ A o acesso e o método clínico centrado na pessoa.
- ☐ B a longitudinalidade e a demora permitida.
- ☐ C a triagem por escala de Manchester e a gestão do tempo.
- ☐ D as tecnologias leves e os exames complementares.
- ☐ E as tecnologias duras e a longitudinalidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170635](#)

Questão 4 **Processo saúde doença**

Em 1920, Winslow, antigo professor de saúde pública da Universidade de Yale, apresentou a seguinte definição de saúde pública:

Saúde Pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física, mental e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio ambiente, o controle de infecções na comunidade, a organização de serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças e o aperfeiçoamento da máquina social que irá assegurar a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à manutenção da saúde.

É correto afirmar, com base nesse texto, que

- ☐ A esses são conceitos muito antigos e totalmente desatualizados quando se pensa em saúde pública nos dias atuais.
- ☐ B é destacado o papel dos médicos como principais responsáveis das equipes multidisciplinares de saúde.
- ☐ C é mencionada a importância da prevenção secundária.
- ☐ D são consideradas apenas as doenças infecciosas como objetivo da saúde pública.
- ☐ E o principal objetivo da saúde pública é a organização eficiente dos serviços de assistência à saúde.

4000169988

Questão 5 **Processo saúde doença** **Níveis de Prevenção e outros conceitos associados**

As latrogenias, cuja redução é prevenção quaternária, estão relacionadas

- ☐ A Ao período pré-patogênico da História Natural das Doenças.
- ☐ B Ao período patogênico, doença precoce, da História Natural das Doenças.
- ☐ C Ao período patogênico, doença avançada, da História Natural das Doenças.
- ☐ D A qualquer período da História Natural das Doenças.

4000169727

Questão 6 **Níveis de Prevenção e outros conceitos associados**

A política de redução do uso de combustíveis fósseis que tem por objetivo a preservação da qualidade do ar é uma medida de prevenção

- ☐ A Primordial.
- ☐ B Primária.
- ☐ C Secundária.
- ☐ D Terciária.

4000169726

Questão 7 **Níveis de Prevenção e outros conceitos associados**

Mulher, 52 anos de idade, faz acompanhamento regular com profissionais da Unidade Básica de Saúde devido a quadro de

hipotireoidismo. Comparece a consulta de rotina, sem queixas. Função tireoideana bem controlada com uso de levotiroxina 75 mcg/dia. Não tem outras comorbidades, foi tabagista dos 15 aos 30 anos de idade, fumava 1 maço de cigarros por dia. Faz exame citopatológico de colo de útero regularmente, o último há um ano. Os 3 exames citopatológicos anteriores eram normais. Tem três filhos saudáveis e tem como história familiar ambos os pais hipertensos, uma irmã diabética e uma tia que teve câncer de mama aos 68 anos de idade.

Segundo o modelo de história natural da doença e promoção à saúde de Leavell & Clark (1965), as medidas adotadas na questão anterior para a paciente se enquadram em qual nível de prevenção?

- ☐ A Primária
- ☐ B Secundária
- ☐ C Terciária
- ☐ D Quaternária
- ☐ E Nenhuma das anteriores

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169630](#)

Questão 8 Prevenção Quaternária


Qual das situações abaixo melhor representa a aplicação do conceito de prevenção quaternária?

- ☐ A Contraindicar teste rápido para HIV e sífilis, para uma travesti de 38 anos, profissional do sexo, com últimos exames realizados há cerca de três anos.
- ☐ B Fazer interrupção abrupta de clonazepam, na dosagem de 6mg ao dia, em homem de 46 anos com insônia e quadro depressivo, em uso do benzodiazepínico há seis anos.
- ☐ C Fazer interrupção de sinvastatina 20mg ao dia em mulher de 40 anos com história de infarto agudo do miocárdio há um ano, sem implante de stent.
- ☐ D Fazer interrupção de AAS em homem de 38 anos, vendedor ambulante, hipertenso, sem fatores adicionais de risco cardiovascular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169508](#)

Questão 9 Medicina Preventiva Prevenção Quaternária

O termo prevenção quaternária (P4) foi utilizado pela primeira vez em uma conferência da Organização Mundial de Médicos de Família (WONCA), em 1995, por Marc Jamouille. Após quatro anos, essa definição foi adotada e publicada, no dicionário WONCA, da seguinte forma: “ação feita para identificar uma pessoa ou população em risco de supermedicalização, para protegê-los de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis”. Comumente, utiliza-se o diagrama cartesiano que contrapõe o ponto de vista médico com o ponto de vista do paciente, ou seja, as dicotomias entre a existência ou não de doença e a presença ou não de sintomas desagradáveis (disease versus illness), obtendo-se, assim, quatro quadrantes, como mostra a figura abaixo.



O quadrante que representa as situações com maior risco de excessos e problemas advindos de intervenções médicas, ou seja, quando a prevenção quaternária se faz mais importante, é o quadrante

- ☐ A. A.
- ☐ B. B.
- ☐ C. C.
- ☐ D. D.
- ☐ E. que engloba tanto o A quanto o B.

4000169445

Questão 10 **Prevenção Quaternária**

Constitui exemplo em que pode ser empregada a Prevenção Quaternária pelo médico:

- ☐ A. Desestimular a prescrição de Antibióticos em casos de Resfriado Comum.
- ☐ B. Recomendar Fisioterapia para Reabilitação de pacientes com sequelas motoras de Acidente Vascular Encefálico.
- ☐ C. Recomendar a utilização de Hipoclorito de sódio na água para consumo humano.
- ☐ D. Estabelecer Isolamento de pacientes com Covid-19 comprovados por exame de RT-PCR.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167889](#)

Questão 11 **Medicina Preventiva** **Prevenção Quaternária**

Ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização, protegendo-os de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis. Um lema deste tipo de prevenção é “primeiro não causar dano”. Está se falando da

- ☐ A. prevenção primária.
- ☐ B. prevenção terciária.
- ☐ C. prevenção quaternária.
- ☐ D. prevenção secundária.
- ☐ E. redução de danos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167573](#)

Questão 12 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

O Triple Aim (Tripla Meta) foi uma proposta criada pelo Institute for Healthcare Improvement para identificação dos pilares para o sucesso e a sustentabilidade de um sistema de saúde. Com o passar do tempo, foi acrescido a essa proposta um quarto elemento, denominando-se então Quadruple Aim (Quadrupla Meta). Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse quarto elemento.

- A Melhor experiência do profissional.
- B Melhor experiência do paciente.
- C Melhores indicadores de saúde.
- D Maior segurança do paciente.
- E Menores custos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167185](#)

Questão 13 Prevenção Quaternária Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

O conceito de prevenção quaternária foi proposto, a partir de 1999, pelo médico de família belga Marc Jamouille, tomando como base a proposta de Leavell & Clark de níveis de prevenção. Qual das seguintes alternativas expressa uma medida de prevenção quaternária?

- A Realizar eletrocardiografia em todos os exames admissionais.
- B Imunizar crianças contra poliomielite (paralisia infantil).
- C Coletar exame citopatológico do colo uterino em mulheres em idade fértil.
- D Rastrear o câncer de próstata com o exame de PSA.
- E Utilizar da demora permitida diante de um quadro de lombalgia sem sinais de alarme.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167182](#)

Questão 14 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Elza é residente do primeiro ano de Clínica Médica e acompanha, durante seu estágio na enfermaria, a internação de Paulo, 56 anos. Ele é hipertenso grave de longa data e tem instalada uma insuficiência cardíaca, NYHA classe III. Ela se lembra de seu avô José que também é hipertenso, mas, ao contrário de Paulo, é bem controlado e sem comprometimento significativo da sua funcionalidade. Ela conclui que, com resultados tão diversos, muitas ações preventivas provavelmente deixaram de existir ao longo do cuidado de Paulo. Dentre essas ações, ela lembra do controle no consumo de sal, da atividade física regular, do diagnóstico e manejo precoce do quadro de hipertensão arterial e, por fim, da otimização da terapia para controle da insuficiência cardíaca. Diante do caso, considerando a classificação de Leavell & Clark para a história natural da doença Insuficiência Cardíaca, assinale a alternativa correta.

- A A atividade física regular e o controle do consumo de sal são atividades de prevenção secundária.
- B O controle do consumo de sal e o diagnóstico precoce da hipertensão arterial são atividades de prevenção primária.
- C O diagnóstico precoce da hipertensão arterial e a otimização da terapia para insuficiência cardíaca são atividades de prevenção secundária.
- D A atividade física regular e a otimização da terapia para insuficiência cardíaca são, respectivamente, atividades de prevenção primária e terciária.
- E O controle do consumo de sal e o diagnóstico precoce da hipertensão arterial são, respectivamente, atividades de prevenção primária e terciária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167180](#)

Questão 15 **Determinação Social da Saúde** **Determinantes Sociais da Saúde DSS**

Na atual prática clínica, o médico deve se preocupar com o diagnóstico e as sugestões de tratamento de determinada doença, bem como deve se atentar a aspectos ligados à promoção da saúde, à prevenção, à reabilitação, dentre outros. A própria compreensão de saúde aprimorou-se nas últimas décadas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “o bem-estar físico, psíquico e social e não apenas a ausência de doença”. Nesse contexto, é CORRETO afirmar:

- A Tal conceito deve ser ampliado, incluindo o bem-estar ambiental e excluindo a qualidade de vida.
- B O conceito de saúde não inclui a preocupação com a qualidade de vida, apenas se preocupa com a duração da vida de um indivíduo.
- C A saúde não pode estar presente na vida de um idoso com várias doenças, ainda que controladas.
- D O conceito de saúde deve, outrossim, incluir qualidade de vida, autonomia e independência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166922](#)

Questão 16 **Determinação Social da Saúde** **Determinantes Sociais da Saúde DSS**

Desde a implantação da Lei Orgânica da Saúde no Brasil, Lei n.º 8.080/1990, a Epidemiologia tem sido explicitamente utilizada como referencial para a fundamentação das ações de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). É definida, tradicionalmente, como ciência que estuda a distribuição de doenças e suas causas nas populações. No século XX, além da ampliação dos seus conhecimentos, também foi consolidada como saber científico, subsidiando práticas de saúde pública e coletiva. De acordo com o artigo “Determinação ou Determinantes? Uma discussão com base na Teoria da Produção Social da Saúde”, Epidemiologia

- A é considerada uma subárea da saúde coletiva e sempre teve a perspectiva coletiva como objeto de estudo.
- B foi utilizada para buscar legitimidade do discurso clínico, na ótica de uma concepção biologicista.
- C utilizou-se da reflexão epistemológica, ao fazer uma articulação com as ciências sociais.
- D faz uso de modelos explicativos do processo saúde-doença, de forma abrangente e holística

[4000166396](#)

Questão 17 **Prevenção Primária**

A ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional, antes do desenvolvimento de uma condição clínica, pode ser definido como prevenção:

- A primária
- B secundária
- C terciária
- D quaternária

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165403

Questão 18 Prevenção Primária

Considerando os níveis de prevenção, o ato de utilizar máscaras em cenários pandêmicos como o de COVID-19 é um exemplo de qual nível de prevenção?

- A Quaternária
- B Terciária
- C Secundária
- D Primária

4000164852

Questão 19 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Considere o caso clínico abaixo e os personagens nele ilustrados, para responder.

Após ser aprovado e ingressar no Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, você é direcionado para uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) para ser recebido pelo médico preceptor da Unidade. Em sua primeira participação de reunião de equipe, uma das agentes comunitárias de saúde (ACS) da equipe do médico preceptor traz o relato de uma gestante de sua microárea que não procurou a Unidade de Saúde para começar o pré-natal. A gestante era Vanessa e ela era antiga conhecida da equipe, porque seu finado pai, Seu Odair, fora uma liderança comunitária e era muito querido por todos. Vanessa tinha a primeira consulta de pré-natal agendada para o primeiro horário depois da reunião de equipe. Dr. Marcos Júlio, seu preceptor, relata que Vanessa nunca teve boa relação com os pais e saiu de casa cedo, passando a morar, aos 14 anos, na casa de Ubiratan, seu primeiro parceiro. Após alguns anos morando juntos, Vanessa engravidou e chegou a ser acompanhada pela UAPS no pré-natal, mas teve perda gravídica com aproximadamente 12 semanas de seguimento. Durante esse acompanhamento pré-natal, a equipe ficou ciente de que Vanessa vivia em contexto de violência doméstica, mas continuava vivendo com Ubiratan, porque não aceitava voltar para a casa dos pais. Por volta de seus 24 anos, Vanessa teve episódio de hemiplegia desproporcional em dimídio esquerdo, desvio de rima labial e disartria, enquanto trabalhava em uma casa como diarista. Foi levada à urgência e hospitalizada. Durante hospitalização, confirmou-se um infarto cerebral. A família de Vanessa possui histórico de AVCs em idades precoces: Vanusa apresentou episódio de AVC durante uma de suas gestações e dona Benzarina teria apresentado o primeiro AVC antes da menopausa. Segundo a Assistente Social do hospital em que Vanessa ficou internada por quase dois meses, Ubiratan nunca teria realizado uma visita, mas Edberto, um ex-namorado, foi companhia assídua. Após a alta hospitalar, Vanessa descobriu que Ubiratan estava vivendo com outra mulher e se mudou para casa de Edberto, que a acolheu, a despeito da não-aceitação do pai de Edberto, Seu Eduardo. Depois de seis anos morando juntos, Vanessa engravidou novamente, mas não procurou a UAPS. A ACS fazia visitas domiciliares na mesma rua em que Edberto e Vanessa moram, quando viu Vanessa, já com barriga gravídica, varrendo a calçada. Após breve conversa, a ACS agenda atendimento para Vanessa na UAPS.

(TRECHO DA QUESTÃO ANTERIOR)

"Em sua consulta com Edberto, ele refere que o medo de desenvolver câncer de pulmão é uma das razões que o motiva a

parar de fumar. Ele, então, pergunta se você pode solicitar algum exame de rastreio para câncer de pulmão nele. De acordo com recomendações nacionais para o rastreio do câncer de pulmão, assinale a alternativa com a conduta adequada."

A abordagem adequada frente à demanda, ilustrada na questão anterior, de Edberto quanto a exames de rastreio de câncer de pulmão configura que nível de Prevenção?

- ☐ A Primária.
- ☐ B Secundária.
- ☐ C Terciária.
- ☐ D Quaternária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163708](#)

Questão 20 **Prevenção Quaternária**

"A prevenção vem sendo organizada de maneira cronológica desde meados do século XX. A mudança paradigmática de uma prevenção de base cronológica para uma de base paradigmática oferece uma nova compreensão do trabalho e, especificamente, das atividades preventivas dos médicos, e traz à luz o conceito de prevenção quaternária." (GUSSO, JAMOULLE, 2012). Assinale a alternativa que contenha medidas relacionadas a realização da prevenção quaternária:

- ☐ A Propor medidas para prevenção de complicações por diabetes
- ☐ B Ajudar um paciente a superar sua ansiedade e demanda injustificada por tratamento após obter informações erradas na internet.
- ☐ C Solicitar sorologias em indivíduos com atividade sexual de risco.
- ☐ D Realizar imunização contra a COVID-19.
- ☐ E Orientar o uso de água filtrada e higienização de frutas, verduras e legumes crus com hipoclorito de sódio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163591](#)

Questão 21 **Prevenção Primária**

Uma primigesta em uma consulta de pré-natal recebe vacinação para prevenção do tétano, orientação quanto a alimentação mais adequada, recomendação quanto a parar de fumar, além da solicitação de exames sorológicos para HIV e Sífilis. A partir do modelo de Leavell & Clark aponte a alternativa onde existe correspondência entre a medida adotada e o nível de prevenção.

- ☐ A Medida Adotada: Vacinação / Nível de Prevenção: Primária
- ☐ B Medida Adotada: Parar de fumar / Nível de Prevenção: Secundário
- ☐ C Medida Adotada: Orientação alimentar / Nível de Prevenção: Secundário
- ☐ D Medida Adotada: Sorologia Sífilis / Nível de Prevenção: Terciário
- ☐ E Medida Adotada: Sorologia HIV / Nível de Prevenção: Secundário

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163586](#)

Questão 22 **Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS**

Uma equipe de saúde da família atua em uma unidade básica de saúde situada na zona periférica de uma cidade com mais de 800 000 habitantes. No último mês, foi evidenciado aumento no número de casos de diarreia entre crianças de 2 a 5 anos que frequentam a creche pública de um bairro. A equipe de saúde da família desse local analisa que, no último ano, têm sido recorrentes os casos de diarreia entre crianças da área, inclusive, em alguns casos, com necessidade de internação hospitalar. Dentre os casos, observam que eles se concentram naquelas famílias que não são da área de cobertura da equipe de saúde da família. No bairro onde se localiza a creche, 20% dos domicílios possuem abastecimento de água tratada, 10% com esgoto sanitário, sem coleta regular de lixo nos domicílios, sendo os esgotos e lixos acumulados das casas ou jogados no córrego, a céu aberto, que corta o bairro.

Em relação à situação acima descrita, assinale a alternativa correta em relação ao processo saúde-doença e os determinantes de saúde envolvidos no caso.

- A** O aumento no número de casos de diarreia na creche tem como principal fator a virulência da bactéria e, por se tratar de um caso recorrente, a equipe de saúde da família poderia atuar com medidas medicamentosas profiláticas direcionadas ao agente etiológico.
- B** A educação em saúde na creche, com os profissionais da educação e com a comunidade, teria papel importante na melhoria das condições sanitárias da comunidade; é uma estratégia suficiente para o combate de surtos.
- C** A falta de acesso aos serviços de saúde e de acompanhamento regular com a equipe de saúde da família é um fator associado ao desfecho desfavorável dos casos, com aumento de quadros graves de diarreia com necessidade de internação hospitalar.
- D** A adoção de medidas como uso de hipoclorito na água e de filtros nos bebedores escolares é a principal medida para combate à transmissão dos agentes etiológicos que cursam com quadros de diarreia, diminuindo assim a incidência de casos na creche.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153172](#)

Questão 23 **Prevenção Quaternária**

Um menino com 7 anos de idade é encaminhado à Unidade Básica de Saúde (UBS) pela escola devido ao fato de que ele não consegue aprender a ler, o que tem impactado o seu desempenho escolar no último ano. Segundo relato do psicólogo do colégio, suspeita-se que o menino tenha déficit de atenção. De acordo com o histórico familiar, a criança é um dos 3 filhos de um casal que mora em uma casa de dois quartos. A avaliação da Equipe de Saúde da Família revela que o comportamento do menino em casa é tranquilo, que ele apresenta concentração em suas atividades e brinca com seus irmãos; não troca letras; não troca fonemas; não esquece atividades corriqueiras. Ao médico da equipe, a criança refere não gostar da escola porque sua professora não gosta dele. O médico chama a professora à UBS e, juntamente com sua equipe, reestabelece um canal de diálogo entre a professora e o menino. Após 2 meses, a equipe recebe a notícia de que a criança está evoluindo bem na escola. O conjunto de medidas adotadas na condução desse caso insere-se como prevenção:

- A** Quaternária.
- B** Terciária.
- C** Secundária.
- D** Primária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000049623](#)

Questão 24 **Anticoagulação oral Níveis de Prevenção e outros conceitos associados**

Como estratégia de enfrentamento ao grande número de casos de acidente vascular encefálico nos idosos moradores de uma determinada área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família, propõe-se projeto de intervenção coletiva

centrado na prevenção primária de tal adoecimento. Das ações específicas listadas abaixo, aquela que deve ser priorizada nesse projeto de prevenção primária é

- A buscar um controle efetivo da hipertensão arterial sistêmica nos pacientes idosos da região, sendo alvos do tratamento anti-hipertensivo os níveis tensionais menores ou iguais a 120 x 80 mmHg.
- B realizar palestras e outras atividades educativas, com destaque para a adesão a um plano dietético mais saudável, pobre em sal e rico em verduras, legumes e frutas, bem como para o combate ao sedentarismo e o tabagismo.
- C realizar rastreamento primário na população idosa local através da realização de ultrassonografia com Doppler de artérias carótidas e vertebrais, com o objetivo de avaliar a ocorrência de placas ateroscleróticas clinicamente silenciosas.
- D prescrever anticoagulação crônica adequada, associada a controle laboratorial de acordo com o fármaco utilizado, para indivíduos portadores de fibrilação atrial crônica cuja pontuação no escore CHADS2 seja maior ou igual a 2 pontos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126921](#)

Questão 25 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Uma mulher de 45 anos de idade, história de diabetes e asma brônquica, estava internada no Hospital Municipal com quadro de pneumonia comunitária. Ao receber alta hospitalar foi orientada a procurar uma Unidade Básica de Saúde para solicitar administração de vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica). Qual o tipo de prevenção objetivada a partir da ação descrita?

- A Primária.
- B Secundária.
- C Terciária.
- D Quarternária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126652](#)

Questão 26 Prevenção Terciária

Paciente do sexo masculino, com 45 anos de idade, é dependente químico de cocaína, com uso por via inalatória e procurou o serviço especializado do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) para tratamento. A oferta desse atendimento no Sistema Único de Saúde caracteriza ações de que tipo?

- A Prevenção primordial.
- B Prevenção quaternária.
- C Prevenção terciária.
- D Prevenção secundária.
- E Prevenção primária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127073](#)

Respostas:

1	E	2	B	3	B	4	C	5	D	6	A	7	B	8	D	9	C	10	A	11	C
12	A	13	E	14	C	15	D	16	B	17	A	18	D	19	D	20	B	21	A	22	C
23	A	24	D	25	A	26	C														