

Questão 1 **Psiquiatria Infantil**

Uma médica da Estratégia de Saúde da Família percebeu que, nas consultas de Puericultura, houve um aumento das queixas de agitação, irritabilidade e tristeza nas crianças, durante o período da pandemia da COVID-19. Muitos genitores, preocupados com as mudanças comportamentais dos filhos, estão solicitando a prescrição de medicamentos e encaminhamentos para consulta com Psicólogos.

Nesse cenário, atenta à situação, a médica, em conjunto com a equipe de saúde, deve planejar e executar ações de saúde no território que contemplem esse novo momento.

Considerando as informações apresentadas e com base na Educação Popular em Saúde, a principal ação a ser realizada com as famílias dessas crianças é a

- ☐ A promoção de reuniões com profissionais do Centro de Atenção Psicossocial infantil e familiares para esclarecer o manejo medicamentoso dos casos.
- ☐ B escuta ativa das queixas trazidas pelos familiares, para a compreensão do problema e construção dialogada da solução.
- ☐ C utilização pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde de uma série de técnicas de convencimento dos familiares para evitar a medicalização do sofrimento das crianças.
- ☐ D elaboração de uma série de palestras informativas, com exposição das melhores evidências científicas para o tratamento das doenças neurodegenerativas da infância.

4000176680

Questão 2 **Diagnóstico do Autismo** **Transtorno do Espectro Autista TEA**

A avaliação do desenvolvimento é etapa essencial na consulta pediátrica e vai muito além de conhecer os importantes marcos para cada faixa etária. O preceptor solicitou que fosse aplicado em um paciente o M-CHAT, que permite ao pediatra, a partir de um determinado escore de pontos, pensar, principalmente, na possibilidade de

- ☐ A Depressão.
- ☐ B Transtorno Obsessivo Compulsivo.
- ☐ C Transtorno do Espectro Autista.
- ☐ D Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
- ☐ E Erros inatos do metabolismo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000173579](#)**Questão 3** **Transtorno do Espectro Autista TEA**

Sobre a apresentação clínica de uma criança portadora de transtorno de espectro autista na infância, qual característica é provável de se encontrar?

- A Movimentos corporais estereotipados
- B Capacidade para fazer amizade com seus pares
- C Habilidade para sustentar uma conversação
- D Interesse em histórias sobre acontecimentos imaginários

4000170522

Questão 4 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

Sobre o Transtorno do Espectro Autista, assinalar a alternativa CORRETA:

- A Raramente existem sintomas antes dos oito anos de idade.
- B É mais comum no sexo feminino.
- C É caracterizado por deficiências na comunicação social, comportamentos restritos e repetitivos.
- D Frequente surdez associada.

4000169502

Questão 5 Psiquiatria Infantil Transtorno de Oposição e Desafio TOD

Perda de paciência frequente, postura desafiadora; recusa em aceitar ordens ou solicitações de adultos, com os quais discute com frequência; tende a responsabilizar os outros pelos seus atos; frequentemente perturba os outros de forma deliberada. As características expostas são compatíveis com qual transtorno comportamental da infância?

- A Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
- B Transtorno da personalidade antissocial.
- C Transtorno opositor desafiante.
- D Transtorno explosivo intermitente.

4000169495

Questão 6 Psiquiatria Infantil Transtorno do Espectro Autista TEA

Criança de 5 anos é levada pelos pais ao consultório, segundo o que relatam, a escola tem se queixado da criança por não acompanhar os colegas no rendimento geral e por não conversar com os amigos e professores. Conforme o médico fazia mais perguntas sobre a criança, os pais explicam que ele sempre foi "difícil de lidar", que se irrita muito quando tocam nele, que faz "escândalos" quando tentam arrumar o cabelo dele. Mas que adora brincar com dinossauros, inclusive suas primeiras palavras se relacionavam a esses animais, sabendo mais de 30 nomes diferentes. Durante a consulta toda, a criança quase não respondeu às indagações da pediatra e não tirava o olho de uma figura colada na balança. O quadro descrito tem como provável diagnóstico:

- A Paralisia cerebral.
- B Transtorno opositor desafiador.
- C Transtorno do espectro autista.
- D Transtorno de déficit de atenção.

Questão 7 Psiquiatria Infantil

O ensaio publicado em maio de 2020 pela Revista Ciência e Saúde Coletiva, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, intitulado "O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no contexto da Covid-19 e os riscos para violências autoinflingidas", traz reflexões referentes aos impactos do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e sobre o uso intensivo da internet entre crianças e adolescentes e suas possíveis consequências para a prática de violências autoinflingidas. Quanto à saúde mental de crianças e adolescentes, dentre as considerações abaixo, qual é considerada ERRADA:

- A Há algumas práticas de autoagressões, que não necessariamente envolvem transtornos de ordem emocional ou quadros depressivos e que são vistos como práticas culturais aceitas socialmente no universo online.
- B Não é considerada necessária a criação de protocolos e medidas exclusivas para os adolescentes quanto à prevenção das formas de violências autoinflingidas
- C O uso excessivo da internet pode também gerar uma forma de adição, um transtorno que gera dependência, podendo se expressar em várias formas: cyber sexo, relacional (das redes sociais), adição por jogos
- D Pode ocorrer acirramento de vulnerabilidades para ideações e tentativas de suicídio quando a criança ou o adolescente apresenta, previamente, condições específicas da saúde mental que demandem monitoramento

4000168723

Questão 8 Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

Em relação ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), é correto afirmar que:

- A É um transtorno que usualmente aparece na infância ou adolescência, relacionado a alterações neurobiológicas e costuma apresentar melhora do quadro clínico com uso de psicoestimulantes.
- B É relacionado essencialmente com fatores culturais (as práticas de determinada sociedade) e as primeiras vivências infantis (o modo como os pais, ou seus substitutos, educam e se relacionam com os filhos, com os decorrentes conflitos psicológicos).
- C São consideradas as principais causas: luz artificial, consumo de açúcar, deficiência hormonal e deficiências vitamínicas na dieta da criança. Não estão associados a outras comorbidades psiquiátricas na vida adulta.
- D Abordagem focada completamente na relação do terapeuta com o paciente.

4000164551

Questão 9 Psiquiatria Infantil Transtorno de Oposição e Desafio TOD

Os pais de uma criança de seis anos de idade vêm ao ambulatório com queixas de que a criança está com posturas desafiadoras; recusa em aceitar ordens ou solicitações de adultos, com os quais discute com frequência; e tendendo a responsabilizar os outros pelos seus atos. Esses sintomas ocorrem em casa e em outros espaços sociais. Diante desse relato, qual a principal hipótese diagnóstica?

- A Transtorno de conduta.
- B Transtorno explosivo intermitente.
- C Transtorno de oposição desafiante.
- D Transtorno da personalidade antissocial.

Questão 10**Psiquiatria Infantil****Diagnóstico do TDAH****Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH**

Escolar, sexo masculino, 10 anos, vem à consulta com o pediatra por dificuldades de relacionamento social na família e na escola. Mostra um desempenho escolar errático com alguns bons resultados mesclados com resultados ruins. A família recebe bilhetes da escola, quase diariamente, com queixas de que o paciente atrapalha o andamento da aula com piadas, conversas ou discussões. Segundo a mãe, o filho é bastante inteligente, mas vem deteriorando o seu desempenho ao longo dos anos com piora acentuada nas últimas séries do ensino fundamental. Não consegue se concentrar nos trabalhos e termina as tarefas muito rápido, com uma qualidade baixa. Frequentemente, perde o material necessário para fazer as lições de casa. De acordo com a família, isso sempre aconteceu, mas nos últimos anos os sintomas têm ficado mais significativos. Com base nessa história, o diagnóstico mais provável é:

- A Distímia.
- B Distúrbio de conduta.
- C Transtorno de humor bipolar
- D Transtorno opositor- desafiador.
- E Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade

4000163579

Questão 11**Psiquiatria Infantil****Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH**

Sobre transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), é correto afirmar:

- A Ocorre simultaneamente com outros transtornos emocionais, transtornos endocrinológicos, comportamentais e de aprendizagem.
- B Na faixa etária pediátrica, são contraindicados os psicoestimulantes e antidepressivos.
- C Crianças afetadas geralmente apresentam insucesso acadêmico, problemas de relacionamento interpessoal e baixa autoestima, com resolução na vida adulta.
- D É o terceiro transtorno neurocomportamental mais comum da infância.
- E O TDAH é caracterizado por desatenção, incluindo aumento da distração e dificuldade em manter a atenção; controle de impulso pobre e diminuição da capacidade de autoinibição; hiperatividade e inquietação motora.

4000163525

Questão 12**Tratamento do TDAH****Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH**

Que fármacos são considerados de primeira linha para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade?

- A Bupropiona, metilfenidato.
- B Lisdexanfetamina, clonidina.
- C Bupropiona, nortriptilina.
- D Metilfenidato, venlafaxina.
- E Lisdexanfetamina, metilfenidato.

Questão 13 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

Paciente de 5 anos de idade, sexo masculino, é levado por seus pais para uma consulta com o psiquiatra. Quem encaminhou foi a pediatra da família, que gentilmente fez as seguintes observações na carta de referência:

“Paciente apresenta um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, não forma frases completas e não apresenta intenção comunicativa adequada. Noto também que deu seus primeiros passos com alguns meses de atraso, pois normalmente prefere ficar sentado manuseando alguns brinquedos de maneira ritualizada e parece adorar bater palmas na sua cama durante a noite. Quando chamado pelo nome, parece não ouvir, além disso, demonstra pouco apego pelos pais. Solicito sua avaliação”

Diante desse quadro, assinale o provável diagnóstico.

- ☐ A Surdez
- ☐ B TDAH com predomínio desatento
- ☐ C Autismo
- ☐ D Esquizofrenia infantil
- ☐ E Transtorno de oposição e desafio

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147689](#)**Questão 14** Psiquiatria

Adolescente de 13 anos é levado à Unidade Básica de Saúde por sua mãe, que se queixa que o filho “não para em casa”, é desastrado, quebra com frequência objetos da decoração por descuido, esquece de realizar os deveres da escola e parece estar “desligado” muitas vezes. O paciente diz que “sempre foi assim”, mas reconhece que a “inquietação” tem atrapalhado seu desempenho escolar nos últimos meses, especialmente porque mudou-se de classe, encontrando diversos amigos na “turma do fundo”. Os professores constantemente chamam sua atenção e estão preocupados com suas notas baixas no último bimestre. Além disso, esses acontecimentos têm gerado conflitos com seu pai, que se irrita com o comportamento do filho, e o chama de preguiçoso. Com base no provável diagnóstico, assinale a medicação de escolha para seu tratamento:

- ☐ A Fluvoxamina
- ☐ B Mirtazapina
- ☐ C Memantina
- ☐ D Lisdexanfetamina
- ☐ E Risperidona

4000147382

Questão 15 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

O autismo é um transtorno _____, cerca de 5 vezes mais prevalente no sexo _____. Normalmente, seus primeiros sinais e sintomas são identificados perto dos _____ pelos familiares, contudo, seu diagnóstico ocorre ao redor dos _____ de vida.

- A Neurodegenerativo - feminino - 3 anos - 18 meses
- B Neurodesenvolvimental - feminino - 6 meses - 18 meses
- C Neurodegenerativo - masculino - 2 anos - 12 meses
- D Neurodesenvolvimental - masculino - 18 meses - 3 anos
- E Neurodesenvolvimental - masculino - 18 meses - 6 anos

4000147199

Questão 16 Tratamento do TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH

A dificuldade de aprendizado é uma das principais queixas no período escolar, geralmente referida pelo professor como "aquele aluno que se relaciona mal com os colegas, desligado, parece que não se interessa por nada e se distrai facilmente com barulhos, por exemplo, quando um lápis cai ao chão." Sintomas dessa natureza vêm sendo diagnosticados como Déficit de Atenção e têm levado à medicalização excessiva. O medicamento mais utilizado em crianças para esse problema é:

- A Metilfenidato.
- B Topiramato.
- C Carbamazepina.
- D Fenitoína.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127979

Questão 17 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por um espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a comportamentos repetitivos e interesses restritos pronunciados. Os TEA apresentam ampla gama de severidade e prejuízos, sendo frequentemente a causa de deficiência grave, representando importante problema de saúde pública. Há uma grande heterogeneidade na apresentação fenotípica do TEA, em relação à configuração e severidade dos sintomas comportamentais. A atual dificuldade de identificação de subgrupos de TEA que poderiam direcionar tratamentos e viabilizar melhores prognósticos inibe progressos no desenvolvimento de novas abordagens de tratamento desses pacientes. Para fazer o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, analise os critérios diagnósticos abaixo especificados.

I - Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestados de todas as maneiras seguintes:

- a) Déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação social;
- b) Falta de reciprocidade social;
- c) Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento.

II - Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo menos duas das maneiras abaixo:

- a) Comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou comportamentos sensoriais incomuns;

b) Excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento;

c) Interesses restritos, fixos e intensos.

III - Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades.

IV- A gravidade baseia-se em prejuízo na comunicação social e em padrões de comportamento restritos e repetitivos. São critérios diagnósticos do DSM-V:

- A I,II,III e IV.
- B I,II e IV, apenas.
- C II, III e IV, apenas.
- D I e III, apenas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127975](#)

Questão 18 Tratamento do TDAH Diagnóstico do TDAH

Uma criança do sexo masculino com 8 anos de idade é atendida em consulta com médico de Unidade Secundária de Saúde para avaliação de transtorno de comportamento. A mãe relata que o filho perde material escolar com frequência, costuma esquecer as tarefas do dia-a-dia e demora a atender quando chamado pelo nome. Informa, ainda, que a criança é repreendida na escola por não parar no mesmo lugar, levantar-se o tempo todo da cadeira, falar demais e intrometer-se na conversa alheia, além de ter notas ruins. O exame clínico evidencia anormalidades. O diagnóstico e a conduta adequados ao caso são

- A desenvolvimento normal, com comportamentos comuns na infância; orientar a família.
- B transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; iniciar tratamento com risperidona.
- C transtorno de espectro autista; encaminhar o paciente para atendimento especializado.
- D transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; iniciar tratamento com metilfenidato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127927](#)

Questão 19 Diagnóstico do Autismo

A Equipe de Saúde da Família (ESF) de uma Unidade Básica de Saúde observou aumento no número de crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor no seu território de atuação. Uma pesquisa mostrou que 90% desses casos são representados por filhos de imigrantes latinos, de língua espanhola, que trabalham em oficinas de costura. Após diversas visitas a essas oficinas de costuras, a equipe da ESF concluiu que o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é causado por falta de estímulo adequado: os pais trabalham ininterruptamente e não têm tempo de dispensar atenção e estímulo necessários a essas crianças, que ficam muito tempo deitadas, ao lado dos pais, enquanto eles costuram. Considerando os fatores ambientais, sociais e ocupacionais que prejudicam a saúde das crianças que vivem nessas condições, a ESF deve

- A encaminhar as crianças ao CAPS-infantil para iniciar tratamento medicamentoso.
- B notificar o Conselho Tutelar e denunciar à Polícia local os maus tratos recebidos pelas crianças.
- C encaminhar as crianças ao Serviço de Neurologia infantil de referência para exames complementadores de imagem.
- D realizar abordagem nas oficinas, envolvendo os membros da comunidade, a fim de conscientizá-los da falta de estímulo adequado às crianças e construir possíveis soluções.

4000126863

Questão 20 Transtornos Específicos de Aprendizagem

Um menino de 10 anos de idade é trazido pelo pai à consulta pediátrica e relata grande dificuldade escolar do filho. O pai comenta que a professora queixou-se à família que a criança é dispersa em sala de aula, não acompanhando os colegas nas atividades propostas. Durante a consulta com o médico e enfermeira da Equipe de Saúde da Família, o menino comporta-se normalmente e responde de forma adequada às perguntas realizadas. Os exames físicos realizados indicam ausência de anormalidade ou alterações. Considerando as informações apresentadas, qual o conceito em que se deve basear um projeto terapêutico adequado ao caso?

- A O diagnóstico diferencial com distúrbios visuais e de audição é necessário em crianças mais jovens e dispensável no caso apresentado.
- B A compreensão do contexto familiar é necessária na avaliação de fatores associados ao baixo desempenho escolar, como violência e negligência.
- C As crianças com dificuldade escolar devem ser avaliadas por neuropediatra para definição da necessidade de uso de psicoestimulantes.
- D A família deve ser orientada a ser mais firme com a criança frente ao baixo desempenho, por meio de imposição de cronogramas mais rígidos para execução das tarefas escolares.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126645](#)

Questão 21 Transtornos Específicos de Aprendizagem Psiquiatria Infantil

Estudante, com 9 anos de idade, vem apresentando dificuldades de aprendizagem e atos de indisciplina frequentes em relação aos professores, principalmente aos novos, que tiveram de ser substituídos por três vezes nos últimos dois meses, por problemas de saúde. A escola solicitou que a mãe procurasse um "neurologista" para o menino, esta levou a criança inicialmente ao pediatra, referindo que ele tinha boa índole, ajudava nas tarefas de casa e tomava conta do irmão com 5 anos. Notou que tem apresentado notas mais baixas e reclama muito dos professores ultimamente. Nega atos indisciplinados que não sejam próprios da idade. O menino não gosta de ficar na rua, costuma brincar em casa e jogar futebol no final de semana com os amigos e primos. Em casa não tem computador e a mãe acha que esse é o motivo do mau desempenho escolar. A criança perdeu o pai há um ano, vítima de atropelamento. Ao exame físico, o pediatra não encontrou alterações. Com base nessa narrativa, a suspeita clínica e a conduta do pediatra devem ser:

- A transtorno de distúrbio de comunicação (provavelmente linguagem); encaminhar para avaliação com o neurologista infantil.
- B déficit de atenção e hiperatividade; encaminhar para avaliação com o neurologista e com o psiquiatra infantil.
- C comportamento aceitável para a idade; avaliar melhor com seguimento e então decidir se encaminha ao psiquiatra infantil.
- D comportamento antissocial decorrente da perda familiar; encaminhar de imediato para avaliação com o psiquiatra infantil.
- E transtorno de conduta (comportamento desafiador opositor); encaminhar para avaliação com o psiquiatra infantil.

4 000127218

Questão 22 Reforma Psiquiátrica e Psiquiatria Social Transtornos Específicos de Aprendizagem

Criança com 11 anos de idade, frequentando o quarto ano do ensino fundamental, é encaminhada ao pediatra pela escola por apresentar indisciplina e problemas de aprendizagem. A diretora solicita encaminhamento para o neurologista, psicólogo e oftalmologista. Na consulta em Unidade Básica de Saúde, a mãe conta que a classe da criança já teve três trocas de professora no ano corrente, e que em casa a criança é muito esperta e cuida do irmão de 5 anos, no horário em que ela está trabalhando. Levando em consideração a Reforma Psiquiátrica Brasileira, o Movimento de Luta Antimanicomial e a Política Nacional de Saúde Mental, a conduta adequada é:

- A Valorizar o prejuízo que a criança já tem em decorrência do atraso na escolarização, instituindo tratamento clínico para transtorno de hiperatividade e déficit de atenção com ritalina e psicoterapia no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
- B Prevenir a piora do quadro e a possibilidade de internação em hospital psiquiátrico por intermédio da pronta referência do caso ao psiquiatra, antes que ocorra recrudescimento e seja imperioso o tratamento manicomial.
- C Agendar os procedimentos ambulatoriais requisitados, em cumprimento ao princípio da intersetorialidade da Lei n.º 8.080/1990, com cobertura pelo benefício financeiro do Programa "De Volta Para Casa".
- D Acionar o Conselho Tutelar mediante denúncia de bullying e assédio moral da escola contra a criança, pela repetência serial e tentativa de culpabilizar a vítima pelo próprio agravo sofrido.
- E Orientar a mãe a respeito da possibilidade de o comportamento da criança dever-se a situações sociais do entorno escolar e/ou doméstico, e viabilizar contato da Equipe de Saúde da Família com a escola.

4 000127156

Questão 23 Psiquiatria Infantil

Quanto ao comportamento na adolescência, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A Para se autoafirmar, o jovem agride e desvaloriza seus pais, embora goste e necessite deles.
- B O adolescente investe calorosamente em tudo o que faz; a entrega é total e a paixão juvenil.
- C Na busca de si mesmo e da identidade adulta, o adolescente substitui o grupo pelos pais.
- D Questiona os valores, afasta-se da família em busca de novos modelos de identificação.
- E Dentro do padrão, existe a individualização: os turbulentos, os contestadores, os alegres e os tristes.

4 000153814

