

Questão 1 **Esquizofrenia**

Você está tratando de um paciente de 22 anos com um quadro de esquizofrenia. Inicialmente, você prescreveu haloperidol 15mg e observou, após 3 meses, não houve nenhuma resposta. Depois da primeira tentativa frustrada, você trocou o haloperidol por olanzapina 20mg e, após 2 meses, notou uma resposta terapêutica pobre, então decidiu que o melhor é mudar sua estratégia.

Diante desse contexto, quais são: a melhor descrição do diagnóstico e a melhor conduta?

- ☐ A Esquizofrenia aguda. Iniciar terapia psicanalítica.
- ☐ B Esquizofrenia super-refratária. Associar quetiapina + lítio.
- ☐ C Esquizofrenia refratária. Iniciar risperidona.
- ☐ D Esquizofrenia refratária. Iniciar clozapina.
- ☐ E Esquizofrenia. Iniciar lamotrigina + clorpromazina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147683](#)

Questão 2 **Transtorno Psicóticos**

A paciente Jéssica Lorraine, 28 anos, está apresentando um comportamento “diferente” há 18 dias. Apresenta risos imotivados, acusa sua irmã de ser uma espiã da antiga união soviética e acredita que sua mãe deseja envenená-la, colocando veneno de rato na sua comida. O quadro iniciou-se abruptamente, após ser acusada de furtar 12 reais do caixa do mercadinho em que trabalha. Após avaliação médica, a paciente é internada, inicia o tratamento com antipsicótico e tem uma melhora completa do quadro após uma semana, com retorno a sua funcionalidade e padrão de comportamento.

A hipótese diagnóstica para o caso é de:

- ☐ A Transtorno psicótico breve.
- ☐ B Transtorno esquizofreniforme.
- ☐ C Esquizofrenia.
- ☐ D Mania Bipolar.
- ☐ E Transtorno esquizoafetivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147680](#)

Questão 3 **Transtorno Psicóticos** **Transtorno Esquizofreniforme**

Paciente Lucileide, 24 anos, está apresentando um comportamento “diferente” há 38 dias. Apresenta risos imotivados, acusa sua irmã de ser uma espiã da antiga união soviética e acredita que sua mãe deseja envenená-la, colocando veneno de rato na sua comida. O quadro iniciou-se abruptamente após a paciente ser acusada de furtar 25 reais da carteira de seu primo. Após avaliação médica, a paciente é internada, inicia o tratamento com antipsicótico e tem uma melhora completa do quadro após 4 semanas, com retorno a sua funcionalidade e padrão de comportamento.

A hipótese diagnóstica para o caso, de acordo com o DSM-5, é de:

- A Transtorno psicótico breve.
- B Transtorno esquizofreniforme.
- C Esquizofrenia.
- D Mania Bipolar.
- E Transtorno esquizoafetivo.

4000147589

Questão 4 Mitos e verdades sobre o suicídio Psiquiatria Introdução

De acordo com as Diretrizes Assistenciais em Saúde Mental na Saúde Suplementar, assinale a afirmativa correta.

- A Devido à baixa incidência da esquizofrenia, os custos econômicos relacionados a ela são considerados pequenos.
- B Entre os transtornos mentais graves e persistentes, estão os transtornos psicóticos e o comportamento suicida.
- C As taxas de suicídio têm diminuído nos últimos anos.
- D Esquizofrenia, ao contrário dos transtornos do humor, não é um fator de risco importante para o suicídio.
- E Idosos apresentam baixa incidência de depressão, demandando menos da assistência em saúde mental.

4000145728

Questão 5 Transtorno Psicóticos Esquizofrenia

Há cerca de quatro meses, segundo descrição de sua esposa. B., 24 anos, começou a apresentar-se mais preocupado e nervoso, com frequência andando de um lado para o outro em casa, sem conseguir ficar parado muito tempo, falando que algo de ruim ia acontecer, sem saber explicar o que era essa coisa ruim; também começou a ter dificuldade para dormir (tanto para iniciar o sono, como acordando no meio da noite com frequência). Depois de cerca de 2 meses com esse quadro, começou a dizer que via e ouvia uma sombra ruim que queria fazer mal para as pessoas da casa e ter dificuldade para fazer suas tarefas profissionais, por que não conseguia se concentrar nessas atividades devido ao medo que ficava na cabeça o tempo todo. Depois de 3 meses, começou a descuidar de sua higiene, passando dias sem tomar banho e ficando trancado em seu quarto às vezes só aceitando comida por uma fresta da porta e comendo dentro dele. Há 1 semana falou, em um momento, que a esposa queria matá-lo, para ficar sozinha com a casa que tinha comprado. Não apresentou episódios de auto e/ou heteroagressividade. Nunca tinha tido nada parecido antes. O médico do serviço de Atenção Primária à Saúde realizou uma visita domiciliar e, como acompanhava B. desde a infância e ele confiava muito nele. B. aceitou iniciar algum tratamento para ver se conseguia se sentir melhor. Afora estar com a roupa desarrumada e higiene pessoal não muito boa, não foi constatado nenhuma alteração significativa no exame físico, nem descreveu outros sintomas além dos já descritos, Qual conduta medicamentosa mais adequada para esse paciente?

- A Clorpromazina 400 mg/dia e lítio 900 mg/dia.
- B Prometazina 50 mg/dia e fluoxetina 20 mg/dia
- C Clorpromazina 400 mg/dia e fluozetina 20 mg/dia
- D Haloperidol 2,5 mg/dia e diazepam 10 mg/dia

4000144308

Questão 6 Antipsicóticos Psicofarmacologia Tratamento da Esquizofrenia

Qual efeito colateral da clozapina gerou o protocolo de hemogramas semanais e mensais?

- A Agranulocitose.
- B Anemia.
- C Reticulocitose.
- D Eosinofilia.
- E Aumento do RDW.

4000140236

Questão 7 Transtorno Psicóticos Psicopatologia e Exame do Estado Mental EEM
Transtorno Delirante Persistente

O delírio de o paciente acreditar que está infestado de pequenos organismos macroscópicos, estando essa vivência associada a alucinação tátil, é conhecido como síndrome de:

- A Gaulnick.
- B Ekbon.
- C Cotard.
- D Capgras.
- E Frégoli.

4000140234

Questão 8 Esquizofrenia Diagnóstico da Esquizofrenia

Qual é o tempo necessário de sintomas prodrômicos ou residuais para o diagnóstico de esquizofrenia de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5)?

- A 2 semanas.
- B 1 mês.
- C 3 meses.
- D 6 meses.
- E 1 ano.

4000140232

Questão 9 Esquizofrenia Diagnóstico da Esquizofrenia

De acordo com o modelo histórico de diagnóstico da esquizofrenia, é correto afirmar:

- A Para Emil Kraepelin, os sintomas psicóticos definiam a demência precoce.
- B Eugene Bleuler incluiu anedonia nos 4 As de Bleuler.
- C Alogia foi considerada por Kurt Schneider como um sintoma de primeira ordem.
- D A publicação do DSM-III definiu a esquizofrenia a partir dos sintomas descritos por Bleuler.
- E A Universidade de Washington produziu uma classificação diagnóstica para transtornos mentais conhecida como os critérios de Feighner.

4000140231

Questão 10 Exames de Neuroimagem Esquizofrenia

Um jovem de 18 anos de idade, depois de começar a trabalhar em uma agência de viagens, procura atendimento psiquiátrico por aconselhamento da gerente que observou suas dificuldades em completar uma tarefa, seguir uma instrução e escutar quando alguém está falando com ele. Tem impulsividade e agitação. É desorganizado, distraído e demonstra muitas dificuldades escolares desde a infância, pois é difícil para ele conseguir se concentrar. Há quatro anos, usa álcool e maconha diariamente, várias vezes ao dia, inclusive no horário do trabalho. Sente-se também muito triste, com baixa autoestima, desesperançoso e com vontade de morrer. Para ele, parece que nunca vai conseguir ser feliz. Sua família sempre considerou que ele era “malcriado” e “preguiçoso”, por isso nunca procurou atendimento médico para ele.

Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

Estudos de neuroimagem e patologia identificam anormalidades estruturais na apresentação da esquizofrenia, incluindo córtex pré-frontal e hipocampo menores e ventrículos aumentados, sugerindo desenvolvimento anormal.

- A Certo.
- B Errado.

4000135772

Questão 11 Psicopatologia e Exame do Estado Mental EEM Esquizofrenia

Uma mãe encaminha o filho de 22 anos de idade para atendimento. Ele está com excesso de peso, descuidado com a aparência e a higiene corporal, e veste roupas pretas, desganhadas e inadequadas para a estação. Ele fala que não sabe o motivo de ter sido levado para consulta psiquiátrica, pois não está acontecendo nada de errado com ele. Acha que quem precisa de tratamento é a mãe. “Ela é que é louca”. No entanto, a mãe conta que, há mais ou menos 15 dias, o filho tentou amputar o próprio pênis com uma faca. Foi atendido na emergência e realizada a sutura do ferimento. Apesar de nunca ter sido muito sociável, no último ano tem permanecido, a maior parte do tempo, trancado no quarto e indiferente a tudo. Mostrase cada vez mais estranho. Não aceita a comida que a mãe faz, pois fala que enxerga e sente o cheiro do veneno que ela põe. Come apenas alimentos industrializados e lacrados, como pão, margarina e refrigerante.

Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

Tipicamente na esquizofrenia, o delírio é bizarro e mal sistematizado, podendo ser primário ou secundário.

- A Certo.
- B Errado.

4000135704

Questão 12 Esquizofrenia

Uma mãe encaminha o filho de 22 anos de idade para atendimento. Ele está com excesso de peso, descuidado com a aparência e a higiene corporal, e veste roupas pretas, desganhadas e inadequadas para a estação. Ele fala que não sabe o motivo de ter sido levado para consulta psiquiátrica, pois não está acontecendo nada de errado com ele. Acha que quem precisa de tratamento é a mãe. “Ela é que é a louca”. No entanto, a mãe conta que, há mais ou menos 15 dias, o filho tentou amputar o próprio pênis com uma faca. Foi atendido na emergência e realizada a sutura do ferimento. Apesar de nunca ter sido muito sociável, no último ano tem permanecido, a maior parte do tempo, trancado no quarto e indiferente a tudo. Mostra-se cada vez mais estranho. Não aceita a comida que a mãe faz, pois fala que enxerga e sente o cheiro do veneno que ela põe. Come apenas alimentos industrializados e lacrados, como pão, margarina e refrigerante.

Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

Como referido no caso, a esquizofrenia é considerada um transtorno do neurodesenvolvimento.

☐ A Certo.

☐ B Errado.

4000135703

Questão 13 Esquizofrenia

Uma mãe encaminha o filho de 22 anos de idade para atendimento. Ele está com excesso de peso, descuidado com a aparência e a higiene corporal, e veste roupas pretas, desganhadas e inadequadas para a estação. Ele fala que não sabe o motivo de ter sido levado para consulta psiquiátrica, pois não está acontecendo nada de errado com ele. Acha que quem precisa de tratamento é a mãe. “Ela é que é a louca”. No entanto, a mãe conta que, há mais ou menos 15 dias, o filho tentou amputar o próprio pênis com uma faca. Foi atendido na emergência e realizada a sutura do ferimento. Apesar de nunca ter sido muito sociável, no último ano tem permanecido, a maior parte do tempo, trancado no quarto e indiferente a tudo. Mostrase cada vez mais estranho. Não aceita a comida que a mãe faz, pois fala que enxerga e sente o cheiro do veneno que ela põe. Come apenas alimentos industrializados e lacrados, como pão, margarina e refrigerante.

Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

O caso refere-se ao possível diagnóstico de esquizofrenia. A epidemiologia desse transtorno varia de acordo com a região, sendo maior em países considerados menos desenvolvidos, quando comparados aos mais desenvolvidos.

☐ A Certo.

☐ B Errado.

4000135702

Questão 14 Transtorno Psicóticos Transtorno de Personalidade Histriônica Transtornos Dissociativos

Uma mulher de 39 anos de idade começou a apresentar um comportamento estranho, referido pela família, que surgiu de forma rápida e aguda. Os familiares contam que, há aproximadamente seis semanas, ela começou a sentir tristeza, desânimo, diminuição do apetite, falta de interesse e insônia. Na última semana, tem estado intensamente desconfiada e fala que estão mudando o seu sexo biológico. Enxerga o próprio corpo sendo mudado para o sexo masculino. Ouve vozes dizendo-lhe que deve cortar os seios com uma faca, pois eles cresceram por ter tomado hormônios de forma involuntária, dada por seres estranhos. Acredita que a família dela também foi possuída por tais seres que colocam hormônio na comida. Por isso, come apenas alimentos que estão embalados.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

A paciente manifesta um quadro caracteristicamente dramático, infantil, sedutor e manipulativo, critérios necessários para o diagnóstico de transtorno dissociativo como comorbidade, segundo o DSM-5.

- ☐ A Certo.
- ☐ B Errado.

4000135667

Questão 15 **Transtorno Psicóticos** **Transtorno Psicótico Breve**

Uma mulher de 39 anos de idade começou a apresentar um comportamento estranho, referido pela família, que surgiu de forma rápida e aguda. Os familiares contam que, há aproximadamente seis semanas, ela começou a sentir tristeza, desânimo, diminuição do apetite, falta de interesse e insônia. Na última semana, tem estado intensamente desconfiada e fala que estão mudando o seu sexo biológico. Enxerga o próprio corpo sendo mudado para o sexo masculino. Ouve vozes dizendo-lhe que deve cortar os seios com uma faca, pois eles cresceram por ter tomado hormônios de forma involuntária, dada por seres estranhos. Acredita que a família dela também foi possuída por tais seres que colocam hormônio na comida. Por isso, come apenas alimentos que estão embalados.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

No caso clínico mencionado, podem ser identificados sintomas característicos da síndrome depressiva, da síndrome psicótica, da síndrome relacionada ao consumo de alimentos, da síndrome relacionada a substâncias psicoativas e da síndrome relacionada ao sono.

- ☐ A Certo.
- ☐ B Errado.

4000135666

Questão 16 **Esquizofrenia** **Depressão**

Uma mulher de 39 anos de idade começou a apresentar um comportamento estranho, referido pela família, que surgiu de forma rápida e aguda. Os familiares contam que, há aproximadamente seis semanas, ela começou a sentir tristeza, desânimo, diminuição do apetite, falta de interesse e insônia. Na última semana, tem estado intensamente desconfiada e fala que estão mudando o seu sexo biológico. Enxerga o próprio corpo sendo mudado para o sexo masculino. Ouve vozes dizendo-lhe que deve cortar os seios com uma faca, pois eles cresceram por ter tomado hormônios de forma involuntária, dada por seres estranhos. Acredita que a família dela também foi possuída por tais seres que colocam hormônio na comida. Por isso, come apenas alimentos que estão embalados.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

O transtorno depressivo maior (TDM), segundo o DSM-5, pode apresentar-se como um quadro grave acompanhado, ou não, por sintomas psicóticos. Portanto, esse diagnóstico deve ser fortemente considerado para o caso clínico descrito.

- ☐ A Certo.
- ☐ B Errado.

4000135664

Questão 17 **Transtorno Psicóticos** **Transtorno Delirante Persistente**

Uma mulher de 39 anos de idade começou a apresentar um comportamento estranho, referido pela família, que surgiu de

forma rápida e aguda. Os familiares contam que, há aproximadamente seis semanas, ela começou a sentir tristeza, desânimo, diminuição do apetite, falta de interesse e insônia. Na última semana, tem estado intensamente desconfiada e fala que estão mudando o seu sexo biológico. Enxerga o próprio corpo sendo mudado para o sexo masculino. Ouve vozes dizendo-lhe que deve cortar os seios com uma faca, pois eles cresceram por ter tomado hormônios de forma involuntária, dada por seres estranhos. Acredita que a família dela também foi possuída por tais seres que colocam hormônio na comida. Por isso, come apenas alimentos que estão embalados.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

No transtorno delirante, segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística (DSM-5), subtipo somático, as alucinações são proeminentes e, dessa forma, esse também deve ser considerado como diagnóstico diferencial do caso apresentado.

A Certo.

B Errado.

4000135663

Questão 18 Transtorno Psicóticos Esquizofrenia Depressão

Uma mulher de 39 anos de idade começou a apresentar um comportamento estranho, referido pela família, que surgiu de forma rápida e aguda. Os familiares contam que, há aproximadamente seis semanas, ela começou a sentir tristeza, desânimo, diminuição do apetite, falta de interesse e insônia. Na última semana, tem estado intensamente desconfiada e fala que estão mudando o seu sexo biológico. Enxerga o próprio corpo sendo mudado para o sexo masculino. Ouve vozes dizendo-lhe que deve cortar os seios com uma faca, pois eles cresceram por ter tomado hormônios de forma involuntária, dada por seres estranhos. Acredita que a família dela também foi possuída por tais seres que colocam hormônio na comida. Por isso, come apenas alimentos que estão embalados.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir.

Trata-se de uma síndrome psicótica, quadro em que é importante considerar a esquizofrenia como diagnóstico diferencial.

A Certo.

B Errado.

4000135662

Questão 19 Esquizofrenia Diagnóstico da Esquizofrenia

Em relação aos quadros de Esquizofrenia de início na infância, é incorreto afirmar:

A A Esquizofrenia precoce é uma forma rara e grave de esquizofrenia caracterizada pelo surgimento de sintomas psicóticos antes dos 12 anos de idade.

B A Esquizofrenia de início precoce é mais rara que a esquizofrenia de início na adolescência e na idade adulta, e não há relatos de início antes dos 5 anos.

C A etiologia da esquizofrenia de início na infância não é multifatorial.

D Na esquizofrenia de início na infância, o estado pré-mórbido inclui déficits neuropsicológicos em memória de trabalho, atenção e QI.

4000132089

Questão 20 Transtorno Psicóticos Transtornos Dissociativos

Leia o caso clínico a seguir.

Magda, de 35 anos, previamente hígida e sem prévio diagnóstico psiquiátrico, estava aparentemente bem até dois dias atrás. Ontem foi trazida ao pronto-socorro por ter tentado engolir água sanitária. Magda recebeu notícia sobre o assassinato do noivo em uma briga de trânsito. Inicialmente, a família notou que ela reagira com uma tranquilidade incomum, não falava e dedicava-se a atividades repetitivas, como dobrar e desdobrar roupas. Algumas horas depois, deu um grito, pegou uma garrafa de água sanitária e tentou bebê-la, sendo impedida pelo irmão. Ela caiu no chão tremendo, chorando e gritando e, depois, ficou parada “como se estivesse morta”. A família não notou movimentos tônico-clônicos ou liberação esfinteriana. Após ser levada ao hospital, foi se tornando mais responsiva, mas diz não se lembrar de nada que ocorreu após receber a notícia da morte de seu noivo. Foi mantida em observação e teve vários episódios de agitação repentina, choro e gritos, durante os quais tentou arranhar o rosto e sair do quarto. Ao exame, mostrava-se chorosa, triste e relatando desrealização e amnésia para o episódio em que tentou beber água sanitária. Os exames laboratoriais de screening e o exame físico não constatarem alterações.

Nesse caso, qual é o diagnóstico e o tratamento mais adequado para o quadro apresentado por Magda?

- A Transtorno psicótico agudo; prescrição de risperidona por pelo menos quatro semanas.
- B Episódio depressivo grave, com tentativa de suicídio; iniciar escitalopram 10 mg.
- C Transtorno de estresse pós-traumático; iniciar fluoxetina e psicoterapia.
- D Transtorno dissociativo; ofertar suporte emocional e psicoterapia.

4000131291

Questão 21 Tratamento da Esquizofrenia

Usuários com doenças psiquiátricas crônicas e refratárias deveriam ser direcionados, para acompanhamento, aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), reservando os demais casos para os níveis de Atenção Primária e Secundária. Muitos desses usuários dos CAPS apresentam diagnóstico de Esquizofrenia. Dentre os psicofármacos listados abaixo, assinale o mais eficaz para pacientes com esse diagnóstico e que não responderam aos fármacos habituais.

- A Haloperidol.
- B Clorpromazina.
- C Quetiapina.
- D Clozapina.

4000129448

Questão 22 Blues do Puerpério Psicose Puerperal Depressão Puerperal

Puérpera apresentando, 2 semanas após o parto, quadro de irritabilidade, desânimo, ansiedade e sensibilidade exacerbada à críticas. Esse quadro é altamente sugestivo de:

- A Blues Puerperal
- B Depressão puerperal
- C Esquizofrenia
- D Psicose puerperal

Essa questão possui comentário do professor no site [400002999](#)

Questão 23 **Psicose Puerperal**

Dentre os transtornos mentais do período puerperal, aquele que pode cursar com alterações da sensopercepção, do juízo de realidade, isolamento social, negativismo, ideação ou atitudes agressivas para com o recém-nascido e que se inicia até seis semanas após o termo é:

- A Baby blues
- B Depressão puerperal
- C Psicose puerperal
- D Esquizofrenia residual
- E Esquizofrenia simples

Essa questão possui comentário do professor no site [4000093760](#)

Questão 24 **Psicose Puerperal**

Dentre os transtornos mentais do período puerperal, aquele que pode cursar com alterações da sensopercepção, do juízo de realidade, isolamento social, negativismo, ideação ou atitudes agressivas para com o recém-nascido, e que se inicia até seis semanas após o termo é:

- A Baby blues.
- B Depressão puerperal.
- C Psicose puerperal.
- D Esquizofrenia residual.
- E Esquizofrenia simples.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000094730](#)

Questão 25 **Transtorno Psicóticos Psicofármacos nas Emergências Psiquiátricas**

Uma mulher com 55 anos de idade e longa história de episódios depressivos é trazida à Unidade Básica de Saúde por um Agente Comunitário de Saúde por apresentar-se delirante há várias semanas. Já na sala de espera, o quadro agrava-se progressivamente para franca agitação psicomotora, com a paciente tentando agredir outros usuários e a equipe de trabalho, por quem diz estar sendo perseguida. Nessa situação, além de realizar a contenção física da paciente, está indicado administrar

