

**Questão 1** 12 meses

Uma lactente de 13 meses de idade, de sexo feminino, é levada à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. A mãe está preocupada, pois a criança ainda não é capaz de andar sem apoio. Não há outras queixas. O pré-natal materno não possui intercorrências; nasceu de parto normal, com 40 semanas de idade gestacional; Boletim de Apgar no 1º minuto = 6; no 5º minuto = 9; e no 10º minuto = 10; com peso ao nascer = 3 200 g e comprimento ao nascer = 50 cm. No exame clínico neonatal, observou-se estalido à manobra de Ortolani à direita; na ocasião, realizou exame ultrassonográfico de quadril apresentando resultado I pelo método de Graf. Recebeu alta no segundo dia de vida. Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Desenvolvimento neuropsicomotor prévio: sorriso social aos 2 meses; fixou o pescoço aos três meses; sentou sem apoio aos sete meses; passou a distinguir familiares de estranhos e a reconhecer seu nome aos nove meses; primeiras palavras com significado aos 11 meses. Atualmente engatinha, fica em pé com apoio das mãos e arrisca alguns passos sem apoio, mas logo cai; usa copo com ajuda, compreende ordens simples, bate palma, manda beijo, fala “mama” e “papa” para referir-se à mãe e ao pai respectivamente. Não apresenta alterações ao exame clínico. A conduta adequada para essa criança, considerando o desenvolvimento da marcha é

- ☐ A manter acompanhamento de rotina.
- ☐ B encaminhar para fisioterapia motora para membros inferiores.
- ☐ C encaminhar ao neurologista devido à anoxia perinatal.
- ☐ D encaminhar ao ortopedista por suspeita de displasia congênita do quadril.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153213](#)

**Questão 2** Avaliando o desenvolvimento

Lactente de 6 meses de vida é conduzido para consulta de puericultura. Está em aleitamento materno exclusivo, sem queixas. Não faz uso de nenhuma medicação. Refere gestação e parto sem intercorrências. Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, qual alternativa configura atraso para um lactente de 6 meses?

- ☐ A Senta somente com apoio.
- ☐ B Não engatinha.
- ☐ C Não sustenta a cabeça.
- ☐ D Não pega em pinça.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171542](#)

**Questão 3** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor

De acordo com GUSSO e LOPES, os problemas no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) são, em geral, subdiagnosticados, sendo importante o conhecimento completo acerca do desenvolvimento normal de uma criança, bem como dos seus sinais de alerta vermelho. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- A A primeira avaliação do DNPM deverá ocorrer no hospital, logo após o nascimento.
- B Nenhuma criança começa a caminhar antes de conseguir sentar-se.
- C As aquisições neuropsicomotoras são sequenciais e evoluem no sentido craniocaudal.
- D Toda criança consegue sentar-se antes de controlar a cabeça.
- E A responsabilidade do médico de família e comunidade no DNPM inicia-se o mais precocemente possível, de preferência aos 15 dias de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171237](#)

**Questão 4** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria** **Marcos Importantes**

Considerando o desenvolvimento neuromotor, o desaparecimento do reflexo tônico assimétrico significa que uma criança pode começar a examinar objetos na linha média e manipulá-los com ambas as mãos. Essa etapa do desenvolvimento é esperada que aconteça a partir da faixa etária de:

- A 7-14 dias de vida.
- B 15-30 dias de vida.
- C 2-6 meses de vida.
- D 9-12 meses de vida.
- E 15-18 meses de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145765](#)

**Questão 5** **Pediatria** **Marcos Importantes**

Em relação aos marcos do desenvolvimento normal da criança até os 2 anos, marque a resposta correta, considerando a média normal da idade da conquista:

- A Sustenta a cabeça até 1 ano
- B Senta sem apoio até 2 anos
- C Sorri em resposta a voz com 1 mês e meio
- D Alcança objetos com 8 meses

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144840](#)

**Questão 6** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Atuando em seguimento de puericultura, você orienta aos pais que uma criança de quatro meses deve ser capaz de:

- A Sentar sem apoio
- B Falar dissílabos como ""mama"" ""papa"" e ""dada""
- C Realizar pinça com polegar e indicador
- D Dar ""tchau""
- E Seguir com olhar em 180°

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144790](#)

**Questão 7** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Lactente, 5 meses de idade, nascido a termo, sem intercorrências neonatais, veio à consulta de puericultura. O médico observa que a criança consegue rolar de decúbito dorsal para ventral, segurar chocalho e depois levá-lo à boca e virar a cabeça para localizar a fonte do som. Que outra habilidade é esperada para uma criança desta idade?

- A Imitar gestos como bater palma, dar tchau.
- B Apontar para brinquedo desejado.
- C Descobrir brinquedo sob um pano.
- D Interagir com a mãe, sorrindo e vocalizando.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144744](#)

**Questão 8** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria** **Marcos Importantes**

Lactente de 6 meses de vida, sexo feminino, é trazida pelos genitores para consulta de puericultura na Unidade Básica de Saúde. O Médico de Família e Comunidade, supervisiona o atendimento dos residentes, lançando a seguinte pergunta ""qual o marco do desenvolvimento motor, espera-se encontrar?""

- A Sentar sem apoio.
- B Mostrar o que quer.
- C Usar colher para comer.
- D Pegar um objeto com movimento de pinça.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144416](#)

**Questão 9** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Menina, 8 meses de idade, é levada à Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta de rotina. Nasceu de parto natural a termo, pesando 3.300g; medindo 49cm e com Perímetro Cefálico medindo 34cm. Atualmente pesa 8.000g e mede 67,5cm (escore z: em ambos, entre -1 e +1). Está em aleitamento materno exclusivo.

Considerando que essa criança apresenta desenvolvimento neuropsicomotor adequado à idade, identifique entre as capacidades listadas a que mostra aquela que ela já deve ser capaz de executar atualmente.

- A Empilhar cubos.
- B Levantar-se sozinha com apoio.
- C Transferir objetos de uma mão para outra.
- D Pegar objetos em pinça com o polegar e o indicador.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144182](#)

**Questão 10** Medicina Preventiva DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Marcos Importantes

Dentre as opções abaixo, aquela que representa o marco de desenvolvimento que surge no segundo mês de vida do lactente é:

- A seguir objeto ultrapassando a linha média.
- B seguir com olhar até 180° sem mexer a cabeça.
- C observar sua própria mão e os pés.
- D sentar-se com apoio sustentando a cabeça.
- E procurar objetos além de seu alcance.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000143573](#)

**Questão 11** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria

Ao examinar um lactente, sexo feminino, de 18 meses, observam-se as seguintes medidas evolutivas do PC: ao nascer (35 cm), 1 mês (37 cm), 4 meses (42 cm), 7 meses (44 cm), 9 meses (44,5 cm), 12 meses (44,5 cm). Desenvolvimento: sorriso social com dois meses, gargalhadas com quatro meses, sentou-se com sete meses, arrastou-se com nove meses e balbúcio de sons consonantais com dez meses. Atualmente, não fica de pé com apoio, não engatinha, emite sons guturais, não pega o brinquedo ou objetos em seu campo de alcance. Tem contato visual, mas não compreende jogos de esconde-esconde, dança, acenar adeus ou bater palmas. Realiza movimentos repetitivos e estereotipados de mãos, do tipo lavar ou esfregar. Há um mês apresentou quatro crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas. O diagnóstico síndrome é:

- A Paralisia cerebral.
- B Transtorno do espectro autista.
- C Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.
- D Regressão do desenvolvimento neuropsicomotor.
- E Epilepsia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000143093](#)

**Questão 12** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria

O recém-nascido apresenta alguns reflexos primitivos que desaparecem até os seis meses de idade e que devem ser avaliados rotineiramente pelo pediatra na consulta de puericultura, uma vez que revelam informações sobre o seu estado de saúde. Assinale a opção correta, acerca do reflexo de Moro.

- A** Ao se tocarem os lábios ou a bochecha da criança com um objeto, desencadeiam-se movimentos de sucção nos lábios e na língua.
- B** Quando há estímulo contínuo da planta do pé, do calcanhar até os artelhos (dedos), o que se observa é a extensão dos dedos.
- C** Há um movimento involuntário do corpo do bebê, consistente na reação dos músculos dos braços de forma protetora, em uma situação que cause insegurança frente a um estímulo repentino.
- D** Ao se segurar a criança pelas axilas com leve inclinação para frente, ao contato dos pés com a superfície, ela realiza uma marcha reflexa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142912](#)

**Questão 13** **Pediatria** **Marcos Importantes**

Em relação aos marcos de desenvolvimento de uma criança na faixa etária de 7 meses, assinale a opção correta.

- A** Em decúbito dorsal levanta a cabeça, permanece sentada sem apoio, sacode o chocalho e troca de mão.
- B** Da posição sentada passa a postura de pé, apresenta duplicidade de sílabas no balbucio.
- C** Permanece de pé, responde ao seu nome, pronuncia as primeiras palavras.
- D** É capaz de realizar a preensão com o polegar e o indicador, engatinha e imita sons.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142910](#)

**Questão 14** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Um bebê que tenta alcançar um brinquedo, volta-se para o som, rola no leito, tenta chamar a atenção da mãe por meio de sorriso, vocalização, gestos, pedido de colo.

Considera-se desenvolvimento neuropsicomotor adequado se esse bebe tiver

- A** 2 meses de vida.
- B** 4 meses de vida.
- C** 6 meses de vida.
- D** 9 meses de vida.
- E** 12 meses de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142173](#)

**Questão 15** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Os marcos de desenvolvimento são parâmetros utilizados para avaliar desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Sendo assim, ao examinar um lactente de 9 meses, o que deveríamos encontrar:

- I - Senta-se sem apoio.
- II - Tira a roupa sozinho.
- III - Transmite objetos de uma mão para outra.

IV - Fala algumas palavras.

V - Pega objetos com pinça (polegar e indicador).

Estão corretas:

- ☐ A I, II e III, apenas.
- ☐ B I, III e V, apenas.
- ☐ C III, IV e V, apenas.
- ☐ D II e IV, apenas.
- ☐ E I e II, apenas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142120](#)

**Questão 16** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Mãe de um lactente de cinco meses chega à consulta com alguns questionamentos a respeito do desenvolvimento do seu filho. Ela queixa que ele não sustenta a cabeça e que seu filho mais velho já o fazia nessa idade. Nascido de parto cesárea por sofrimento fetal, banhado em mecônio espesso, necessitando de reanimação em sala de parto, Apgar 1 no primeiro minuto, 4 no quinto minuto e 7 no décimo minuto. Peso de nascimento: 2950g, comprimento: 50 cm. Exame físico: eleva momentaneamente a cabeça em posição de prono e sorri, faz semiflexão dos cotovelos e pronação do antebraço e flexão de punhos e dedos, reflexo tônico cervical assimétrico, reflexo de Moro exacerbado. Nessa situação, deve-se informar à mãe que seu filho apresenta

- ☐ A limites normais do desenvolvimento neuropsicomotor e necessita de estimulação em casa.
- ☐ B distúrbio neuropsicomotor pela asfixia perinatal e que terá um atraso definitivo físico e motor.
- ☐ C distúrbio neuropsicomotor temporário pela asfixia perinatal e que irá se desenvolver normalmente.
- ☐ D distúrbio neuropsicomotor pela asfixia perinatal e necessita de acompanhamento multiprofissional.
- ☐ E distúrbio neuropsicomotor pela asfixia perinatal e necessita ser acompanhado apenas com estudo de neurológico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142118](#)

**Questão 17** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Estaremos diante de um alerta para atraso do desenvolvimento neuropsicomotor se aos 9 meses o lactente:

- ☐ A Não anda
- ☐ B Não fala uma palavra
- ☐ C Não engatinha
- ☐ D Não senta sem apoio

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142039](#)

**Questão 18** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Segundo os marcos aceitáveis de desenvolvimento neuropsicomotor, uma lactente com 7 meses de idade NÃO é capaz de:

- ☐ A sorrir e balbuciar para seus pais e pessoas de convívio próximo
- ☐ B falar "papa" e "mama"
- ☐ C voltar-se para um ruído sonoro
- ☐ D capturar objetos levando a boca
- ☐ E rolar sobre o corpo, engatinhar ou arrastar-se

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141472](#)

**Questão 19** 10 meses **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Menina de 10 meses é trazida para consulta de puericultura. A única preocupação materna é em relação ao comportamento de sua filha. Diz que ela sempre foi uma criança calma e tranquila, mas no último mês ela chora na presença de estranhos e quer ficar no colo da mãe. Ela senta sem apoio, fica em pé com apoio, mas ainda não engatinha e não anda. Fala apenas "mama" para chamar a mãe e outras sílabas sem sentido. No consultório, ela chorou bastante, mas se acalmou no colo da mãe e brincou de esconde-achou. Quando o médico lhe ofereceu a espátula, ela olhou primeiro para a mãe e depois pegou em movimento de pinça e levou o objeto à boca.

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, pode-se afirmar, corretamente, que

- ☐ A está normal para a idade.
- ☐ B o comportamento está normal, mas ela tem atraso motor porque ainda não engatinha.
- ☐ C há um provável problema emocional e a criança apresenta sinais de apego inseguro.
- ☐ D a linguagem está atrasada, uma vez que ela fala apenas uma palavra com significado.
- ☐ E a criança deve ser encaminhada para o neuropediatra, pois apresenta um atraso global.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141062](#)

**Questão 20** **Pediatria** 9 meses

Menina, 9 meses de idade, nascida a termo, com peso adequado para idade gestacional, sem intercorrências na gravidez ou no parto. Trazida pela mãe ao ambulatório para consulta pediátrica. Mãe sem queixas e nega alterações desde última consulta.

Qual achado de exame físico demonstraria possível atraso de desenvolvimento neuropsicomotor?

- ☐ A Não fica em pé sem apoio.
- ☐ B Não consegue engatinhar.
- ☐ C Não ajuda ao ser levantada pelos braços do decúbito dorsal.
- ☐ D Não fala palavras isoladas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000140707](#)

**Questão 21** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Lactente de 8 meses de idade, com desenvolvimento normal, é trazido para a consulta de puericultura. Durante o exame físico, o médico segura a criança pela axila em posição ereta, como se a lançasse sobre uma superfície, e ela estica os braços para se defender e impedir a queda.

Essa manobra denomina-se:

- ☐ A reflexo de Landau.
- ☐ B reflexo de Moro.
- ☐ C reflexo de Magnus-Klein.
- ☐ D reflexo do ameaço.
- ☐ E reflexo do paraquedas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000139896](#)

**Questão 22** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria** **Marcos Importantes**

Durante uma consulta de puericultura de um lactente de quatro meses, com o desenvolvimento normal, de acordo com os marcos do desenvolvimento motor, o pediatra deve observar que ele é capaz de:

- ☐ A transmitir objetos de uma mão para a outra.
- ☐ B efetuar pinça polegar-dedo.
- ☐ C sentar com apoio, sustentar a cabeça.
- ☐ D rolar no leito.
- ☐ E ficar em pé.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000138132](#)

**Questão 23** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

“A vigilância do desenvolvimento é um processo contínuo de acompanhamento das atividades relacionadas à promoção do potencial de desenvolvimento da criança e à detecção de problemas”. É através deste parágrafo retirado da Caderneta de Saúde da Criança que reforça-se o bom cuidado.

Sendo assim, em relação ao desenvolvimento infantil assinale a alternativa CORRETA:

- ☐ A Com 9 meses conseguem engatinhar ou ficar de pé com apoio, sustentando seu peso sobre os membros inferiores;
- ☐ B Com 6 meses o lactente senta e faz pega em pinça;
- ☐ C Com 4 meses o lactente imita muitos sons, como por exemplo “dada” ou “gaga”;
- ☐ D Com 3 meses é capaz de virar de prono para supino e vice-versa, usando o rolar como forma de locomoção;
- ☐ E Com 7 meses ainda não consegue emitir sílabas isoladas e vocalizar sons diferentes para expressar sentimentos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000133240](#)



**Questão 24****DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor****Pediatria****Avaliando o desenvolvimento**

Criança de três anos de idade é levada ao pediatra devido à preocupação dos pais com o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). Eles relatam que o filho nasceu a termo com 40 semanas e três dias de gestação, peso ao nascer: 3.045 kg, comprimento: 49 cm, perímetro cefálico: 34 cm e Apgar 9/9. Apresentou um episódio de convulsão febril aos dois anos de idade e foi apenas avaliado pelo neurologista, não fazendo uso de medicações. É ainda portadora do traço de anemia falciforme.

Após seu exame físico, e de acordo com os marcos do DNPM para a idade, assinale a alternativa que não está de acordo com o quadro anterior.

- ☐ A A criança deverá ser capaz de empilhar pelo menos seis cubos sem que eles caiam quando ela retira a mão.
- ☐ B A criança deverá construir frases com pelo menos duas palavras com significado.
- ☐ C A criança deverá ser capaz de retirar uma peça de roupa sozinha, mas ainda não deverá conseguir vestir a mesma peça de roupa.
- ☐ D A criança deve ser capaz de andar para traz sem cair.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000132844](#)

**Questão 25****DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor****Pediatria****Marcos Importantes**

Criança de sete meses, sexo masculino, é levada a uma consulta de rotina com queixa única dos pais que têm observado, que desde os seis meses, a criança tem “estranhado o estranho”; sempre quando chega alguém não familiar ela chora e esconde o rosto. Cartão vacinal em dia. Aleitamento materno exclusivo por seis meses, atualmente em uso de fórmula infantil mais papinha de sal e frutas.

Em seu exame físico, criança com adequado desenvolvimento poderostatural, marcos do desenvolvimento normais, mas chorando muito durante a realização do exame.

Mediante o caso apresentado, a melhor conduta é:

- ☐ A Tranquilizar os familiares e dizer que esse comportamento é normal para a idade.
- ☐ B Encaminhar a criança para uma avaliação neurológica e psiquiátrica.
- ☐ C Indicar escola de recreação infantil para melhorar a interação social.
- ☐ D Solicitar acompanhamento de psicologia infantil.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000132829](#)

**Questão 26****DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor****Marcos Importantes****Avaliando o desenvolvimento**

Lactente de um ano e dois meses engatinha e anda com apoio, consegue apanhar objetos, reconhece a mãe, aponta o que quer e imita gestos, como bater palmas e dar tchau. Entretanto, ainda não fala palavra alguma nem mantém jargão (fala com emissão de sons com entonação e sem significado). Esse lactente tem:

- A Desenvolvimento normal para sua idade.
- B Autismo, pois já deveria estar falando algumas palavras.
- C Possível atraso no desenvolvimento, pois ainda não anda.
- D Atraso na aquisição da linguagem, sendo necessária investigação
- E Nenhuma das anteriores está correta.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000124393](#)

**Questão 27** Marcos Importantes Avaliando o desenvolvimento

Você preenche a Caderneta da Criança no primeiro mês de vida de seu paciente e, somando-se às informações maternas e sua observação na consulta, conclui que o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) está adequado. Qual das alternativas contém o preenchimento compatível com essa condição? braços e pernas flexionados em supino; observa olhar a 30cm; reage ao som de chocalho com mudança de expressão - facial/movimento dos olhos; em prono, levanta a cabeça sem virar para os lados

- A P; P; P; P
- B NA; P; P; P
- C NA; F; P; NA
- D F; P; P; NA

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119720](#)

**Questão 28** 9 meses

A preocupação materna quanto ao desenvolvimento motor de um lactente de 9 meses de idade deve ser valorizada quando a criança não for capaz de?

- A Sentar sem apoio.
- B Andar sem apoio.
- C Apontar o que der.
- D Engatinhar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119650](#)

**Questão 29** 9 meses

Você atende a família de uma criança de 12 meses com queixa de que o menino ainda não fala. A mãe relata que a criança fica em pé sem apoio e sorri. Qual das alternativas abaixo chamaria a atenção na avaliação do desenvolvimento da linguagem deste lactente?

- A Ausência de teste da linguinha.
- B Criança não frequenta creche e fica sozinha com a mãe em casa.
- C Ausência de teste da orelhinha.
- D Criança frequenta a creche e não brinca com as outras crianças.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119296](#)

**Questão 30** 10 meses 12 meses

Maria, 11 meses de idade, está ao lado de sua mãe e de sua tia. Elas conversam sobre crianças. Consideram a garotinha muito esperta: há um mês já ficava em pé sem apoio e agora dá vários passos sem auxílio. Qual o marco motor anterior a “ficar em pé” e qual uma idade esperada para que seja observado?

- A Sustentar a cabeça, 4 meses
- B Engatinhar, 3 meses.
- C Sentar-se sem apoio, 7 meses.
- D Primeiras palavras, 9 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000117331](#)

**Questão 31** Marcos Importantes

É considerado atraso no desenvolvimento de uma criança nascida a termo

- A não transmitir objetos de uma mão para outra aos 5 meses.
- B não rolar no leito aos 4 meses.
- C sentar apenas com apoio aos 7 meses.
- D não sustentar a cabeça aos 3 meses.
- E não sorrir aos 2 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000117017](#)

**Questão 32** 3 meses

Espera-se que, no desenvolvimento normal para a idade, um lactente de 3 meses de vida seja capaz de

- A segurar objetos, emitir sons, ter resposta ativa ao contato social
- B observar um rosto, brincar de esconde-achou, levar objetos a boca.
- C sorrir quando estimulada, transferir objetos de uma mão para outra, reagir ao som.
- D fazer pinça, mudar de posição ativamente, movimentar ativamente os quatromembros.
- E levantar a cabeça ao ser colocada de bruços, imitar gestos, abrir as mãos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000115234](#)

**Questão 33** 6 meses

Lactente com história de gestação e parto sem intercorrências; nasceu a termo e com APGAR 9/10. Ao exame, sustenta a cabeça, roda sobre o próprio eixo, acompanha os olhos do examinador, sorri e reage com gargalhadas aos estímulos maternos. Colocado sentado, não se sustenta e cai. SUA IDADE PROVÁVEL, EM MESES, É:

- A 7
- B 3
- C 9
- D 5

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114485](#)

**Questão 34** Marcos Importantes

Em que idade há um maior desenvolvimento das funções executivas?

- A 0 – 12 meses.
- B 12 – 24 meses.
- C 10 – 14 anos.
- D 3 – 5 anos.
- E 6 – 9 anos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111552](#)

**Questão 35** Marcos Importantes

Uma criança é trazida ao seu consultório para puericultura. Ela é capaz de colocar uma camiseta sozinha, mas necessita de ajuda para se vestir completamente. Ela consegue copiar um círculo mas tem dificuldade para copiar um quadrado. Sua fala é bem compreensível e ela conhece quatro cores. É capaz de se equilibrar em um pé só por 2 segundos, mas não consegue manter-se assim por 5 segundos. Considerando que se trata de uma criança com desenvolvimento normal, qual das seguintes é mais provavelmente a idade desta menina?

- A 2 anos
- B 4 anos
- C 3 anos
- D 5 anos

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109579](#)

**Questão 36** 10 meses

A mãe de uma criança de 10 meses de idade está preocupada porque a sua filha não engatinha. A menina nasceu de parto normal com 35 semanas de gestação, com peso de 2100 g e APGAR 6 e 8. Vem evoluindo com bom ganho ponderoestatural e nunca ficou doente. Em relação ao desenvolvimento, diz que ela fica em pé com apoio, ainda não anda, nem com apoio, e refere que a filha é canhota, porque sempre pega os objetos e dá tchau com a mão esquerda. A bebê fala apenas mama e dada, mas sem significados específicos, e é alegre, mas chora muito na presença de estranhos. Quanto

ao quadro apresentado, é considerado um sinal de alerta o fato de esse bebê

- A não engatinhar ainda.
- B não falar palavras com significado.
- C chorar na presença de estranhos.
- D dar preferência para pegar os objetos com a mão esquerda.
- E não andar ainda.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108240](#)

### Respostas:

1	A	2	C	3	D	4	C	5	C	6	E	7	D	8	A	9	C	10	A	11	D
12	C	13	A	14	C	15	B	16	D	17	D	18	B	19	A	20	C	21	E	22	C
23	A	24	C	25	A	26	D	27	A	28	A	29	C	30	C	31	E	32	A	33	D
34	D	35	B	36	D																