

Questão 1 **Esquizofrenia**

A catatonia é um quadro sindrômico caracterizado por alteração grave da volição e da motricidade, dificultando o manejo do paciente na enfermaria, tendo em vista o negativismo, a recusa alimentar, entre outros sintomas. O tratamento farmacológico mais adequado para o manejo de pacientes catatônicos é

- A lorazepam.
- B risperidona.
- C clozapina.
- D fluoxetina.

4000177584

Questão 2 **Esquizofrenia** **Diagnóstico da Esquizofrenia**

A esquizofrenia é um dos mais comuns transtornos mentais graves, mas sua natureza essencial ainda não foi esclarecida; portanto, às vezes, ela é referida como uma síndrome, como o grupo de esquizofrenias ou, como na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o espectro da esquizofrenia.

Em relação aos critérios diagnósticos da esquizofrenia, assinale a afirmativa **incorreta**.

- A Se há história de transtorno do espectro autista ou de um transtorno da comunicação iniciado na infância, o diagnóstico adicional de esquizofrenia é realizado somente se delírios ou alucinações proeminentes, além dos demais sintomas exigidos de esquizofrenia, estiverem também presentes por pelo menos um mês (ou menos, se tratados com sucesso).
- B Os sintomas devem persistir por pelo menos seis meses, e não deve haver um diagnóstico de transtorno esquizoafetivo ou transtorno do humo
- C Deve haver dois dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de um mês (ou menos, se tratados com sucesso): delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e/ou sintomas negativos (i.e., expressão emocional diminuída ou avolia).
- D A presença de alucinações ou delírios é necessária para um diagnóstico de esquizofrenia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000177262](#)**Questão 3** **Transtorno Psicóticos** **Transtorno Delirante Persistente**

Um homem de 40 anos de idade é preso e mandado para observação após repetidamente invadir o escritório local de uma repartição pública, com acusação de que ali seria uma base da Agência Central de Inteligência (CIA), que estaria espionando-o com a intenção de assassiná-lo, porque ele tem parentes que vivem na Rússia. O exame de seu estado mental é normal, exceto pelo pensamento delirante referente à repartição. Quando sua esposa o visita, observa-se que ela tem uma espécie de relação passiva com o marido e defende explicitamente as mesmas convicções que o levaram à prisão, embora, sob outros aspectos, apresente um estado mental normal. O diagnóstico mais provável para esta mulher é

- A esquizofrenia paranoide.
- B transtorno psicótico compartilhado.
- C transtorno de personalidade paranoide.
- D transtorno obsessivo-compulsivo.
- E transtorno de personalidade esquiva.

4000171067

Questão 4 Transtorno Psicóticos Psicofármacos nas Emergências Psiquiátricas

Gustavo, 75 anos, morador de uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) chega ao pronto-atendimento (PA) assustado, aos gritos, dizendo que os médicos, os familiares e cuidadores estão sendo controlados por extraterrestres para abduzi-lo e matá-lo. Mostra-se muito agressivo com a equipe médica, resiste a qualquer aproximação, profere palavrões e tenta agredir, ao menor contato. O quadro começou há dois dias, com piora gradativa. Não há história prévia de sintomas sugestivos de doença mental. A conduta mais adequada seria

- A prescrever haloperidol gotas para ser administrado na ILPI, sendo que, se não houver melhora, deverá ser consultado um psiquiatra.
- B providenciar, em primeiro plano, exames de imagem e laboratoriais para investigação etiológica e, logo após, prescrever antipsicótico de acordo com os achados e orientações da equipe de psiquiatria.
- C realizar contenção, preferencialmente química, até o paciente se acalmar. Em seguida, realizar investigação etiológica mais detalhada.
- D investir no diálogo empático para acalmar o paciente, prescrever risperidona e clorpromazina oral, depois referenciar ao psiquiatra.
- E administrar diazepam, IM, 10mg 1x ao dia, até o paciente retomar suas atividades habituais na ILPI.

4000171061

Questão 5 Transtorno Psicóticos Esquizofrenia

Homem, 20 anos de idade, é levado ao PS por episódio de agressividade há 1 dia. A mãe refere que ele passou a ficar mais calado e isolado, há 8 meses. Ele abandonou o emprego, pois se sentia desconfortável com os colegas, alegando que comentavam sobre ele e queriam lhe prejudicar frente ao chefe. Passou a escutar vozes, que o xingavam em alguns momentos, falava coisas sem sentido e tinha crises de choro. Chegou a relatar à sua mãe que pensava em se jogar na frente do trem para acabar com seu sofrimento. Vem progressivamente piorando. Faz uso regular de maconha há 1 ano, sendo o último consumo há 2 meses. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Episódio depressivo grave, com sintomas psicóticos.
- B Transtorno psicótico induzido por drogas (*cannabis*).
- C Esquizofrenia paranoide.
- D Transtorno delirante persistente.

4000166320

Questão 6 Esquizofrenia

Você está tratando de um paciente de 22 anos com um quadro de esquizofrenia. Inicialmente, você prescreveu haloperidol 15mg e observou, após 3 meses, não houve nenhuma resposta. Depois da primeira tentativa frustrada, você trocou o haloperidol por olanzapina 20mg e, após 2 meses, notou uma resposta terapêutica pobre, então decidiu que o melhor é mudar sua estratégia.

Diante desse contexto, quais são: a melhor descrição do diagnóstico e a melhor conduta?

- ☐ A Esquizofrenia aguda. Iniciar terapia psicanalítica.
- ☐ B Esquizofrenia super-refratária. Associar quetiapina + lítio.
- ☐ C Esquizofrenia refratária. Iniciar risperidona.
- ☐ D Esquizofrenia refratária. Iniciar clozapina.
- ☐ E Esquizofrenia. Iniciar lamotrigina + clorpromazina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147683](#)

Questão 7 **Esquizofrenia**

Seu Altamiro procura o postinho de saúde acompanhado de seu genro Carlos, sua filha Adriana e seu filho Rodolfo, que foi levado “na marra” pelos familiares para uma avaliação médica. A família conta que Rodolfo, de 19 anos, está mais calado e introspectivo há 6 meses, tem saído pouco do quarto, tem apresentado desleixo com sua aparência e abandonou a faculdade de engenharia naval. Além disso, há cerca de 40 dias, o paciente também tem dado gargalhadas no escuro, grita diversas ofensas pela janela para pessoas que passam na rua e acha que o cachorro do vizinho tem feito xixi no gramado de sua casa para provocá-lo. Apesar de toda a insistência de sua família, o paciente nega-se veementemente a aceitar ajuda especializada e refuta a possibilidade de tomar remédios. Inclusive, deu um “cruzado” no rosto do pai e cuspiu na mãe e na irmã, que correram para acudir seu Altamiro, além de atirar uma faca contra seu cunhado, que passou de raspão.

Diante desse cenário, assinale o provável diagnóstico de Rodolfo.

- ☐ A Mania Bipolar
- ☐ B Depressão Psicótica
- ☐ C Esquizofrenia Paranoide
- ☐ D Esquizofrenia Catatônica
- ☐ E Transtorno esquizoafetivo

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147681](#)

Questão 8 **Transtorno Psicóticos**

A paciente Jéssica Lorraine, 28 anos, está apresentando um comportamento “diferente” há 18 dias. Apresenta risos imotivados, acusa sua irmã de ser uma espiã da antiga união soviética e acredita que sua mãe deseja envenená-la, colocando veneno de rato na sua comida. O quadro iniciou-se abruptamente, após ser acusada de furtar 12 reais do caixa do mercadinho em que trabalha. Após avaliação médica, a paciente é internada, inicia o tratamento com antipsicótico e tem uma melhora completa do quadro após uma semana, com retorno a sua funcionalidade e padrão de comportamento.

A hipótese diagnóstica para o caso é de:

- A Transtorno psicótico breve.
- B Transtorno esquizofreniforme.
- C Esquizofrenia.
- D Mania Bipolar.
- E Transtorno esquizoafetivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147680](#)

Questão 9 Transtorno Psicóticos Transtorno Esquizofreniforme

Paciente Lucileide, 24 anos, está apresentando um comportamento “diferente” há 38 dias. Apresenta risos imotivados, acusa sua irmã de ser uma espiã da antiga união soviética e acredita que sua mãe deseja envenená-la, colocando veneno de rato na sua comida. O quadro iniciou-se abruptamente após a paciente ser acusada de furtar 25 reais da carteira de seu primo. Após avaliação médica, a paciente é internada, inicia o tratamento com antipsicótico e tem uma melhora completa do quadro após 4 semanas, com retorno a sua funcionalidade e padrão de comportamento.

A hipótese diagnóstica para o caso, de acordo com o DSM-5, é de:

- A Transtorno psicótico breve.
- B Transtorno esquizofreniforme.
- C Esquizofrenia.
- D Mania Bipolar.
- E Transtorno esquizoafetivo.

4000147589

Questão 10 Transtorno Psicóticos Esquizofrenia

Há cerca de quatro meses, segundo descrição de sua esposa. B., 24 anos, começou a apresentar-se mais preocupado e nervoso, com frequência andando de um lado para o outro em casa, sem conseguir ficar parado muito tempo, falando que algo de ruim ia acontecer, sem saber explicar o que era essa coisa ruim; também começou a ter dificuldade para dormir (tanto para iniciar o sono, como acordando no meio da noite com frequência). Depois de cerca de 2 meses com esse quadro, começou a dizer que via e ouvia uma sombra ruim que queria fazer mal para as pessoas da casa e ter dificuldade para fazer suas tarefas profissionais, por que não conseguia se concentrar nessas atividades devido ao medo que ficava na cabeça o tempo todo. Depois de 3 meses, começou a descuidar de sua higiene, passando dias sem tomar banho e ficando trancado em seu quarto às vezes só aceitando comida por uma fresta da porta e comendo dentro dele. Há 1 semana falou, em um momento, que a esposa queria matá-lo, para ficar sozinho com a casa que tinha comprado. Não apresentou episódios de auto e/ou heteroagressividade. Nunca tinha tido nada parecido antes. O médico do serviço de Atenção Primária à Saúde realizou uma visita domiciliar e, como acompanhava B. desde a infância e ele confiava muito nele. B. aceitou iniciar algum tratamento para ver se conseguia se sentir melhor. Afora estar com a roupa desarrumada e higiene pessoal não muito boa, não foi contatado nenhuma alteração significativa no exame físico, nem descreveu outros sintomas além dos já descritos, Qual conduta medicamentosa mais adequada para esse paciente?

- A Clorpromazina 400 mg/dia e lítio 900 mg/dia.
- B Prometazina 50 mg/dia e fluoxetina 20 mg/dia
- C Clorpromazina 400 mg/dia e fluozetina 20 mg/dia
- D Haloperidol 2,5 mg/dia e diazepam 10 mg/dia

4000144308

Questão 11 Esquizofrenia Diagnóstico da Esquizofrenia

Qual é o tempo necessário de sintomas prodrômicos ou residuais para o diagnóstico de esquizofrenia de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5)?

- A 2 semanas.
- B 1 mês.
- C 3 meses.
- D 6 meses.
- E 1 ano.

4000140232

Questão 12 Transtorno Psicóticos Transtornos Dissociativos

Leia o caso clínico a seguir.

Magda, de 35 anos, previamente hígida e sem prévio diagnóstico psiquiátrico, estava aparentemente bem até dois dias atrás. Ontem foi trazida ao pronto-socorro por ter tentado engolir água sanitária. Magda recebeu notícia sobre o assassinato do noivo em uma briga de trânsito. Inicialmente, a família notou que ela reagira com uma tranquilidade incomum, não falava e dedicava-se a atividades repetitivas, como dobrar e desdobrar roupas. Algumas horas depois, deu um grito, pegou uma garrafa de água sanitária e tentou bebê-la, sendo impedida pelo irmão. Ela caiu no chão tremendo, chorando e gritando e, depois, ficou parada “como se estivesse morta”. A família não notou movimentos tônico-clônicos ou liberação esfinteriana. Após ser levada ao hospital, foi se tornando mais responsiva, mas diz não se lembrar de nada que ocorreu após receber a notícia da morte de seu noivo. Foi mantida em observação e teve vários episódios de agitação repentina, choro e gritos, durante os quais tentou arranhar o rosto e sair do quarto. Ao exame, mostrava-se chorosa, triste e relatando desrealização e amnésia para o episódio em que tentou beber água sanitária. Os exames laboratoriais de screening e o exame físico não constatarem alterações.

Nesse caso, qual é o diagnóstico e o tratamento mais adequado para o quadro apresentado por Magda?

- A Transtorno psicótico agudo; prescrição de risperidona por pelo menos quatro semanas.
- B Episódio depressivo grave, com tentativa de suicídio; iniciar escitalopram 10 mg.
- C Transtorno de estresse pós-traumático; iniciar fluoxetina e psicoterapia.
- D Transtorno dissociativo; ofertar suporte emocional e psicoterapia.

4000131291

Questão 13 Transtorno Psicóticos

Homem, 23 anos de idade, é trazido à Unidade de Pronto Atendimento por familiares preocupados com o seu comportamento. Paciente relata que passou a ser perseguido pela máfia por ter descoberto segredos de uma religião antiga. Os pais relatam que ele tem falado desses conteúdos há dois meses, se afastado dos amigos e faltado às aulas na faculdade há oito meses. Refere grande tristeza, pois não entende o motivo da perseguição. Apresenta comportamento desorganizado, parece distanciado afetivamente, mesmo das pessoas mais próximas, e sai pouco de casa espontaneamente. Nega alucinações auditivas ou visuais e não tem histórico de uso de substâncias de abuso. Exame físico geral e neurológico: sem alterações. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Transtorno delirante persistente
- B Transtorno esquizofreniforme
- C Episódio depressivo com sintomas psicóticos
- D Transtorno esquizoafetivo
- E Esquizofrenia

Essa questão possui comentário do professor no site [4000012370](#)

Questão 14 **Transtorno Psicóticos** **Dependência Química**

Homem, 22 anos de idade, chega ao pronto-socorro com história de alteração do comportamento há 2 dias, tendo agredido a mãe há poucas horas. Acusa os pais de colocarem câmeras pela casa para vigiá-lo e de tentarem envenená-lo. Os pais relatam que o paciente faz uso abusivo de álcool e uso regular de maconha há um ano, além de grandes quantidades de cocaína no último mês. Negam doenças prévias do filho e referem história de dependência química e de esquizofrenia na família (tio e primos). O exame clínico é normal e o do estado mental revelou desorientação alopsíquica, hipotenacidade, agitação psicomotora, ideias delirantes de caráter persecutório. O diagnóstico e o tratamento inicial no pronto-socorro, respectivamente, são:

- A Síndrome de abstinência alcoólica; diazepam ou lorazepam.
- B Dependência de múltiplas substâncias; naltrexona associada a suporte psicoterápico.
- C Transtorno bipolar, episódio misto; carbonato de lítio.
- D Depressão psicótica; antidepressivo associado a antipsicótico.
- E Primeiro episódio psicótico; benzodiazepínico associado a antipsicótico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000005788](#)

Questão 15 **Blues do Puerpério** **Psicose Puerperal** **Depressão Puerperal**

Sintomas como euforia, choro fácil e ansiedade, mesmo prevalecendo a sensação de felicidade, que tem início já no primeiro dia de puerpério e, geralmente, dura até 2 semanas. O quadro se refere a

- A Blues puerperal.
- B Depressão puerperal.
- C Transtorno bipolar puerperal.
- D Psicose puerperal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000004799](#)

Questão 16 Blues do Puerpério Psicose Puerperal Depressão Puerperal

Puérpera apresentando, 2 semanas após o parto, quadro de irritabilidade, desânimo, ansiedade e sensibilidade exacerbada às críticas. Esse quadro é altamente sugestivo de:

- ☐ A Blues Puerperal
- ☐ B Depressão puerperal
- ☐ C Esquizofrenia
- ☐ D Psicose puerperal

Essa questão possui comentário do professor no site [4000002999](#)

Questão 17 Psicose Puerperal

Dentre os transtornos mentais do período puerperal, aquele que pode cursar com alterações da sensopercepção, do juízo de realidade, isolamento social, negativismo, ideação ou atitudes agressivas para com o recém-nascido e que se inicia até seis semanas após o termo é:

- ☐ A Baby blues
- ☐ B Depressão puerperal
- ☐ C Psicose puerperal
- ☐ D Esquizofrenia residual
- ☐ E Esquizofrenia simples

Essa questão possui comentário do professor no site [4000093760](#)

Questão 18 Psicose Puerperal

Dentre os transtornos mentais do período puerperal, aquele que pode cursar com alterações da sensopercepção, do juízo de realidade, isolamento social, negativismo, ideação ou atitudes agressivas para com o recém-nascido, e que se inicia até seis semanas após o termo é:

- ☐ A Baby blues.
- ☐ B Depressão puerperal.
- ☐ C Psicose puerperal.
- ☐ D Esquizofrenia residual.
- ☐ E Esquizofrenia simples.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000094730](#)

Questão 19 Transtorno Psicóticos Psicofármacos nas Emergências Psiquiátricas

Uma mulher com 55 anos de idade e longa história de episódios depressivos é trazida à Unidade Básica de Saúde por um Agente Comunitário de Saúde por apresentar-se delirante há várias semanas. Já na sala de espera, o quadro agrava-se progressivamente para franca agitação psicomotora, com a paciente tentando agredir outros usuários e a equipe de trabalho, por quem diz estar sendo perseguida. Nessa situação, além de realizar a contenção física da paciente, está indicado administrar

- A sertralina por via oral.
- B diazepam por via oral.
- C haloperidol por via intramuscular.
- D prometazina por via intramuscular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126804](#)

Questão 20 **Psicose Puerperal**

Paciente com 17 anos de idade, primípara, encontra-se no 7º dia pós-parto e permanece internada no alojamento conjunto, acompanhando seu recém-nascido, em tratamento de sepse neonatal. Nesse período, a paciente começa a apresentar quadro de insônia, delírios de grandeza, alternados com manifestações paranoides. Diz que ouve vozes e vê sombras que querem pegá-la e trocar seu bebê. Durante o dia, apresenta agitação psicomotora ininterrupta. Ela não apresenta nenhum sintoma associado a infanticídio ou ideário negativo em relação à sua maternidade, mas diz que prefere morrer a ser "pega pelas sombras". A família nega qualquer quadro anterior semelhante. Baseado na sintomatologia apresentada, o diagnóstico é:

- A disforia pós-parto.
- B psicose pós-parto.
- C depressão pós-parto.
- D transtorno de ansiedade.
- E transtorno bipolar (psicose maníaco-depressiva).

4000127262

Respostas:

1	A	2	D	3	B	4	C	5	C	6	D	7	C	8	A	9	B	10	D	11	D
12	D	13	E	14	E	15	A	16	A	17	C	18	C	19	C	20	B				