

**Questão 1** Diagnóstico Ginecologia

Os cistos ovarianos são achados frequentes em ginecologia. Sobre eles é correto afirmar:

- ☐ A São critérios de malignidade ao ultrassom septos grosseiros e papilas ou vegetações.
- ☐ B Doppler mostrando aumento da resistência indica neoplasia maligna.
- ☐ C CA 125 normal exclui câncer de ovário.
- ☐ D A aspiração dos cistos é o tratamento de escolha por ser menos invasivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000183820](#)

**Questão 2** Ginecologia Estadiamento Tratamento

Uma paciente de 50 anos foi submetida à cirurgia pela presença de um tumor pélvico originado no ovário esquerdo. Não foi possível a realização do exame anatomopatológico intraoperatório, pois o criostato do hospital estava em conserto. O cirurgião optou pela realização da salpingooforectomia esquerda. O posterior exame histológico da peça cirúrgica em fixação padrão pela parafina revelou tratar-se de um adenocarcinoma seroso grau 3 do ovário esquerdo, sem alteração na tuba retirada. Qual seria sua próxima orientação à paciente?

- ☐ A Nova cirurgia para estadiamento da neoplasia;
- ☐ B Seguimento com CA 125 e ultrassonografia trimestral;
- ☐ C Quimioterapia adjuvante;
- ☐ D Radioterapia adjuvante.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000183566](#)

**Questão 3** Ginecologia Etiologia

Leia o caso clínico: uma mulher de 18 anos de idade vem sentindo desconforto pélvico há vários meses. Ao exame ginecológico, há massa anexial direita de 10cm. A TC do abdome revela que a massa parece ser sólida e circunscrita. Com a remoção cirúrgica, a massa é sólida e branca, com pequenas áreas de necrose. Microscopicamente, contém principalmente células mesenquimais primitivas, juntamente com um pouco de cartilagem, músculo e focos de diferenciação neuroepitelial.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- ☐ A Tumor do seio endodérmico.
- ☐ B Disgerminoma.
- ☐ C Teratoma imaturo.
- ☐ D Tumor mülleriano misto maligno.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181825](#)

**Questão 4** Ginecologia Tumores metastáticos

A presença de células “em anel de sinete”, no exame de anatomopatológico, é um achado de qual dos seguintes tumores ovarianos?

- ☐ A Tumor de Brenner.
- ☐ B Tumor de Krukenberg.
- ☐ C Teratoma imaturo do ovário.
- ☐ D Tumor seroso.
- ☐ E Disgerminoma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181646](#)

**Questão 5** Fatores de risco Ginecologia Fatores de risco

Com relação ao câncer de mama e do ovários hereditários, analise as alternativas abaixo.

I - Podem estar associados a outros tumores, como câncer de pâncreas e câncer de próstata em homens jovens.

II - Mulheres aos 70 anos com mutações deletérias no BRCA1 apresentam risco de 90% câncer de mama, 80% de risco de câncer de ovário e 70% de risco de desenvolverem câncer de mama contralateral.

III - Mulheres portadoras de mutações deletérias no gene BRCA2 apresentam aos 70 anos risco de 55% de câncer de mama, 16,5% de câncer de ovário e 62% de câncer de mama contralateral.


Sobre esta situação selecione a opção correta.

- ☐ A As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- ☐ B As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- ☐ C As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- ☐ D As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- ☐ E As afirmativas I, II e III são falsas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181508](#)

**Questão 6** Ginecologia Prépúbere Tumores de células germinativas

Menina de 12 anos de idade, nunca menstruou, queixa-se de aumento de volume abdominal. Ao exame físico, palpa-se massa endurecida que se estende da pelve à cicatriz umbilical. A ressonância está representada na imagem a seguir. A congelção intraoperatória foi compatível com disgerminoma de ovário direito.



Qual é a conduta cirúrgica nesse caso?

- A Salpingooforectomia direita e linfadenectomia pélvica e para-aórtica.
- B Histerectomia total e salpingooforectomia bilateral.
- C Salpingooforectomia direita e biópsia em cunha do ovário esquerdo.
- D Interrupção da cirurgia e indicação de quimioterapia neoadjuvante imediata.

4000184965

**Questão 7**   **Ginecologia**   **Fatores de risco**

Uma paciente com 62 anos de idade comparece à consulta no centro de saúde com o laudo de exame de ultrassom pélvico. No laudo, constam a descrição de um cisto com septação espessa, ecogenicidade aumentada e com projeção papilar em ovário esquerdo; ausência de ascite ou outros achados, medidas uterinas e do ovário direito normais. A paciente acrescenta que desconhece histórico familiar de cistos ou tumores de ovário.

Considerando o caso clínico apresentado, assinale a opção correta.

- A As características ultrassonográficas são de alto risco para malignidade.
- B As características ultrassonográficas correspondem a processos não neoplásicos ou fisiológicos.
- C As características ultrassonográficas são inespecíficas para classificar risco de malignidade.
- D O exame de ultrassom não é adequado para a avaliação das características da massa anexial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176619](#)

**Questão 8**   **Ginecologia**   **Tumores ovarianos benignos**

Mulher de 25 anos realiza ultrassonografia transvaginal de rotina que revela anexo direito apresentando imagem homogênea, circular e anecoica de aproximadamente 5cm. Considerando esse achado ultrassonográfico, a principal hipótese diagnóstica é de:

- A cistoadenocarcinoma
- B endometrioma
- C cisto simples
- D teratoma

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171002](#)

**Questão 9**   **Ginecologia**   **Tumores ovarianos benignos**

Mulher de 50 anos de idade é operada por volumoso tumor ovariano. Durante a cirurgia, houve extravasamento do conteúdo do tumor, que foi prontamente aspirado e a cavidade exaustivamente lavada. O resultado anatomopatológico mostrou se tratar de cistoadenoma mucinoso de ovário. Nesse caso, há risco de a paciente desenvolver

- A ascite líquida recorrente.
- B carcinomatose peritoneal.
- C recidiva tumoral.
- D derrame pleural.
- E pseudomixoma peritoneal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169083](#)

**Questão 10**   **Ginecologia**   **Tumores ovarianos benignos**   **Tratamento**

Mulher, 72 anos de idade, hipertensa e com obesidade grau 1, vem, há um mês, referindo aumento do volume abdominal e dispneia leve. Realizou ultrassonografia pélvica que evidenciou lesão sólida em ovário esquerdo, hipoecóica, bem delimitada, sem fluxo ao Doppler, de 2,0cm, com sombra acústica posterior; presença de grande volume de líquido livre em cavidade. Exame de imagem evidenciou derrame pleural. Nega perda ponderal. Feito estudo de CA-125 que veio em baixos níveis.

Especifique a conduta inicial que deve ser adotada nesse caso, considerando a principal hipótese diagnóstica:

- A Quimioterapia.
- B Salpingooforectomia esquerda.
- C Salpingooforectomia bilateral, histerectomia e citorredução ótima.
- D Salpingooforectomia bilateral, seguido de quimioterapia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168854](#)

**Questão 11**   **Ginecologia**   **Tumores ovarianos benignos**

Mulher, 72 anos de idade, hipertensa e com obesidade grau 1, vem, há um mês, referindo aumento do volume abdominal e dispneia leve. Realizou ultrassonografia pélvica que evidenciou lesão sólida em ovário esquerdo, hipoecóica, bem delimitada, sem fluxo ao Doppler, de 2,0cm, com sombra acústica posterior; presença de grande volume de líquido livre em cavidade. Exame de imagem evidenciou derrame pleural. Nega perda ponderal. Feito estudo de CA-125 que veio em baixos níveis.

Indique o diagnóstico síndrome mais provável para o caso:

- A Síndrome Carcinoide.
- B Síndrome de Meigs.
- C Síndrome de Cushing.
- D Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168853](#)

**Questão 12** Diagnóstico Ginecologia Tumores ovarianos benignos

Mulher, 72 anos de idade, hipertensa e com obesidade grau 1, vem, há um mês, referindo aumento do volume abdominal e dispneia leve. Realizou ultrassonografia pélvica que evidenciou lesão sólida em ovário esquerdo, hipoeecóica, bem delimitada, sem fluxo ao Doppler, de 2,0cm, com sombra acústica posterior; presença de grande volume de líquido livre em cavidade. Exame de imagem evidenciou derrame pleural. Nega perda ponderal. Feito estudo de CA-125 que veio em baixos níveis.

Diante do caso, identifique o tumor ovariano mais provável:

- A Fibroma.
- B Disgerminoma.
- C Carcinoma seroso.
- D Carcinoma endometriode.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168852](#)

**Questão 13** Diagnóstico Ginecologia

A ultrassonografia transvaginal, na menopausa, tem sido considerada como método de rastreamento para neoplasias ovarianas. São características ultrassonográficas de neoplasia malignas de ovário, EXCETO:

- A Cisto ovariano complexo (áreas sólido-císticas)
- B Septos espessos
- C Neovascularização
- D Cisto ovariano anecoico
- E Ascite

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167988](#)

**Questão 14** Ginecologia Tumores ovarianos benignos Tratamento

Paciente 33 anos, realizou ultrassonografia transvaginal que evidenciou imagem cística anecóica unilocular que mede 28 mm em seu maior diâmetro. Qual a conduta adequada?

- A Não necessita de seguimento
- B Iniciar anticoncepcional oral
- C Reavaliar em 3 meses
- D Retirada por laparoscopia

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166491](#)

**Questão 15** Ginecologia Etiologia Classificação histológica

Leia o caso clínico a seguir.

Uma mulher de 18 anos de idade vem sentindo desconforto pélvico há vários meses. Ao exame ginecológico, há massa anexial direita de 10 cm. A TC do abdome revela que a massa parece ser sólida e circunscrita. Com a remoção cirúrgica, a massa é sólida e branca, com pequenas áreas de necrose. Microscopicamente, contém principalmente células mesenquimais primitivas, juntamente com um pouco de cartilagem, músculo e focos de diferenciação neuroepitelial.

Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- A Tumor do seio endodérmico.
- B Disgerminoma.
- C Tumor de células da granulosa.
- D Teratoma imaturo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166425](#)

**Questão 16** Ginecologia Câncer de ovário

Conforme dados de 2020 do Instituto Nacional do Câncer (Inca), surgem, no país, cerca de 6 650 novos casos de câncer de ovário por ano. A respeito dessa doença, assinale a alternativa correta.

- A Na maior parte das vezes os sintomas são incomuns a outras doenças.
- B A maioria dos casos são diagnosticados no início da doença.
- C É o tipo de tumor ginecológico mais comum.
- D 90% dos tumores ovarianos malignos são de origem epitelial.
- E Sua maior incidência ocorre em mulheres > 40 anos de idade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165251](#)

**Questão 17** Diagnóstico Ginecologia

Mulher, 42 anos, com data da última menstruação há três semanas, relata ciclos menstruais regulares e mensais. Há uma semana, apresentou episódio pontual de dor em fossa ilíaca esquerda. US transvaginal: imagem anecóica única, de 5cm, com ecos em seu interior; ao Doppler, área de vascularização de aspecto “em anel”. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A teratoma
- B endometrioma
- C corpo lúteo hemorrágico
- D cisto folicular

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164960](#)

**Questão 18** Ginecologia Classificação histológica

A classificação histopatológica das neoplasias ovarianas se baseia na origem embrionária das células. São tumores de células germinativas do ovário o:

- A tumor de *Brenner*; o disgerminoma e o tecoma
- B teratoma; o tecoma e o tumor do saco vitelino
- C teratoma; o disgerminoma e o tumor do saco vitelino
- D disgerminoma; o ginandroblastoma e o tecoma

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164956](#)

**Questão 19** Tumores ovarianos benignos

Uma mulher com 42 anos de idade, com ciclos menstruais regulares, comparece ao ambulatório de ginecologia por apresentar um laudo de exame de ultrassonografia transvaginal evidenciando cisto ovariano de paredes finas, com contornos regulares, conteúdo anecóico, medindo 4 cm em seu maior diâmetro. A paciente nega sintomas. Diante desse quadro, a principal hipótese diagnóstica e o exame complementar que auxiliaria no esclarecimento dessa hipótese são, respectivamente,


- A cisto hemorrágico, com dosagem de antígeno carcino-embrionário.
- B cisto folicular, sem necessidade de exame adicional.
- C teratoma, com dosagem de alfa-feto proteína.
- D endometrioma, com dosagem de CA-125.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146586](#)

**Questão 20** Diagnóstico

Uma mulher com 25 anos de idade vai ao ambulatório de ginecologia com queixa de dor pélvica há 24 horas. Possui ciclos regulares de 28 dias (3 a 4 dias) e a sua última menstruação ocorreu há 3 semanas. No exame clínico, observou-se PA = 110 x 70 mmHg e pulso = 84 bpm. Notou-se dor à palpação profunda em fossa ilíaca esquerda e em região hipogástrica, Blumberg negativo. Sem outras anormalidades durante o exame físico. Foi realizada ultrassonografia transvaginal que revelou estrutura cística no ovário esquerdo, medindo 7,0 x 6,5 cm, sem fluxo ao estudo Doppler, conforme indica imagem a seguir. Considerando o caso clínico apresentado e a hipótese diagnóstica mais provável, qual deve ser a conduta médica?





Ultrassonografia transvaginal

- A Solicitar ressonância magnética da pelve.
- B Encaminhar para laparoscopia exploradora.
- C Orientar a repetição da ultrassonografia após a menstruação.
- D Solicitar marcadores tumorais, como o antígeno carcino-embriônico e o CA-125.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146581](#)

#### Questão 21 Tumores anexiais

J.N.M., 44 anos, assintomática, sem história prévia de doença ginecológica ou cirurgia, GII PII AO, apresenta irregularidade menstrual e oligomenorreia há 4 anos. À ultrassonografia transvaginal: imagem cística anexial com 7 cm de diâmetro máximo, multiloculada, com septações de até 2 mm de espessura, com fluxos escassos detectados ao Doppler. Assinale a alternativa que apresenta a melhor interpretação e conduta do caso clínico.

- A Há maior probabilidade de apresentar lesão benigna, e a melhor conduta é controle evolutivo com Doppler.
- B Há maior probabilidade de apresentar lesão maligna, e a melhor conduta é solicitar RNM.
- C Há maior probabilidade de apresentar lesão maligna, e a melhor conduta é quimioterapia neoadjuvante.
- D Há maior probabilidade de apresentar lesão maligna, e a melhor conduta é a ressecção cirúrgica.
- E Há maior probabilidade de apresentar lesão benigna, e a melhor conduta é a ressecção cirúrgica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146352](#)

#### Questão 22 Tumores anexiais e câncer de ovário

Em relação aos cistos ovarianos benignos, analise as assertivas abaixo:

- I. Os cistos funcionais do ovário são comuns no menacme e têm sua prevalência aumentada na paciente usuária de DIU hormonal.
- II. O cisto de corpo lúteo hemorrágico deve ser abordado cirurgicamente, pois provoca peritonismo e dor.



III. Teratomas maduros e endometriomas podem sofrer transformação maligna.

Quais estão corretas?

- ☐ A Apenas I.
- ☐ B Apenas II.
- ☐ C Apenas III.
- ☐ D Apenas I e III.
- ☐ E I, II e III.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145764](#)

**Questão 23** Tumores anexiais e câncer de ovário

Mulher, 78 anos de idade, refere dor abdominal há 10 dias, aumento do volume abdominal há 3 meses, emagrecimento recente e inapetência. Realizou ultrassom pélvico que evidenciou imagem cística de limites parcialmente definidos na região anexial esquerda, com projeções nodulares na sua parede, com fluxo vascular ao estudo Doppler e sem septações, medindo cerca 3,1x3,4x4,1cm. O maior componente nodular mede cerca de 1,3x1,3x1,1cm e também possui fluxo vascular ao estudo Doppler. Qual é a conduta mais adequada?

- ☐ A Indicar ooforectomia pelo risco de torção do cisto.
- ☐ B Tranquilizar a paciente pois trata-se de cisto funcional.
- ☐ C Referenciar a paciente para serviço oncológico.
- ☐ D Indicar punção do cisto via ultrassonográfica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144686](#)

**Questão 24** Diagnóstico Ginecologia Tratamento

Uma mulher de 45 anos de idade comparece ao ambulatório de Ginecologia com queixas de aumento do volume abdominal e irregularidade menstrual. Realiza ultrassonografia transvaginal que evidencia, no ovário direito, imagem anecoica, arredondada, com paredes finas, contornos regulares, limites bem definidos e com septações grosseiras em seu interior, medindo 14 x 12 cm em seus maiores diâmetros. Nesse caso, a conduta adequada é

- ☐ A iniciar tratamento clínico com anticoncepcional combinado e controle trimestral com ultrassonografia.
- ☐ B realizar marcadores tumorais e proceder a laparotomia com exame de congelação no intraoperatório.
- ☐ C acompanhar de forma expectante e reavaliar resultado de ultrassonografia após 2 meses.
- ☐ D realizar punção e drenagem do cisto, guiadas por ultrassonografia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127601](#)

**Questão 25** Câncer de ovário

Mulher com 45 anos de idade, cor branca, multipara, proveniente de zona rural, procura consulta ginecológica com queixa de peso na região pélvica há cerca de 60 dias, perda de peso corporal e distensão abdominal. A paciente não faz uso de método contraceptivo oral e não apresenta dismenorria. A paciente tem antecedente de neoplasia maligna de mama e a mãe, história de câncer de ovário. Ao exame, observou-se massa palpável em anexo esquerdo. De acordo com o exame

clínico e com os antecedentes pessoais e familiares informados pela paciente, qual a principal hipótese diagnóstica?

- A Cisto benigno de ovário.
- B Neoplasia maligna de ovário.
- C Endometrioma.
- D Tuberculose genital (ovário e trompa).
- E Abscesso ovariano.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127064

### Respostas:

1	A	2	A	3	C	4	B	5	B	6	C	7	A	8	C	9	E	10	B	11	B
12	A	13	D	14	A	15	D	16	D	17	C	18	C	19	B	20	C	21	E	22	D
23	C	24	B	25	B																