

Questão 1 **Glaucoma Congênito Primário**

Lactente de 1 mês de idade apresenta lacrimejamento e aparente aversão à luz há cerca de 2 semanas. AP: pré-natal sem intercorrências, gestação a termo, parto normal. Exame físico: fecha os olhos com força, principalmente à tentativa de avaliação dos olhos com uma lanterna, lacrimejamento bilateral, córnea de ambos os olhos com perda de transparência e aspecto azulado. A hipótese diagnóstica é:

- ☐ A catarata congênita.
- ☐ B conjuntivite gonocócica.
- ☐ C toxoplasmose congênita.
- ☐ D glaucoma congênito.

4000170020

Questão 2 **Glaucoma** **Oftalmologia**

Mulher, 75 anos de idade, queixa-se de dor ocular de forte intensidade à direita, associada a náuseas e piora da acuidade visual no mesmo olho há um dia, que não melhorou com analgésicos. Não apresenta nenhum antecedente clínico, cirúrgico e oftalmológico, exceto por uso de óculos desde a infância. Exame físico: olho direito com hiperemia de vasos conjuntivais; olho esquerdo sem alterações. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta mais adequada?

- ☐ A Úlcera de córnea; tampão com cicatrizante.
- ☐ B Conjuntivite viral; investigação de covid-19.
- ☐ C Esclerite; colírio com corticoide.
- ☐ D Glaucoma agudo; iridotomia a LASER em ambos os olhos.

4000166317

Questão 3 **Glaucoma Primário de Ângulo Aberto**

Qual dos pacientes a seguir possui maior risco para desenvolver glaucoma primário de ângulo aberto?

- ☐ A 50 anos de idade e hipermetrope.
- ☐ B 25 anos de idade e astigmatismo.
- ☐ C 60 anos de idade e míope.
- ☐ D 70 anos de idade e hipermetrope.

4000166261

Questão 4 **Glaucoma Agudo de Ângulo Fechado Crise Aguda de Glaucoma**

Mulher de 60 anos refere que estava assistindo à televisão quando se levantou e, sem acender as luzes, foi na penumbra buscar uma manta em seu quarto. Informa que, pouco tempo depois, começou a apresentar náuseas, forte cefaleia supraorbitária e dor ocular à direita de forte intensidade com visão turva e halos coloridos. Ao exame externo, você detecta semimidríase parálitica, córnea com diminuição de brilho, grande hiperemia conjuntival com injeção ciliar e olho direito com

digito-pressão elevada.

Sua hipótese diagnóstica e o tratamento inicial até a chegada do especialista, após afastar contraindicações sistêmicas, seriam:

- A neurite óptica isquêmica; vasodilatadores e antiagregantes plaquetários.
- B glaucoma agudo; manitol 20% intravenoso, inibidor da anidrase carbônica e colírio de pilocarpina 2%.
- C uveíte hipertensiva; colírio de corticosteroide de hora em hora até sair da crise.
- D esclerite posterior; pomada de corticosteroide mais curativo oclusivo para não entrar luz e repouso.

4000141675

Questão 5 Catarata Senil

Menino, 12 anos, sofreu trauma contuso em olho direito durante a prática de educação física. Após sessenta dias, ele é levado à Unidade Básica de Saúde pela mãe, que relata que o mesmo vem apresentando diminuição da acuidade visual no olho atingido. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A Ceratocone
- B Catarata
- C Uveíte
- D Escleromalácea

4000074169

Questão 6 Glaucoma Primário de Ângulo Aberto

O Glaucoma é uma doença neurodegenerativa de etiologia multifatorial que figura entre as principais causas de cegueira no Brasil e no mundo. O desconhecimento sobre a doença, a não compreensão sobre a forma de utilizar o colírio, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde e a dificuldade de comunicação com a equipe de saúde são fatores que podem resultar na não adesão ao tratamento. São fatores de risco associados ao Glaucoma Primário de Ângulo Aberto:

- A Etnia negra, hipermetropia, pressão intraocular normal e histórico familiar de Glaucoma
- B Etnia negra, miopia, pressão intraocular elevada e histórico familiar de glaucoma
- C Idade avançada, etnia branca, hipermetropia e sexo masculino
- D Idade avançada, etnia branca, miopia e sexo feminino
- E Nenhuma das alternativas acima está correta

4000067228

Questão 7 Uveíte Anterior

Menina, 3 anos de idade, apresenta artrite em joelho direito há 5 meses e em tornozelo esquerdo há 3 meses. Os exames laboratoriais mostram alteração das provas de atividade inflamatória (velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa) e fator antinúcleo positivo. Qual o comprometimento oftalmológico esperado?

- A Retinite aguda
- B Episclerite crônica
- C Conjuntivite aguda
- D Atrofia do nervo óptico
- E Uveíte anterior crônica

4000059293

Questão 8 **Manifestações extraarticulares** **Espondilite Anquilosante**

A manifestação extra-articular mais frequente da Espondilite Anquilosante é:

- A Uvelte anterior.
- B Pericardite.
- C Fibrose pulmonar.
- D Esplenomegalia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000041889](#)

Questão 9 **Uveíte por Toxoplasmose**

A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário, o Toxoplasmose Gondii. Estão a ela relacionados as seguintes doenças, com exceção:

- A Pterígio.
- B Toxoplasmose ocular adquirida e congênita.
- C Coriorretinite.
- D Uveíte anterior.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000034117](#)

Questão 10 **Glaucoma Congênito Primário**

Leia o caso clínico a seguir. Durante a primeira consulta de puericultura, a mãe de um lactente do sexo masculino, com seis meses de vida, nascido de parto cesariano por história materna de cesáreas prévias, relata ter observado que o bebê apresenta lacrimejamento contínuo no olho direito, acompanhado de conjuntiva avermelhada e "dilatação de pupila". A mãe refere ainda que o lactente apresenta-se irritado durante o dia, acalmando-se durante a noite e em ambientes escuros. À inspeção ocular, observa-se aumento do globo ocular e da trama vascular da conjuntiva, com diferença no tamanho das córneas. Entre as causas congênicas de alterações oculares, a principal hipótese diagnóstica para o caso é:

- A Retinoblastoma.
- B Catarata.
- C Glaucoma.
- D Conjuntivite.

4000027232

Questão 11 Glaucoma

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no Brasil. A droga hipotensora ocular que atua tanto por diminuir a secreção de humor aquoso quanto por aumentar o fluxo uveoscleral é:

- A Betabloqueadores.
- B Agonista alfa-2.
- C Análogos da prostaglandina.
- D Inibidores da anidrase carbônica.
- E Mióticos.

4000006221

Questão 12 Glaucoma Agudo de Ângulo Fechado Crise Aguda de Glaucoma

J.G.J., 55 anos, feminina, hipermetrópe, chega ao Pronto Socorro Municipal no plantão noturno com visão embaçada, dor ocular intensa, náusea, vômito, bradicardia e sudorese. O quadro clínico apresentado deve-se

- A ao glaucoma agudo.
- B ao deslocamento de retina.
- C ao macroadenoma de hipófise.
- D à síndrome de Behçet.

4000127675

Questão 13 Glaucoma Agudo de Ângulo Fechado Crise Aguda de Glaucoma

Mulher de 68 anos de idade chega ao pronto-socorro com dor insuportável em olho direito e náuseas. Refere que a dor teve início de forma súbita há 3 horas, sendo acompanhada por baixa de acuidade visual e olho vermelho. Nega doenças oculares prévias, além da hipermetropia. Refere ser diabética e hipertensa com controle irregular, e que iniciou recentemente tratamento para depressão com nortriptilina. À inspeção, observa-se o quadro a seguir. Qual alternativa apresenta uma característica clínica e um fator de risco associados à principal hipótese diagnóstica para o caso?



- A Edema de córnea e idade maior de 60 anos.
- B Ausência de midríase fixa e uso de antidepressivo tricíclico.
- C Tensão óculo digital normal e sexo feminino.
- D Hipermetropia e hipertensão.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000102663](#)

Questão 14 Uveíte Anterior

Mariana chega à consulta com queixa ocular de embaçamento visual progressivo e dor leve no olho direito, apresentando ao exame hiperemia da conjuntiva mais intensa em volta da córnea (perilimbar), ausência de secreção e pupila miótica. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que melhor define o diagnóstico:

- A Glaucoma agudo
- B Conjuntivite
- C Uveíte anterior
- D Esclerite
- E Catarata

Essa questão possui comentário do professor no site [4000088899](#)

Questão 15 Oclusão da Artéria Central da Retina e Seus Ramos Hifema Traumático

São causas de perda visual repentina unilateral:

- A Eclampsia, infarto vertebro-basilar, glaucoma.
- B Trauma, entrópio, Arterite temporal.
- C Hemorragia vítrea, amaurose fugaz, hordéolo.
- D Oclusão da artéria central da retina, infarto do lobo occipital, hifema.

[4000067744](#)

Questão 16 Neurite Óptica

Paciente do sexo feminino, de 28 anos, previamente hígida, apresenta-se com quadro de dor ocular de início há seis horas no olho direito, de caráter progressivo, com escotoma e dor à movimentação lateralizada do olhar. No exame ocular, movimentos dos olhos normais, acuidade visual 20/20 bilateralmente, reflexos pupilares com reação fotomotora diminuída do olho direito. RM demonstrou duas lesões periventriculares na substância branca, sem realce de gadolínio. Qual é o diagnóstico do sintoma visual?

- A Toxoplasmose
- B Glaucoma.
- C Neurite óptica.
- D Síndrome ocular isquêmica.

Questão 17 **Glaucoma** **Descolamento da Retina**

Homem trabalhador rural, 68 anos de idade, apresenta baixa acuidade visual progressiva, bilateral, para longe, há 9 meses, sendo mais pronunciada no olho direito. Refere que sua visão para perto melhorou sem correção nesse período. É tabagista 22 anos/maço e nega qualquer doença sistêmica. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica, o tipo da lesão e o fenômeno presente no caso?

- A Descolamento de retina, do tipo regmatogênico, separação da retina neurosensorial e epitélio pigmentar da retina.
- B Catarata, do tipo cortical anterior, hipermetropização.
- C Catarata, do tipo subcapsular posterior, perda da acomodação.
- D Catarata, do tipo nuclear, miopização.
- E Glaucoma primário de ângulo aberto, tipo pseudoesfoliativo, obstrução do trabeculado

Essa questão possui comentário do professor no site 4000004828

Questão 18 **Glaucoma Primário de Ângulo Aberto**

No tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA), é INCORRETO afirmar:

- A A pilocarpina estimula receptores nicotínicos a aumentar a saída do fluco aquoso.
- B A eserina (fisostigmina) aumenta os efeitos muscarínicos.
- C O timolol pode causar confusão e desorientação.
- D A adrenalina aumenta a facilidade do fluxo de saída.
- E 30% dos pacientes com GPAA são não-responsivos à medicação com adrenalina.

4000002545

Questão 19 **Glaucoma Primário de Ângulo Fechado**

Glaucoma Primário de Ângulo Fechado, assinale a alternativa correta:

- A Em um de cada 400 indivíduos com mais de 40 anos de idade.
- B Geralmente mais em homens do que em mulheres.
- C Em câmaras anteriores cuja a profundidade seja de 2,5mm.
- D Geralmente em míopes.
- E Em olhos com o diâmetro corneano menor que o normal.

4000002535

Questão 20 **Uveíte Anterior** **AIJ Artrite Idiopática Juvenil**

Nas uveítes associadas com artrite juvenil crônica, é INCORRETO afirmar que:

- A 20% dos casos são bilaterais.
- B O olho fica branco mesmo na presença de severa uveíte.
- C O envolvimento do segundo olho em casos unilaterais é raro após um ano.
- D 25% dos casos são severos e respondem pobremente ao tratamento.
- E Cerca de 15% dos casos tem um curso que dura menos de 4 meses.

4000002501

Questão 21 Uveíte Anterior

Em relação às uveítes anteriores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Caracterizam-se pela inflamação preponderante do segmento anterior do olho.
- () A iridociclite é o achado ocular mais comum nos pacientes com síndrome de Reiter, afetando, aproximadamente, 30 a 60% de todos os pacientes, sendo geralmente bilateral e autolimitada.
- () Quando relacionada à infecção por sífilis, pode ser grave e não responsiva à medicação.
- () Os achados oculares mais frequentes relacionados à tuberculose são: precipitados ceráticos granulomatosos e nódulos de íris.

A sequência está correta:

- A V, F, V, V
- B F, V, F, V
- C V, V, F, V
- D V, F, F, F
- E F, F, V, V

Essa questão possui comentário do professor no site [4000002229](#)

Questão 22 Glaucoma neovascular

Paciente comparece à consulta com queixa de perda visual de início há dois dias, gradual, que no momento alcançou perda total da visão em olho direito. Relata que há algumas horas iniciou dor intensa. Refere ser diabético em uso irregular de medicação, hipertenso em acompanhamento. Nega traumas. Ao exame, observa-se hiperemia difusa, reflexo direto diminuído, tensão ocular elevada e à lâmpada de fenda evidencia ausência de ângulo estreito. Com base no quadro anterior, é correto afirmar que a hipótese diagnóstica mais provável para o quadro é:

- Essa questão possui comentário do professor no site [4000002198](#)

Essa questão possui comentário do professor no site [4000002100](#)

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127913](#)

1	D	2	D	3	C	4	B	5	B	6	B	7	E	8	A	9	A	10	C	11	B
12	A	13	A	14	C	15	D	16	C	17	D	18	A	19	E	20	A	21	A	22	D
23	B	24	B																		