

Processos Epidêmicos e Epidemiologia das Doenças Infecciosas

Yordanka soto castillo - 083,898,331-66

Acessar Lista

Questão 1 Monitoramento de Endemias e Epidemias o diagrama de controle

O diagrama de controle é uma ferramenta essencial para o acompanhamento da frequência de agravos e doenças, de modo a identificar a ocorrência de epidemias. No eixo Y, é apresentada a medida de incidência da condição, enquanto, no eixo X, é representado o tempo utilizado, por exemplo, meses.

No diagrama de controle, uma condição é considerada epidêmica se a curva de ocorrência mensal ultrapassar

- A a média histórica do mês.
- B o teto histórico dos meses anteriores.
- C a média histórica dos meses anteriores.
- D o limiar endêmico inferior.
- E o limiar endêmico superior.

Essa questão possui comentário do professor no site 400016717

Questão 2 Aspectos Epidemiológicos das Doenças Transmissíveis

Assinale a alternativa correta.

- A Erradicação de uma doença significa a cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial da espécie do agente em questão, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle.
- B Eliminação de uma doença significa a cessação de transmissão da infecção em pelo menos dois continentes.
- Os cientistas acreditam que a poliomielite, a varíola e o sarampo são doenças a serem erradicadas do mundo no prazo de 5 anos.
- A erradicação da varíola foi possível graças à vacinação em massa, ao tratamento precoce que diminuía o coeficiente de letalidade da doença e ao meio de transmissão principalmente por meio de contato com secreção das pústulas.
- O sarampo, a rubéola e a coqueluche são considerados eliminados nos países da America Latina

4000165205

Questão 3 Medicina Preventiva Aspectos Epidemiológicos das Doenças Transmissíveis

O Brasil apresenta um perfil epidemiológico complexo, com uma sobreposição de problemas de saúde, muitas vezes, no mesmo território: persistência de alguns agravos transmissíveis e ocorrência de ciclos epidêmicos de outros; peso importante, e crescente, na morbidade e na mortalidade das doenças crônicas não transmissíveis; e alta ocorrência de acidentes e violência. Essa múltipla carga se concentra, principalmente, nos grupos mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico, como resultado das profundas desigualdades que ainda persistem. Esse quadro, também condicionado pelos rápidos processos de urbanização e de envelhecimento

da população, exige que o SUS realize análises e planejamentos capazes de encontrar as melhores estratégias para garantir o efetivo acesso da população, ao mesmo tempo que lidere agendas multissetoriais que incidam nos determinantes sociais e econômicos.

Barbosa, J. Ramalho, W. Possíveis cenários epidemiológicos para o Brasil em 2040. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2021) Disponível em: https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content>. Acesso em: out. 2021. Adaptado.

Ao mencionar o problema da persistência de alguns agravos transmissíveis no perfil epidemiológico brasileiro, o texto se refere especialmente a doenças infecciosas:

- A autóctones de natureza endêmica.
- B alóctones, em surtos limitados por região.
- autóctones de alta incidência e baixa prevalência.
- D alóctones, em surtos sazonais.

4000165051

Questão 4 Monitoramento de Endemias e Epidemias o diagrama de controle

O isolamento de grupos de maior risco, como hipertensos, diabéticos e idosos, em relação ao Covid-19, com o intuito de retardar a velocidade de propagação da onda pandêmica, diminuindo assim seu impacto na saturação da demanda por cuidados intensivos e seus impactos econômicos na sociedade, chama-se:

- A Quarentena.
- R Lockdown.
- C Distanciamento social.
- D Isolamento horizontal.
- E Isolamento vertical.

4000152046

Questão 5 Intervalos de Tempo Relevantes na Epidemiologia de Doenças Transmissíveis Medicina Preventiva Classificação de casos

Sobre os termos utilizados na epidemiologia das doenças transmissíveis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A Eliminação é a erradicação de uma doença de uma área geográfica, como a eliminação da poliomielite das Américas.
- B Caso primário é o primeiro caso da doença; aquele que a introduz na coletividade.
- Caso-índice é o primeiro paciente diagnosticado e levado ao conhecimento do pessoal dos serviços, sempre será o caso primário.
- Caso secundário é o que se segue ao primário, decorrido o tempo representado pela duração de um período de incubação.
- E Erradicação é o completo desaparecimento da transmissão de agentes patogênicos da doença (incidência igual a zero.

4000146925

١	tem alta letalidade.			
	é altamente transmissível.			
	tem uma das maiores virulências conl	hecidas.		
	tem se mostrado muito resistente.			
	será eliminado em poucos anos.			
			Essa questão possui co	mentário do professor no site 40001464
es	tão 7 Processos Endêmicos e Epidê	èmico Endemias e E	pidemias	
nc	lemia de uma doença infecciosa em ur	ma determinada reg	gião	
	pode ser facilmente eliminada com m	nedidas de monitor	amento.	
	é definida como a situação em que h	a casos em númer	o estável ao ano sem a exis	tência de surtos epidêmicos.
	é definida como a situação em que h	a condições para a	transmissão dessa doença	ı, e o agente infeccioso circula
	entre os habitantes.			
	depende de casos alóctones para pe	rejetir como umo e	ndomio	
	depende de casos aloctories para pe	ersistii Corrio urria e	ndernia.	
	depende de casos aloctories para pe	ersistii como uma e	ndemia.	
	ocorre sempre após passar pela fase		паетна.	
				poptário do professor po sito 400044540
				nentário do professor no site 400014640
	ocorre sempre após passar pela fase	e epidêmica.	Essa questão possui con	nentário do professor no site 400014640
es		e epidêmica.	Essa questão possui con	nentário do professor no site 400014640
es	ocorre sempre após passar pela fase	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
es	ocorre sempre após passar pela fase tão 8 Processos Endêmicos e Epidê	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
es	ocorre sempre após passar pela fase tão 8 Processos Endêmicos e Epidê	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
les	ocorre sempre após passar pela fase tão 8	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
pre	ocorre sempre após passar pela fase tão 8	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
pre	ocorre sempre após passar pela fase tão 8	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
pre	ocorre sempre após passar pela fase tão 8	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
pre	ocorre sempre após passar pela fase tão 8 Processos Endêmicos e Epidê esença constante de uma doença em o Surto Epidemia	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
pre	ocorre sempre após passar pela fase tão 8 Processos Endêmicos e Epidê esença constante de uma doença em o Surto Epidemia	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
ies	ocorre sempre após passar pela fase tão 8 Processos Endêmicos e Epidê esença constante de uma doença em o Surto Epidemia Zoonose parcial	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
pre	ocorre sempre após passar pela fase tão 8 Processos Endêmicos e Epidê esença constante de uma doença em o Surto Epidemia Zoonose parcial	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	
pre	ocorre sempre após passar pela fase tão 8 Processos Endêmicos e Epidê esença constante de uma doença em o Surto Epidemia Zoonose parcial Endemia	e epidêmica. èmico Endemias e E	Essa questão possui con pide mias	0.0

O isolamento de grupos de maior risco, como hipertensos, diabéticos e idosos, em Covid-19, com o intuito de retardar a velocidade de propagação da onda pandêmica, diminuindo assim seu impacto na saturação da demanda por cuidados intensivos e seus impactos econômicos na sociedade, chama-se

- A quarentena.
- C distanciamento social.
- D isolamento horizontal.
- E isolamento vertical.

4000143354

Questão 10 Medicina Preventiva Medidas de saúde coletiva Epidemiologia

A pandemia COVID-19 trouxe à tona uma série de conceitos epidemiológicos utilizados com o sentido de verificar a evolução histórica de doenças, a eficácia das diversas medidas preventivas e os riscos populacionais. Conceitos epidemiológicos foram amplamente debatidos nas várias mídias, incluindo as redes sociais. Indicadores menos conhecidos e modelos preditores matemáticos vêm sendo usados, obrigando todos os profissionais de saúde a se familiarizarem com eles. Conceitos como período de latência e indicadores, como probabilidade de transmissão e numero de reprodução (Rt), passaram a ser empregados amplamente. A taxa de ocupação de leitos de UTI tem sido utilizada como indicador da capacidade do sistema de saúde nesta pandemia COVID-19.

O índice "Número de Reprodução de casos (R)" é determinado pelo número

- A de casos novos acumulados e notificados durante a semana .
- B médio de casos secundários determinados após exposição a um caso índice.
- C de casos capazes de reproduzir a doença em uma comunidade (infectantes).
- D de casos susceptíveis de uma comunidade que ainda não adquiriram a doença.

4000141942

Questão 11 Medicina Preventiva Epidemiologia Aspectos Epidemiológicos das Doenças Transmissíveis

A pandemia COVID-19 trouxe à tona uma série de conceitos epidemiológicos utilizados com o sentido de verificar a evolução histórica de doenças, a eficácia das diversas medidas preventivas e os riscos populacionais. Conceitos epidemiológicos foram amplamente debatidos nas várias mídias, incluindo as redes sociais. Indicadores menos conhecidos e modelos preditores matemáticos vêm sendo usados, obrigando todos os profissionais de saúde a se familiarizarem com eles. Conceitos como período de latência e indicadores, como probabilidade de transmissão e numero de reprodução (Rt), passaram a ser empregados amplamente. A taxa de ocupação de leitos de UTI tem sido utilizada como indicador da capacidade do sistema de saúde nesta pandemia COVID-19.

Entende-se como período de latência da doença o período entre

- A contrair o agente e se tornar infectado.
- B contrair a doença e se tornar positivo em exame sorológico.
- contrair o agente e manifestar a doença.
- D vacinar o paciente e obter imunidade.

Questão 12 Infectividade Aspectos Epidemiológicos das Doenças Transmissíveis

Em relação ao processo infeccioso, é INCORRETO afirmar que

- A patogenicidade é a capacidade do agente infeccioso produzir sintomas.
- B virulência é a capacidade do bioagente produzir casos graves ou fatais.
- infectividade é a capacidade de um agente infeccioso penetrar em outro organismo multiplicando-se, com maior ou menor facilidade, produzindo manifestações clínicas.
- munogenicidade é a capacidade que um bioagente tem de induzir imunidade no hospedeiro.
- período de incubação é o intervalo de tempo que decorre entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento de sinais ou sintomas da doença.

4000141849

Questão 13 Infectividade Virulência Patogenicidade

No verão 2014-2015, observou-se no Brasil a emergência de um agente infeccioso até então não descrito nas Américas, o vírus Zika. A maioria das infecções é assintomática. Os quadros sintomáticos caracterizam-se pela presença de exantema morbiliforme e hiperemia de conjuntivas, de curta duração, e frequentemente sem febre. Um estudo realizado em Salvador (BA) estimou que 70% da população foi infectada na primeira onda epidêmica. Cerca de um ano após a emergência, descreveu-se no país o quadro da síndrome congênita pelo vírus Zika, resultante da transmissão vertical. A síndrome congênita caracteriza-se pelo intenso comprometimento da neurogênese, resultando em microcefalia, hidrocefalia, hipoplasia do cerebelo, dilatação ventricular, comprometimento oto-oftalmológico e artrogripose.

As propriedades de infectividade, patogenicidade e virulência do vírus Zika podem ser classificadas respectivamente como:

- A Alta, baixa, alta.
- B Alta, alta, alta.
- C Baixa, alta, baixa.
- D Baixa, baixa, alta.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000140637

Questão 14 Curvas Epidêmicas

Uma das preocupações dos órgãos públicos da Saúde no enfrentamento da pandemia causada pelo SARS-CoV-2 é a segunda onda epidêmica.

Assinale a alternativa que apresenta o fator que influencia diretamente a ocorrência de uma nova onda epidêmica.

- A A taxa de letalidade da covid-19 na primeira onda.
- B A proporção de suscetíveis na população.
- C A testagem sorológica em massa.
- A subnotificação dos casos confirmados de covid -19.

Questão 15 Epidemias

Pode-se afirmar que caracteriza uma epidemia:

- a presença usual, e prevista, de dada doença, em dado local, por um período de tempo limitado.
- B o aparecimento de um único caso alóctone em uma região onde nunca tenha ocorrido determinada doença.
- o aparecimento de um único caso autóctone em uma região onde nunca tenha ocorrido determinada doença.
- a presença usual, e prevista, de dada doença, em dado local, por um período de tempo ilimitado.

4000137533

Questão 16 Medicina Preventiva Epidemias Investigação de Surtos

Quando um evento epidêmico ocorre de forma auto-limitada em uma área geográfica restrita e delimitada, denomina-se:

- Δ Pandemia
- _B Endemia
- C Surto
- D Progressão epidêmica
- E Egressão sazonal

Essa questão possui comentário do professor no site 4000131034

Questão 17 Medicina Preventiva Epidemias

Assinale a alternativa **correta** sobre a duração de uma epidemia.

- A Denomina-se surto epidêmico quando a duração da epidemia é restrita a um mês.
- As ações de controle e vigilância, idealmente, devem se encerrar em até 7 dias após se retornar ao nível endêmico.
- C A regressão de uma doença infecciosa se dá em até 48 h após se atingir o limiar máximo de incidência.
- A pandemia ocorre quando há propagação da doença infecciosa com uma larga distribuição espacial e, também, por 90 ou mais dias.
- E Uma epidemia pode durar um intervalo de tempo que compreenda horas, dias ou, até mesmo, meses.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000129818

Questão 18 Medicina Preventiva Epidemias


Assinale a alternativa **correta** sobre a evolução de uma epidemia.

- A Contrariamente à epidemia, que é temporalmente ilimitada, a endemia é restrita a um intervalo de tempo determinado.
- B A incidência de uma doença pode diminuir e sair do nível epidêmico pela importação de casos alóctones.
- A eventual endemicidade obtida após o decréscimo da incidência da doença pode se dar até mesmo em níveis inferiores à eclosão epidêmica.
- Numa curva epidêmica, uma primeira etapa tem um ramo ascendente de casos que, pela história natural das doenças infecciosas, termina dentro de 30 a 60 dias.
- A regressão é a última fase de evolução de uma epidemia e sempre termina com a erradicação da doença.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000129813

Questão 19 Construção do diagrama de controle Endemias Diferença entre Endemias e Epidemias

Um epidemiologista montou o seguinte diagrama de controle da doença "Z", que é considerada endêmica na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O diagrama contém o comportamento da referida enfermidade entre os meses de janeiro de 2018 e fevereiro de 2020.



Após a análise do diagrama, o epidemiologista fez as seguintes afirmativas:

- I. Os pontos "A" e "C" possivelmente correspondem às variações sazonais da doença "Z".
- II. O ponto "B" é uma variação temporal do tipo acíclica, podendo corresponder a uma epidemia.
- III. Uma doença endêmica pode evoluir de forma epidêmica, se as condições epidemiológicas permitirem.

Está correto o que se afirma em:

- Δ lell.
- B II e III.
- C lell.
- D Todas as assertivas estão corretas.
- F Todas as assertivas estão incorretas.

4000137307

Questão 20 Endemias

Assinale a alternativa que melhor define o conceito de endemia:

Α	Ocorrência de uma doença infecciosa, contagiosa, de e	xtensão rápida em uma certapop	ulação.
В	Epidemia generalizada, afetando praticamente todo o m	undo.	
С	Presença constante de uma doença em determinada zo	na geográfica.	
D	Série de vários surtos epidêmicos.		
			4000114650
Ques	stão 21 caso autóctone		
Em e	pidemiologia de doença infecciosa, caso autóctone é:		
A	surgido a partir do contato com o caso-indice		
В	atualmente presente na área de estudo		
C	adquirido de outra região		
D	de origem local		
			4000086561
Ques	stão 22 Surtos		
	ocorrência epidêmica restrita a uma área geográfica muito urante) é denominada	o delimitada (por exemplo: casa c	de repouso, escola, quartel,
A	pandemia.		

B endemia.

C surto.

D egressão.

F bioterrorismo.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000077944

Questão 23 Aspectos Epidemiológicos das Doenças Transmissíveis

Uma mulher com 25 anos de idade, provinda de região Nordeste do Brasil, na 16 a semana de sua primeira gestação, é atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) para a realização de pré-natal, referindo discreto exanterna com prurido há 2 dias, acompanhado de um episódio de febre de 38 °C, além de poliartralgia discreta. Ao exame físcio, apresenta temperatura axilar = 37,8 °C, hiperemia conjuntival, frequência respiratória = 18 irpm, frequência cardíaca = 80 bpm, com exanterna difuso discreto. Realizada a prova do laço, o resultado mostra-se negativo. Não se constataram visceronegalias e outros sinais ou achados ao exame físico. Considerando a hipótese provável de infecção viral e realizada a Notificação Compulsória da suspeita clínica de infecção por Zika vírus e dengue, a conduta médica indicada é:

- A solicitar a paciente o retorno diário a UBS, com monitoramento domiciliar da temperatura, para acompanhar evolução clínica e laboratorial com realização de hemograma completo e funções hepática e renal sequenciais.
- B solicitar imediatamente pesquisa para infecção por Zika vírus (por RT-PCR) e dengue (por NS-1), além de recomendar à paciente a adoção de medidas de proteção pessoal e familiar para minimizar a exporsição ao vetor.
- encaminhar a paciente ao serviço de saúde referência para gestação de alto risco, sugerindo investigação das hipóteses de infecção por Zika vírus ou dengue e soliciar exame ultrassonográfico obstétrico.
- solicitar avaliação complementar e sequencial de plaquetas em Unidade de Pronto Antendimento e sorologia para infecção por Zika Vírus no sexto dia dos sintomas, orientando a paciente acerca dos sinais de alerta.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000042558

Questão 24 Aspectos Epidemiológicos das Doenças Transmissíveis

A Câmara de Vereadores de um município brasileiro solicitou à Secretaria Municipal de Saúde providências em relação ao surgimento de casos de H1N1 na penitenciária local. Nessa situação, que ações devem ser instituídas pela Vigilância Epidemiológica para o controle do agravo?

- A Realizar quimioprofilaxia na população carcerária e em seus familiares, independentemente de fatores de risco.
- B Realizar quimioprofilaxia na população carcerária, isolar os casos suspeitos em ambiente hospitalar e vacinar os contactantes.
- Isolar os casos suspeitos em celas individuais, evitar trânsito de profissionais entre alas com e sem doentes e programar vacinação anual.
- Isolar os casos suspeitos em celas individuais e solicitar sorologia para diagnóstico de influenza em casos suspeitos até a confirmação de três casos.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126836

Questão 25 Investigação de Surtos

Na Enfermaria de um quartel militar constatou-se um aumento súbito de casos de afecções entéricas. Foram identificados 180 indivíduos adultos, do sexo masculino, que apresentaram às 14h (mediana do tempo de início dos sintomas) do dia 13 de janeiro de 2015, quadro de diarreia frequente e não volumosa, contendo pus ou sangue, dores abdominais intensas e febre. Não foram detectados casos de maior gravidade. Todos os doentes haviam participado de um jantar comemorativo ocorrido no quartel no dia anterior. Estavam presentes no jantar 220 pessoas. Após a investigação, o fato foi considerado um Surto de Doença Diarreica Aguda por transmissão alimentar. Duas possíveis fontes de infecção foram identificadas, conforme tabela a seguir: (VER IMAGEM) Analisando os dados do surto epidêmico e a tabela acima, é correto concluir-se que:


	Co	meram Ov	os	Não Comeram Ovos					
	Doentes	Sadios	Total	Doentes	Sadios	Total			
Não comeram frango	90	10	100	4	6	10			
Comeram frango	83	17	100	3	7	10			

- a ingestão de frango associada à ingestão de ovos diminuiu a probabilidade de adoecimento durante o surto epidêmico avaliado.
- B o ovo pode ser apontado como o alimento com maior probabilidade de ser a fonte de contaminação do surto epidêmico descrito
- a ingestão de frango associada à ingestão de ovos aumentou a probabilidade de adoecimento durante o surto epidêmico avaliado.
- o frango pode ser apontado como o alimento com maior probabilidade de ser a fonte de contaminação do surto epidêmico descrito.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126615

Questão 26 Epidemias

Em uma cidade, ocorreram vários casos de uma doença de notificação compulsória, suficientes para ultrapassar o limite endêmico superior em determinado período. A equipe da Vigilância Epidemilógica, após realizar investigação, elaborou o gráfico ilustrado a seguir, que considera a distribuição do número de casos (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal), além do período máximo de incubação desta doença (linha mais espessa, abaixo do eixo horizontal). (VER IMAGEM) Com base nos dados apresentados, como deveria ser caracterizada essa epidemia?



- A Exposição maciça, de forte comum e prolongada.
- B Exposição maciça, de fonte comum, curta duração ou explosiva.
- C Exposição múltipla, epidemia progressiva ou propagada.
- D Exposição maciça, de fonte múltipla, seguida de casos secundários.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126554

Respostas:

1	Е	2	Α	3	А	4	Е	5	С	6	В	7	С	8	D	9	Е	10	В	11	А
12	С	13	Α	14	В	15	С	16	С	17	Ε	18	С	19	D	20	С	21	D	22	С
23	В	24	С	25	В	26	В														