

**Questão 1** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Lactente de 10 meses de idade, em aleitamento materno e boa aceitação de alimentos durante a introdução alimentar passa em consulta de puericultura, sem queixas no momento da consulta. Durante a consulta a mãe refere que ele não consegue segurar pequenos objetos com movimento de pinça, fala "ma", "da" e "be", senta-se sozinho. Ao exame físico, sem alterações. Quanto ao desenvolvimento deste paciente, podemos avaliar:

- ☐ A Desenvolvimento adequado para a idade
- ☐ B Atraso em todos os marcos de desenvolvimento para a idade
- ☐ C Alerta no desenvolvimento motor fino, atraso no desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento motor grosseiro adequado
- ☐ D Atraso no desenvolvimento motor fino, atraso no desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento motor grosseiro adequado

4000184718

**Questão 2** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Miguel é uma criança de 3 meses, que foi levada por sua mãe, Rafaela, para consulta de puericultura. Miguel nasceu com peso de 3450g, perímetro cefálico de 34cm e 48cm de comprimento; seu exame físico, hoje, apresenta as seguintes medidas: peso de 6830g, perímetro cefálico de 41cm e comprimento de 61cm. Quando questionada, Rafaela traz algumas preocupações: refere que está preocupada com o peso de Miguel, pois acha que produz pouco leite; está preocupada também com o desenvolvimento do bebê e se ele já não deveria estar sentando. Ao conferir o cartão de vacinas de Miguel, o médico da UBS verifica as seguintes vacinas no cartão: BCG, DTP, Hib, VIP e pneumo conjugada. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir.

Pelo relato de Rafaela, Miguel apresenta atraso no desenvolvimento, pois, nessa idade, já é esperado que a criança sente sem apoio.

- ☐ A Certo.
- ☐ B Errado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184201

**Questão 3** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Menina de 9 meses foi trazida à UBS para atendimento em puericultura. Ao ser aplicado o Instrumento dos Marcos de Desenvolvimento, que integra a Caderneta da Criança, foi constatado, pela 1ª vez, que a criança não desenvolvera 2 habilidades para a faixa etária. Até então, vinha sendo capaz de dar conta de todos os itens do Instrumento para a faixa etária correspondente. Diante desse cenário e segundo as orientações contidas na referida Caderneta, como a criança deve ser classificada e qual a conduta a ser adotada?

- A Desenvolvimento adequado – Aplicar o Instrumento na próxima consulta.
- B Desenvolvimento adequado – Aplicar o Instrumento em 30 dias.
- C Alerta para o desenvolvimento – Aplicar o Instrumento em 30 dias.
- D Provável atraso no desenvolvimento – Acionar a rede de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182780](#)

**Questão 4** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

A avaliação do desenvolvimento dos reflexos primitivos da criança, a partir do nascimento, permite determinar a integridade do sistema nervoso central, de acordo com a idade cronológica. O reflexo de Moro deve estar presente no recém-nascido a termo desde o nascimento. Em relação ao período máximo de idade em que pode persistir, dentro de um cenário de normalidade do desenvolvimento, assinalar a alternativa CORRETA:

- A 2 meses de vida.
- B 4 meses de vida.
- C 6 meses de vida.
- D 8 meses de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182680](#)

**Questão 5** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Para que um recém-nascido, 15 dias de vida, nascido a termo por parto normal, em aleitamento materno exclusivo, tenha seu desenvolvimento motor considerado como adequado,

- A ele deve apresentar tônus flexor dos membros associado à hipotonia axial, preensão palmar reflexa e reflexo de sucção.
- B ele deve apresentar reflexo da marcha reflexa, reflexo de procura; ao posicionar a cabeça para o lado direito, mantém o braço direito em extensão e a perna direita e membros esquerdos em flexão.
- C a musculatura cervical deve manter, em decúbito ventral, a cabeça elevada em 45 graus, com os cotovelos posicionados atrás das orelhas.
- D ele deve, em decúbito ventral, levantar a cabeça, apoiar-se nos antebraços, segurar as roupas e cabelos quando no colo e objetos próximos.
- E ele deve apresentar movimentação ativa dos membros superiores e inferiores, abertura espontânea das mãos e reflexo de sucção.

4000182616

**Questão 6** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Menino de 2 anos e 3 meses comparece ao ambulatório com a avó. Preocupada com o desenvolvimento da criança, a senhora relata que, diferente de seus outros netos, o paciente ainda não fala nenhuma palavra, embora emita sons, escute bem e aponte o que deseja. A avó nega história de prematuridade, asfixia perinatal ou comorbidades e o menino não apresenta prejuízo no desenvolvimento motor ou na interação social. Nesse caso, em relação à investigação, o médico deve:

- A orientar a avó sobre o desenvolvimento do menino que será acompanhado sem intervenção imediata
- B solicitar ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma para fechar o diagnóstico
- C excluir o diagnóstico de deficiência auditiva, tomando como base o relato da avó
- D encaminhar o menino para avaliação multidisciplinar e terapias de estímulo

4000182310

**Questão 7** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Durante uma consulta de rotina de puericultura, a mãe de uma criança de 8 meses relata que está preocupada porque o seu filho ainda não consegue sentar sem apoio. A criança nasceu a termo e não há outras queixas; teste do pezinho: sem alterações. Você observa, durante a consulta, que a criança necessita de auxílio para passar da posição supina para a sentada, mas uma vez nessa posição permanece estável, sem cair. Restante do exame físico sem alterações. Qual a melhor conduta?

- A Manter retorno regular de puericultura.
- B Solicitar dosagem sérica de TSH e T4 livre.
- C Solicitar eletroneuromiografia e dosagem sérica de CPK.
- D Solicitar tomografia computadorizada de crânio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182102](#)

**Questão 8** **Pediatria** **Marcos Importantes**

Uma criança do sexo masculino, com 11 meses de idade, é avaliada quanto ao seu desenvolvimento em consulta de rotina. A mãe pergunta ao pediatra se a criança está com o desenvolvimento adequado. Considerando que a criança já atingiu os marcos do desenvolvimento esperados em idades anteriores, neste momento, para que esta criança seja considerada como tendo seu desenvolvimento normal, espera-se que ela

- A mostre o que quer; empilhe três blocos e ande sem apoio.
- B imite gestos; coloque blocos na caneca e fique parada em um pé só.
- C imite gestos; faça pinça e ande com apoio.
- D mostre o que quer; coloque blocos na caneca e ande sem apoio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181717](#)

**Questão 9** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Uma senhora vem à consulta de rotina e deseja saber do médico algumas das características de desenvolvimento normais para seu filho de 15 meses de idade. Assinale a alternativa correta.

- A É precária a demonstração de afeto por pessoas conhecidas.
- B Nessa idade, a criança já regulou os acessos de raiva quando frustrada.
- C A criança ainda não compartilha, com os outros objetos, que considera interessante.
- D A criança já é capaz de explorar sozinha o ambiente em que está na presença vigilante dos pais.

**Questão 10** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Considere a descrição abaixo, referente a um reflexo evidenciado pelo pediatra ao examinar um recém-nascido.

Rodando a cabeça do RN para um dos lados, ocorre abdução e flexão do membro superior do lado occipital bem como abdução e extensão do membro superior do lado facial.

A descrição corresponde ao reflexo de

- ☐ A Moro.
- ☐ B Magnus e Kleijn.
- ☐ C Landau e Magnus.
- ☐ D Galant.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000177550](#)

**Questão 11** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Acerca do desenvolvimento no primeiro ano de vida, assinale a alternativa correta.

- ☐ A No primeiro mês de vida, observa-se uma extensão generalizada dos membros, a hipotonia fisiológica.
- ☐ B A preensão palmar reflexa dura cerca de nove meses.
- ☐ C Aos dois meses, deve sustentar-se quando levantado pelos braços.
- ☐ D A mudança de decúbito ocorrer a partir do 6º mês de vida.
- ☐ E A preensão polegar-indicador (pinça) inicia-se por volta dos oito meses de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170604](#)

**Questão 12** Avaliando o desenvolvimento

Uma lactente de 6 meses, sexo feminino, nascida com 30 semanas, ganho de peso satisfatório, em aleitamento materno exclusivo até o momento, é levada para consulta de puericultura. A mãe acredita que sua filha está com atraso do desenvolvimento. Ao exame físico, o médico nota que a criança não consegue ficar sentada sem apoio, mas sustenta a cabeça na posição sentada; leva as mãos à boca; ao encostar brinquedo na mão, ela o segura; não se apoia sobre os braços e ainda não rola. Diante desse quadro, assinale a conduta correta.

- ☐ A Orientar atividades de estímulo para os pais realizarem e reavaliar o desenvolvimento em 3 meses.
- ☐ B Encaminhar para atendimento multidisciplinar, pois apresenta sinais de alerta para atraso do desenvolvimento.
- ☐ C Tranquilizar a mãe quanto à ausência de atraso de desenvolvimento e manter acompanhamento de rotina.
- ☐ D Encaminhar para neuropediatria, para investigação da etiologia do atraso de desenvolvimento já notável nessa avaliação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169851](#)

**Questão 13** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor

Leandro acabou de completar 3 anos de idade e veio à consulta de puericultura, acompanhado de sua mãe, Roseli, que não tem nenhuma queixa. Qual achado indicaria atraso de desenvolvimento neuropsicomotor?

- A Não é capaz de copiar o desenho de um círculo.
- B Não é capaz de emparelhar objetos da mesma cor.
- C Não pula com um pé só.
- D Não consegue copiar o desenho de uma cruz.
- E Não forma frases com 2 palavras.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169608](#)

**Questão 14** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Os reflexos primitivos aparecem e desaparecem dentro de períodos específicos do desenvolvimento. A imagem abaixo faz alusão gráfica a reflexo que aparece por volta do:



- A Quarto a quinto mês de vida, e desaparece por volta de um ano.
- B Sexto a sétimo mês de vida, e desaparece por volta dos dois anos.
- C Décimo a décimo primeiro mês de vida, e desaparece por volta dos dois anos.
- D Sétimo a oitavo mês de vida, e se mantém por toda a vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169497](#)

**Questão 15** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Neurologia**

Tendo em vista a avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor e os conhecimentos médicos correlatos, assinale a alternativa correta.

- A Aos 12 meses de vida é esperado que a criança compreenda ordens e solicitações simples.
- B Aos 7 meses de vida é esperado que a criança saiba rabiscar.
- C Aos 9 meses de vida é esperado que a criança caminhe sem apoio.
- D Aos 6 meses de vida é esperado que a criança use o movimento de pinça.
- E Aos 18 meses de vida é esperado que a criança use mais de 50 palavras.

[4000168992](#)

**Questão 16** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor**

Antônio é um lactente de 10 meses de idade e a mãe o trouxe para uma consulta de rotina. A anamnese completa e ao exame físico para avaliação dos marcos do desenvolvimento, qual dos achados abaixo é preocupante e deve ser motivo de melhor investigação nessa idade?

- A A criança apresenta somente os dentes incisivos centrais inferiores e superiores
- B A criança assenta-se utilizando o tripé de pernas com uma mão apoiada e segura um objeto com a mão, mas sem conseguir passá-lo para a outra mão
- C A criança fica de pé com apoio, mas quando colocada no chão não engatinha em quatro apoios, arrastando-se
- D A criança reconhece a face da mãe ou cuidador e chora quando é afastado dos mesmos

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168722](#)

**Questão 17**    **Pediatria**    **Avaliando o desenvolvimento**

Menino, 1 ano e 2 meses de idade, é acompanhado em puericultura na UBS desde o nascimento, apresentando crescimento e desenvolvimento adequados. Na consulta de hoje, a mãe mostrou-se preocupada, pois o filho fala pouco e ainda não anda sozinho, diferentemente da outra filha que nessa idade falava bastante e andava pela casa sozinha. Ao avaliar os marcos do desenvolvimento, o médico observou que o menino fica de pé com apoio e troca passos, faz movimento de pinça ao pegar uma “bolinha de papel”, aponta com o indicador quando quer um objeto e fala “papá, mamá, qué, dá, não”. Qual é o diagnóstico mais provável do desenvolvimento?

- A Atraso no desenvolvimento motor grosseiro; desenvolvimento motor fino e de linguagem dentro do esperado.
- B Atraso do desenvolvimento motor fino; desenvolvimento motor grosseiro e de linguagem dentro do esperado.
- C Atraso do desenvolvimento da linguagem; desenvolvimento motor grosseiro e motor fino dentro do esperado.
- D Desenvolvimento motor grosseiro, motor fino e de linguagem dentro do esperado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166292](#)

**Questão 18**    **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor**    **Pediatria**

Recém-nascido, 40 semanas de idade gestacional, sexo masculino, nasceu de parto cesárea por falha de indução, Apgar 9/10, peso de 2.950 g. Mãe primigesta, 20 anos, não fez pré-natal e relata ser usuária habitual de drogas ilícitas. O menor está sendo examinado no alojamento conjunto, com 72 horas de vida, e alguns dados do exame clínico estão apresentados nas imagens abaixo.







Qual é a conduta indicada face aos dados clínicos apresentados?

- A Apuração de maus-tratos no alojamento conjunto.
- B Solicitação de cariótipo.
- C Investigação neurológica complementar.
- D Alta hospitalar com seguimento de rotina em UBS.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165603](#)

**Questão 19** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria** **Marcos Importantes**

Lactente, sexo feminino, 11 meses de vida, está em consulta ambulatorial de rotina. Trata-se de criança prematura, nascida de 35 semanas, com peso de nascimento de 2110 g, sem intercorrências durante o seguimento. Na consulta de hoje, a maior preocupação da mãe é que a criança não engatinha. Na avaliação realizada na consulta, notado que a criança imita a mãe ao bater palmas, faz movimentos de pinça para pegar objetos, reage a uma conversa como se estivesse respondendo, mas com sons incompreensíveis, sem falar nenhuma palavra. Ela fica em pé com apoio, mas realmente não engatinha quando colocada de bruços.

Qual das alternativas contempla, respectivamente, a avaliação do desenvolvimento e a conduta indicada?

- A O atraso do desenvolvimento é justificado pela prematuridade, orientar estimulação motora e retorno precoce.
- B O desenvolvimento motor está atrasado mesmo se considerada a prematuridade, encaminhar para seguimento com fisioterapia.
- C O desenvolvimento está compatível com o esperado para a idade, sem necessidade de nenhuma intervenção específica.
- D O desenvolvimento motor e de linguagem estão atrasados para a idade, iniciar investigação com eletroencefalograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165585](#)

**Questão 20** DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Em relação ao desenvolvimento normal da criança no primeiro ano de vida, é correto afirmar que:

- A Não é comum que ao final do primeiro ano de vida a criança consiga ficar de pé com apoio.
- B A criança duplica seu peso de nascimento ao final do primeiro ano de vida.
- C A criança aumenta 10% em seu comprimento do nascimento ao primeiro ano de vida.
- D Ao final do primeiro ano de vida é habitual a criança ter um vocabulário com cerca de 20 palavras.
- E O desenvolvimento das habilidades motoras é maior que o da linguagem falada no primeiro ano de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164705](#)

**Questão 21** **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Um casal de adolescentes traz seu filho de 6 meses à Unidade de Saúde, preocupado se seu desenvolvimento está se dando de forma normal. O lactente nasceu a termo e está em aleitamento materno exclusivo. Ao examiná-lo, o médico orienta o casal em relação à aquisição de novas habilidades pelo bebê. Aos 6 meses, o que se espera que um lactente com desenvolvimento normal seja capaz de fazer?

- A Arrastar-se e dar "tchau".
- B Engatinhar e bater palmas.
- C Ficar em pé com apoio e falar ao menos 1 palavra com sentido.
- D Segurar um objeto com as duas mãos, levá-lo à boca e rolar no leito.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163675](#)

**Questão 22** **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Lactente, sexo masculino, 11 meses, é trazido à consulta e, segundo a mãe, não está fazendo as mesmas coisas que as outras crianças da sua idade. Ainda não caminha, balbucia, mas não diz nenhuma palavra, além de "mama" e "papa". Apresenta uma boa interação social com a mãe, se interessa pelos brinquedos que são colocados ao seu alcance e campo visual. Senta com apoio, engatinha pouco e, por poucos segundos, consegue ficar em pé, apoiado. História pregressa: nasceu pré-termo de 35 semanas de gestação, pesando 2.230g. Não apresentou intercorrências no período perinatal e iniciou o aleitamento materno nas primeiras 24h de vida. A orientação adequada, nesse caso, é:

- A Encaminhar para avaliação neurológica com investigação de imagem e eletroencefalograma.
- B Investigar audição, encaminhar ao neurologista e iniciar tratamento fonoaudiológico imediato.
- C Iniciar intervenção com fisioterapia e terapia ocupacional, duas vezes na semana, e fazer revisão em um mês.
- D Investigar audição e transtorno do espectro autista, iniciar tratamento fonoaudiológico e terapia ocupacional.
- E Considerar defasagem normal dentro dos padrões esperados se corrigida a idade gestacional e reavaliar em um mês.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163578](#)

**Questão 23** **12 meses**

Uma lactente de 13 meses de idade, de sexo feminino, é levada à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. A mãe está preocupada, pois a criança ainda não é capaz de andar sem apoio. Não há outras queixas. O pré-natal materno não



possui intercorrências; nasceu de parto normal, com 40 semanas de idade gestacional; Boletim de Apgar no 1º minuto = 6; no 5º minuto = 9; e no 10º minuto = 10; com peso ao nascer = 3 200 g e comprimento ao nascer = 50 cm. No exame clínico neonatal, observou-se estalido à manobra de Ortolani à direita; na ocasião, realizou exame ultrassonográfico de quadril apresentando resultado I pelo método de Graf. Recebeu alta no segundo dia de vida. Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Desenvolvimento neuropsicomotor prévio: sorriso social aos 2 meses; fixou o pescoço aos três meses; sentou sem apoio aos sete meses; passou a distinguir familiares de estranhos e a reconhecer seu nome aos nove meses; primeiras palavras com significado aos 11 meses. Atualmente engatinha, fica em pé com apoio das mãos e arrisca alguns passos sem apoio, mas logo cai; usa copo com ajuda, compreende ordens simples, bate palma, manda beijo, fala “mama” e “papa” para referir-se à mãe e ao pai respectivamente. Não apresenta alterações ao exame clínico. A conduta adequada para essa criança, considerando o desenvolvimento da marcha é

- A manter acompanhamento de rotina.
- B encaminhar para fisioterapia motora para membros inferiores.
- C encaminhar ao neurologista devido à anoxia perinatal.
- D encaminhar ao ortopedista por suspeita de displasia congênita do quadril.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153213](#)

#### Questão 24 Avaliando o desenvolvimento

Lactente de 6 meses de vida é conduzido para consulta de puericultura. Está em aleitamento materno exclusivo, sem queixas. Não faz uso de nenhuma medicação. Refere gestação e parto sem intercorrências. Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, qual alternativa configura atraso para um lactente de 6 meses?

- A Senta somente com apoio.
- B Não engatinha.
- C Não sustenta a cabeça.
- D Não pega em pinça.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171542](#)

#### Questão 25 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor 6 meses Pediatria

Uma lactente com 6 meses de idade é levada à consulta de Puericultura na Unidade Básica de Saúde. A mãe relata ter feito 9 consultas pré-natais e não ter apresentado intercorrências em sua gestação. Informa que a criança nasceu a termo, com peso de 3 kg e sem intercorrências. Não há relato de doenças na história patológica pregressa. A mãe refere que a criança está saudável e em aleitamento materno exclusivo. Na avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, o profissional observa que ela troca objetos de uma mão para a outra, sustenta bem a cabeça, rola com facilidade e fica sentada apenas quando se apoia nas mãos. Nessa situação, o médico deve comunicar à mãe que a criança apresenta

- A desenvolvimento neuropsicomotor adequado, devendo retornar segundo calendário de Puericultura.
- B desenvolvimento neuropsicomotor adequado, devendo ser estimulada e reavaliada em 30 dias.
- C um provável atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, devendo ser estimulada e reavaliada em 7 dias.
- D um provável atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo necessário encaminhá-la para avaliação pelo neurologista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126841](#)

1	C	2	B	3	C	4	C	5	A	6	D	7	A	8	C	9	D	10	B	11	E
12	C	13	E	14	D	15	A	16	B	17	D	18	C	19	C	20	E	21	D	22	E
23	A	24	C	25	A	26	D	27	B												