

Questão 1 Aborto legal no Brasil

Jovem de 24 anos chega ao serviço de saúde relatando estar grávida de 8 semanas, após ter sofrido violência sexual, e desejando interromper a gravidez. Não realizou nenhum boletim de ocorrência e não possui ordem judicial, tendo apenas passado por atendimento em unidade de saúde na época da violência. Ela deve ser informada de que tem direito ao aborto:

- ☐ A após início de ação penal e notificação policial
- ☐ B mediante realização de boletim de ocorrência
- ☐ C com apresentação de autorização judicial
- ☐ D sem procedimento policial ou judicial

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182281](#)

Questão 2 Atendimento à vítima de violência sexual

Lidia, mulher cis de 24 anos, G1P1, comparece à emergência da maternidade em que você está de plantão com história de conjunção carnal não autorizada ocorrida há mais ou menos 3h. A mesma tem enxaqueca e história de trombose venosa profunda em gestação anterior há 2 anos. Considerando o acolhimento e as profilaxias necessárias às vítimas de violência sexual, assinale a alternativa correta.

- ☐ A A paciente deve primeiro realizar um boletim de ocorrência antes do atendimento médico para que não se percam vestígios da violência.
- ☐ B O método de primeira escolha para a anticoncepção de emergência, consiste no uso exclusivo de um progestágeno, o levonorgestrel.
- ☐ C O método de escolha para a profilaxia de gravidez a ser ofertado a essa paciente, seria um DIU de cobre, visto história prévia de trombose venosa profunda.
- ☐ D Realizar notificação obrigatória, anticoncepção de emergência, profilaxias para sífilis, hepatites B e C, HIV, tricomoníase, clamídia, gonorréia, cancro mole e tétano.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000181420](#)

Questão 3 Atendimento à vítima de violência sexual

A violência sexual contra as mulheres é uma realidade, e os serviços de saúde, assim como seus profissionais, devem estar preparados para esse acolhimento e atendimento adequado. Em relação ao atendimento à vítima de estupro nos serviços de saúde,

- ☐ A o serviço de saúde não precisa ser especializado, pois a coleta de material da vítima para identificação do agressor não é obrigatória, mas pode servir de prova para a justiça.
- ☐ B o hospital que possui serviço de saúde especializado deve realizar exame de corpo de delito durante o próprio atendimento médico, evitando que a vítima tenha que se deslocar ao IML.
- ☐ C o exame de corpo de delito deve ser solicitado pelo médico de plantão do hospital se a vítima ainda não tiver ido ao IML.
- ☐ D o exame de médico não perito ou legista não tem qualquer valor para a justiça, e, portanto, o atendimento hospitalar só deve ocorrer após o exame pericial.

Questão 4 Aborto legal no Brasil

No Brasil, de acordo com a legislação em vigor desde 1940, o abortamento está descriminalizado quando não há outra forma de salvar a vida da gestante; e quando a gravidez decorre de estupro. O acesso à interrupção legal e segura da gestação tem sido garantido às mulheres de forma precária e limitada, o que as leva a recorrer ao aborto clandestino e inseguro. Dessa forma, o aborto legal

- A pode ser realizado de acordo com a estrita legalidade, mesmo que não seja feito o boletim de ocorrência nem realizado o exame pelo Instituto Médico Legal.
- B deve ser realizado após elaboração de laudo por um médico do Instituto Médico Legal.
- C deve ser realizado exclusivamente em unidade de atendimento à violência contra a mulher.
- D pode existir a recusa do médico assistente em fazer o procedimento, caso seja o único atendente na localidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000177443](#)**Questão 5** Atendimento à vítima de violência sexual

Adolescente, 14 anos, sexo feminino, vítima de estupro, é levada à emergência acompanhada dos pais. Além de notificar o Conselho Tutelar, o médico deve, obrigatoriamente,

- A pesquisar sífilis e outras DST.
- B solicitar marcadores virais para hepatites.
- C prescrever anticoncepção de emergência.
- D confirmar violência sexual com avaliação ginecológica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000177188](#)**Questão 6** Profilaxia para HIV

Adolescente de 13 anos, sexo feminino, é levada ao atendimento de emergência, pois acaba de ser vítima de violência sexual. Apresenta teste rápido para HIV negativo. Segundo o MS, além da instituição de profilaxia contraceptiva e comunicação ao Conselho Tutelar, o tratamento profilático de escolha contra infecção pelo HIV é:

- A tenofovir/lamivudina + ritonavir
- B zidovudina/lamivudina + ritonavir
- C tenofovir/lamivudina + dolutegravir
- D zidovudina/lamivudina + dolutegravir

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171022](#)**Questão 7** Prevenção de gravidez

Paciente de 23 anos procura atendimento referindo ter tido relação sexual não consentida após uma festa. Relata que ingeriu bebidas alcoólicas durante o evento, ficou desacordada e acordou no dia seguinte com um desconhecido em um motel. Não procurou atendimento médico na ocasião por vergonha. Há cinco dias, fez exame que revelou gestação com 6 semanas de evolução, idade gestacional compatível com o relato do abuso sexual sofrido. Não deseja prosseguir com a gravidez, desejando interrompê-la. Para a realização do procedimento, a documentação obrigatória exigida é um(a):

- A autorização judicial
- B boletim de ocorrência policial
- C termo de consentimento livre e esclarecido
- D exame de corpo delito realizado por perito médico

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171007](#)

Questão 8 Prevenção de gravidez Quimioprofilaxia

Durante o atendimento às vítimas de violência sexual, os tratamentos profiláticos de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e de gravidez para mulheres sem uso de métodos contraceptivos efetivos devem ser realizados:

- A após o resultado dos exames para gravidez e para IST
- B independente da coleta de exames para gravidez e para IST
- C em caso de exame positivo para gravidez e independente da coleta para IST
- D em caso de exame positivo para IST e independente da coleta para gravidez

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171005](#)

Questão 9 Atendimento à vítima de violência sexual

O atendimento após a ocorrência de violência sexual é uma urgência, para a qual se deve garantir acesso e acolhimento reconhecendo as especificidades das populações prioritárias. Com relação ao atendimento às vítimas de violência sexual, marque a resposta correta:

- A A profilaxia pós exposição (PEP) não deve ser administrada em gestantes.
- B A PEP para o HIV consiste no uso de antirretroviral por um período de 7 dias e deve-se iniciar no máximo até 72 h após a exposição.
- C Os adolescentes somente têm direito a PEP na presença de um dos pais ou responsáveis legais.
- D Mulheres lactantes vítimas de violência sexual devem ser orientadas a interrupção temporária da amamentação, reintroduzir a amamentação na 12ª semana após o início da PEP se o seu resultado do anti-HIV for não reagente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168911](#)

Questão 10 Atendimento à vítima de violência sexual

Mulher, 31a, procura o serviço por estar gestante e deseja interrupção da gravidez. Refere ter companheiro e fazer uso de preservativo em suas relações sexuais. Refere que a gestação é fruto de um estupro ocorrido há 9 semanas. Na época, ficou muito traumatizada e não fez boletim de ocorrência, não contou para ninguém sobre o ocorrido e nem procurou atendimento médico. ALÉM DAS PROFILAXIAS INDICADAS, A ORIENTAÇÃO PARA A MULHER NESSE CASO É:

- A Seguir a gestação com apoio psicológico, pois não tem direito ao aborto legal.
- B Registrar queixa na Delegacia de Defesa da Mulher para ter direito ao aborto legal.
- C Obter a anuência do companheiro para ter direito ao aborto legal.
- D Explicar que tem direito ao aborto legal mediante seu próprio relato.

Questão 11 Atendimento à vítima de violência sexual

Homem transgênero, 30a, vem ao pronto socorro referindo ter sofrido violência sexual com penetração há 24 horas. Nega comorbidades, uso de medicamentos e cirurgias prévias. A CONDOTA ADEQUADA PARA ESTE PACIENTE É:

- A Anticoncepção de emergência com levonorgestrel 1,5 mg em dose única.
- B Não indicar anticoncepção porque é um homem transgênero.
- C Não indicar anticoncepção de emergência, pois evento ocorreu há mais de 12 horas.
- D Anticoncepção de emergência com desogestrel 0,75 mg duas doses com intervalo de 12 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167393

Questão 12 Profilaxia para HIV

Menina, 7a, é trazida pela mãe com relato de abuso sexual pelo padrasto há quatro dias. Informa ainda que estes abusos já vêm acontecendo há cerca de seis meses. EM RELAÇÃO À PROFILAXIA DA INFECÇÃO PELO HIV, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A Prescrever tenofovir + lamivudina + dolutegravir (TDF+3TC+DTG).
- B Prescrever o esquema TDF+3TC+DTG, se teste rápido do agressor for positivo.
- C Prescrever zidovudina (AZT) por 28 dias.
- D Não há indicação de profilaxia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167374

Questão 13 Atendimento à vítima de violência sexual

Adolescente, 16 anos de idade, é levada à UPA pela mãe, por ter sido agredida fisicamente há, aproximadamente, 3 horas. O relato é de que o padrasto a espancou ao chegar, alcoolizado, em casa. O médico observa que a menor está tensa e retraída, limitando-se a responder com a cabeça às suas perguntas, enquanto a genitora relata o quadro que encontrou em casa.

Indique a conduta mais correta, nesse momento, tendo sido verificado que houve abuso sexual, e diante do risco iminente de gravidez:

- A Emitir solicitação de exame no IML.
- B Prescrever contracepção de urgência.
- C Encaminhar para avaliação por ginecologista.
- D Aguardar o Conselho Tutelar para definir conduta.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165049

Questão 14 Atendimento

Uma mulher de 21 anos de idade chega ao ambulatório alegando ter sido vítima de violência sexual na noite anterior. Encontrava-se abatida, chorosa e com dificuldades de se expressar, mas sem sinais evidentes de agressão física. Disse ter demorado para procurar assistência médica porque não queria registrar queixa policial.

Diante dessa situação, responda as questões a seguir.

Como o médico deve orientar a paciente quanto ao registro da ocorrência?

Quais são as etapas do atendimento dessa mulher?

Caso a mulher se recuse a ser examinada, como o médico deve proceder?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153254](#)

Questão 15 Atendimento à vítima de violência sexual

Sua paciente de 18 anos foi escondida dos pais para uma balada e lá foi vítima de abuso sexual por um desconhecido. Relata que acha que algo foi colocado na sua bebida e acordou em um motel. Chega ao serviço de urgência 12 horas após o ocorrido. Nega uso de medicação contraceptiva. Não porta cartão vacinal. Elabore um roteiro do seu atendimento constando principalmente os detalhes de notificação e profilaxias.

4000153139

Questão 16 Acolhimento e notificação

Uma criança do sexo masculino com 5 anos de idade chega à consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) conduzido pela mãe. Ela relata que o menor vem apresentando há algumas semanas, lesões na região perianal, conforme mostra a foto a seguir.



Na anamnese, foram coletadas as seguintes informações: a mãe não vive com o pai da criança, trabalha como diarista e a criança fica na casa do vizinho, um senhor já aposentado. O menor não frequenta a escola e o último registro de atendimento na UBS foi há 3 anos. O médico observa que a criança apresenta um comportamento arredio e se agarra à mãe quando dele se aproxima. Considerando o quadro descrito e as informações apresentadas, responda o questionamento do seguinte item a seguir. Além de tratar a lesão, qual deve ser a conduta adequada?

4000127939

Questão 17 Atendimento

Uma mulher com 20 anos de idade e vida sexual ativa, nuligesta, é encaminhada ao serviço de referência hospitalar por ter sido vítima de estupro há cerca de 4 horas. Relata que não conhecia o agressor e que houve penetração vaginal sem uso de preservativo. Informa também que não faz uso de métodos contraceptivos e não lembra da sua situação vacinal. O exame geral e o exame ginecológico não revelam traumatismos físicos, genitais ou extragenitais. Considerando a abordagem integral dessa paciente, elabore um plano de cuidado que contemple as dimensões que devem fazer parte do atendimento inicial, com vistas à prevenção e ao tratamento dos agravos resultantes da violência sexual.

MÉTODO	DOSE	VIA	OBSERVAÇÃO
LEVONORGESTREL Primeira Escolha	0,75 mg de levonorgestrel por comprimido 1,5 mg de levonorgestrel por comprimido	Oral Oral	2 comprimidos dose única 1 comprimido dose única
MÉTODO DE YUZZE Segunda Escolha	AHOC com 0,05 mg de etinil-estradiol e 0,25 mg de levonorgestrel por comprimido AHOC com 0,03 Mg de etinil-estradiol e 0,15 mg de levonorgestrel por comprimido	Oral Oral	2 comprimidos cada 12 horas - total de 4 comprimidos 4 comprimidos cada 12 horas - total de 8 comprimidos

VACINA ANTI-HEPATITE B	
Aplicar IM em deltóide	0, 1 e 6 meses após a violência sexual
Imunização ativa	
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B	
0,06 ml/Kg	
Aplicar IM em glúteo	dose única
Imunização passiva	

Fonte: (CGPNV/SVS/MS, 2006)

Medicação	Apresentação	Via de administração	Posologia
Penicilina G benzatina	1,2 milhão UI	IM	2,4 milhões UI (1,2 milhão em cada nádega), dose única
Ceftriaxona	250mg	IM	250mg, dose única
Azitromicina	500mg	VO	02 comprimidos, dose única

* Esse esquema pode ser utilizado durante a gestação. ** Gestantes devem usar ceftriaxona.
Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Manual de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST. 4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 140 pag. (Série Manual, nº68)

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126436

Questão 18 Atendimento à vítima de violência sexual

Uma criança de 5 anos de idade, do sexo feminino, é filha de mãe usuária de crack. Uma vizinha identificou que ela vinha sofrendo abuso sexual pelo padrasto, que era seu cuidador. A vizinha socorreu a criança e levou-a ao Pronto Socorro, onde foi atendida por equipe multiprofissional. Após o atendimento, a indicação das medicações para as Doenças Sexualmente Transmissíveis e a identificação de risco de recidiva de vitimização, foi determinado que a criança seria encaminhada para uma instituição governamental.

Diante desse quadro, faça o que se pede nos itens a seguir.

- Conceitue violência sexual em relação à criança e ao adolescente e quais são os tipos em que ocorrem.
- Além de realizar o atendimento emergencial da vítima e realizar o boletim de ocorrência, qual(is) outro(s) órgão(s) deverão ser comunicados? Na falta desse(s) órgão(s), qual seria o procedimento adequado?
- Após a criança ser vítima de abuso sexual, há aumento da probabilidade para outras comorbidades. Diante do ocorrido, como deverá ser garantido o seguimento dessa criança?

Essa questão possui comentário do professor no site 4000129693

Questão 19 Atendimento à vítima de violência sexual Profilaxia pós-exposição PEP

Uma adolescente, com 19 anos de idade, comparece ao plantão da Unidade de Emergência relatando ter sofrido violência sexual há cerca de 48 horas. Afirma que não procurou o atendimento antes por ter recebido ameaças anônimas por telefone. Afirma que sofreu penetração vaginal com ejaculação. A profilaxia da infecção por HIV com antirretrovirais para a paciente deve ser

- realizada com a nevirapina ou o efavirenz.
- iniciada em até 96 horas da violência sexual.
- mantida sem interrupção por quatro semanas.
- é contraindicada pelo tempo já decorrido.

Questão 20 Acolhimento e notificação Legislação sobre aborto

Uma mulher com 32 anos de idade, solteira, sem vida sexual ativa, refere ter sido vítima de violência sexual. Por ocasião do estupro, a paciente não contou nada a ninguém e, posteriormente, descobriu que estava grávida. No momento atual, a gestante manifesta para seu médico o desejo de interromper a gravidez. O profissional médico recusa-se a fazer o aborto nessas condições e argumenta que há necessidade de verificação da denúncia de estupro pelo médico do Instituto Médico Legal (IML). O médico aciona o Serviço Social da instituição e a polícia local, para que a gestante possa lavrar o Boletim de Ocorrência do estupro, esclarecendo que esse documento servirá como consentimento para o procedimento. Nessa situação, a conduta médica foi

- ☐ A adequada, pois para a prática do abortamento legal há necessidade de decisão judicial afirmando o estupro.
- ☐ B inadequada, pois o laudo do IML não é exigido legalmente para realização do abortamento em casos de estupro.
- ☐ C adequada, pois a vítima de um crime contra a dignidade sexual deve imediatamente comunicar a ocorrência à polícia para início de ação penal pública incondicionada.
- ☐ D inadequada, pois o consentimento da mulher é feito por documento próprio, devendo ser assinado pela vítima que deseja o abortamento e por um familiar.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126764

Questão 21 Aborto legal no Brasil Obstetrícia

Descreva os requisitos necessários para realização no Brasil de interrupção legal da gestação por anencefalia fetal.

4000126480

Questão 22 Atendimento

Uma mulher de 27 anos de idade é atendida em Unidade de Pronto Atendimento e relata ter sido estuprada por homem desconhecido 1 hora antes.

Qual a conduta mais adequada nessa situação?

- A** Acolher a paciente, prestar atendimento médico e psicológico e, em seguida, encaminhá-la à Delegacia de Polícia para registro obrigatório do boletim de ocorrência.
- B** Encaminhar a paciente à Delegacia de Polícia para registro de boletim de ocorrência e, após retornar à Unidade se houver lesões físicas a serem reparadas.
- C** Prestar atendimento com apoio de equipe multidisciplinar, com reparação das lesões, medidas de profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e gestação, acompanhamento psicológico e comunicação do fato, pelo médico, à autoridade policial.
- D** Encaminhar a paciente à Delegacia de Polícia mais próxima para registro de boletim de ocorrência e solicitar que, após ter feito isso, volte à Unidade para atendimento médico com exame ginecológico e medidas de profilaxia e reabilitação física e emocional.
- E** Acolher a paciente e prestar atendimento com apoio de equipe multidisciplinar, com reparação das lesões, medidas de profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e gestação, acompanhamento psicológico e orientação quanto ao registro de boletim de ocorrência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129301](#)

Questão 23 **Atendimento à vítima de violência sexual**

Mulher, com 21 anos de idade, estava próxima ao ponto de ônibus, quando foi abordada por um indivíduo estranho, que mediante ameaça com uma faca a obrigou entrar em uma casa abandonada, próxima àquele local, onde a agrediu fisicamente e obrigou-a a manter relação sexual vaginal e anal. Em seguida o agressor evadiu-se. A mulher procurou, imediatamente um posto policial onde foi orientada a buscar auxílio médico e foi encaminhada à Unidade de Atendimento de Emergência. Analise os itens abaixo:

- I. Comunicar à unidade policial para a realização de boletim de ocorrência, após autorização da paciente.
- II. Não realizar toque vaginal ao atender a paciente por ser vítima de violência sexual e estupro.
- III. Promover o acolhimento da paciente e examinar para verificar se existem lesões.
- IV. Explicar que trata-se de atendimento exclusivo da alçada do Instituto Médico Legal.
- V. Promover assistência médica visando a prevenção de doenças de transmissão sexual.
- VI. Ofertar anticoncepção de emergência caso não possua um método anticonceptivo efetivo. VII. Solicitar, antes de iniciar a avaliação da paciente, a presença do pai ou marido, se for o caso.

Assinale a alternativa que contém apenas itens corretos de medidas médico-legais a serem tomadas pelo médico de plantão.

