

**Questão 1** **Prevenção Quaternária**

Qual é a definição que mais bem se encaixa no conceito de prevenção quaternária?

- ☐ A Redução de prejuízos funcionais de um indivíduo secundários a problema agudo ou crônico.
- ☐ B Rastreamento para diagnóstico precoce da doença.
- ☐ C Prevenção de danos ao paciente, atuando na equipe de saúde.
- ☐ D Impedimento da ocorrência de doenças.
- ☐ E Prevenção de hipermedicalização e intervenções desnecessárias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000171110](#)

**Questão 2** **Prevenção Quaternária**

Na APS, o médico de família lida com diversos níveis de prevenção da saúde. Um exemplo de intervenção médica INCOMPATÍVEL com a prevenção quaternária é o(a):

- ☐ A oferta de exames de rastreio para grupos populacionais selecionados a partir do perfil epidemiológico
- ☐ B oferta de exames de rastreio para pessoas saudáveis e sem fatores de risco relevantes
- ☐ C uso de medicamentos para tratamento e controle de sinais e sintomas
- ☐ D solicitação de exames complementares para investigação diagnóstica

4000171030

**Questão 3** **Atenção Primária à Saúde APS no Brasil** **Modelos Explicativos de Saúde e Doença**

Giovanna, uma criança com nove meses de vida, que frequenta a creche, foi levada ao acolhimento da UBS, para consulta com médica da família, por queixa de tosse, coriza e febre há dois dias. Na creche da paciente, está tendo um surto de bronquiolite e Ana, sua mãe, chegou à UBS muito assustada, com medo de a criança ter “pego a tal doença”. Ao exame físico, a criança está em bom estado geral, hidratada, com saturação de 96% e frequência respiratória de 30 ipm. Na ausculta pulmonar, há sibilos esparsos, porém sem tiragem intercostal ou subcostal. Não está febril e há diurese na fralda.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, na comparação entre o manejo na APS e o manejo no pronto-socorro, as principais ferramentas que se pode utilizar na APS são

- ☐ A o acesso e o método clínico centrado na pessoa.
- ☐ B a longitudinalidade e a demora permitida.
- ☐ C a triagem por escala de Manchester e a gestão do tempo.
- ☐ D as tecnologias leves e os exames complementares.
- ☐ E as tecnologias duras e a longitudinalidade.

4000170635

**Questão 4** Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS Lei n 8080/1990

A saúde tem “como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”, como refere o texto da

- A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080), Brasil, 1990.
- B Declaração de Alma Ata sobre Cuidados Primários, OMS, 1978.
- C Constituição da República Federativa do Brasil, Brasil, 1988.
- D Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948.

4000170098

**Questão 5** Processo saúde/doença

Em 1920, Winslow, antigo professor de saúde pública da Universidade de Yale, apresentou a seguinte definição de saúde pública:

*Saúde Pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física, mental e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio ambiente, o controle de infecções na comunidade, a organização de serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças e o aperfeiçoamento da máquina social que irá assegurar a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à manutenção da saúde.*

É correto afirmar, com base nesse texto, que

- A esses são conceitos muito antigos e totalmente desatualizados quando se pensa em saúde pública nos dias atuais.
- B é destacado o papel dos médicos como principais responsáveis das equipes multidisciplinares de saúde.
- C é mencionada a importância da prevenção secundária.
- D são consideradas apenas as doenças infecciosas como objetivo da saúde pública.
- E o principal objetivo da saúde pública é a organização eficiente dos serviços de assistência à saúde.

4000169988

**Questão 6** Processo saúde/doença Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

As latrogenias, cuja redução é prevenção quaternária, estão relacionadas

- A Ao período pré-patogênico da História Natural das Doenças.
- B Ao período patogênico, doença precoce, da História Natural das Doenças.
- C Ao período patogênico, doença avançada, da História Natural das Doenças.
- D A qualquer período da História Natural das Doenças.

4000169727

**Questão 7** Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

O Triple Aim (Tripla Meta) foi uma proposta criada pelo Institute for Healthcare Improvement para identificação dos pilares para o sucesso e a sustentabilidade de um sistema de saúde. Com o passar do tempo, foi acrescentado a essa proposta um quarto elemento, denominando-se então Quadruple Aim (Quadrupla Meta). Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse quarto elemento.

- A Melhor experiência do profissional.
- B Melhor experiência do paciente.
- C Melhores indicadores de saúde.
- D Maior segurança do paciente.
- E Menores custos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167185](#)

**Questão 8** Prevenção Quaternária Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

O conceito de prevenção quaternária foi proposto, a partir de 1999, pelo médico de família belga Marc Jamouille, tomando como base a proposta de Leavell & Clark de níveis de prevenção. Qual das seguintes alternativas expressa uma medida de prevenção quaternária?

- A Realizar eletrocardiografia em todos os exames admissionais.
- B Imunizar crianças contra poliomielite (paralisia infantil).
- C Coletar exame citopatológico do colo uterino em mulheres em idade fértil.
- D Rastrear o câncer de próstata com o exame de PSA.
- E Utilizar da demora permitida diante de um quadro de lombalgia sem sinais de alarme.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167182](#)

**Questão 9** Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Elza é residente do primeiro ano de Clínica Médica e acompanha, durante seu estágio na enfermagem, a internação de Paulo, 56 anos. Ele é hipertenso grave de longa data e tem instalada uma insuficiência cardíaca, NYHA classe III. Ela se lembra de seu avô José que também é hipertenso, mas, ao contrário de Paulo, é bem controlado e sem comprometimento significativo da sua funcionalidade. Ela conclui que, com resultados tão diversos, muitas ações preventivas provavelmente deixaram de existir ao longo do cuidado de Paulo. Dentre essas ações, ela lembra do controle no consumo de sal, da atividade física regular, do diagnóstico e manejo precoce do quadro de hipertensão arterial e, por fim, da otimização da terapia para controle da insuficiência cardíaca. Diante do caso, considerando a classificação de Leavell & Clark para a história natural da doença Insuficiência Cardíaca, assinale a alternativa correta.

- A A atividade física regular e o controle do consumo de sal são atividades de prevenção secundária.
- B O controle do consumo de sal e o diagnóstico precoce da hipertensão arterial são atividades de prevenção primária.
- C O diagnóstico precoce da hipertensão arterial e a otimização da terapia para insuficiência cardíaca são atividades de prevenção secundária.
- D A atividade física regular e a otimização da terapia para insuficiência cardíaca são, respectivamente, atividades de prevenção primária e terciária.
- E O controle do consumo de sal e o diagnóstico precoce da hipertensão arterial são, respectivamente, atividades de prevenção primária e terciária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167180](#)

#### Questão 10 **Prevenção Quaternária**

Sobre a prevenção quaternária, assinale a alternativa correta.

- A É uma forma direta e simples de detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo, para protegê-los de novas intervenções e sugerir alternativas eticamente corretas.
- B Propõe esquemas de imunização específicos para grupos etários e de necessidades especiais.
- C Propõe rastreamento de câncer de próstata com PSA a partir dos 45 anos de idade.
- D É uma forma de prevenção desenvolvida nos serviços hospitalares universitários ou de alta complexidade, denominados de hospitais quaternários.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166627](#)

#### Questão 11 **Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS**

Uma equipe de saúde da família atua em uma unidade básica de saúde situada na zona periférica de uma cidade com mais de 800 000 habitantes. No último mês, foi evidenciado aumento no número de casos de diarreia entre crianças de 2 a 5 anos que frequentam a creche pública de um bairro. A equipe de saúde da família desse local analisa que, no último ano, têm sido recorrentes os casos de diarreia entre crianças da área, inclusive, em alguns casos, com necessidade de internação hospitalar. Dentre os casos, observam que eles se concentram naquelas famílias que não são da área de cobertura da equipe de saúde da família. No bairro onde se localiza a creche, 20% dos domicílios possuem abastecimento de água tratada, 10% com esgoto sanitário, sem coleta regular de lixo nos domicílios, sendo os esgotos e lixos acumulados das casas ou jogados no córrego, a céu aberto, que corta o bairro.

Em relação à situação acima descrita, assinale a alternativa correta em relação ao processo saúde-doença e os determinantes de saúde envolvidos no caso.

- A** O aumento no número de casos de diarreia na creche tem como principal fator a virulência da bactéria e, por se tratar de um caso recorrente, a equipe de saúde da família poderia atuar com medidas medicamentosas profiláticas direcionadas ao agente etiológico.
- B** A educação em saúde na creche, com os profissionais da educação e com a comunidade, teria papel importante na melhoria das condições sanitárias da comunidade; é uma estratégia suficiente para o combate de surtos.
- C** A falta de acesso aos serviços de saúde e de acompanhamento regular com a equipe de saúde da família é um fator associado ao desfecho desfavorável dos casos, com aumento de quadros graves de diarreia com necessidade de internação hospitalar.
- D** A adoção de medidas como uso de hipoclorito na água e de filtros nos bebedores escolares é a principal medida para combate à transmissão dos agentes etiológicos que cursam com quadros de diarreia, diminuindo assim a incidência de casos na creche.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153172](#)

### **Questão 12** Promoção à Saúde x Prevenção de Doenças

Para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, a OMS recomenda que adultos de 18 a 64 anos de idade pratiquem:

- A** pelo menos 150 minutos por dia de atividade física aeróbica de intensidade leve ou 75 minutos por dia de atividade física aeróbica moderada ou combinação equivalente das intensidades.
- B** pelo menos 30 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa, ou 60 minutos por semana de atividade física aeróbica vigorosa ou combinação equivalente das intensidades.
- C** pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de atividade física aeróbica vigorosa ou combinação equivalente das intensidades.
- D** pelo menos 120 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou 60 minutos por semana de atividade física aeróbica vigorosa ou combinação equivalente das intensidades.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144737](#)

### **Questão 13** Prevenção Secundária

As intervenções preventivas para as doenças crônicas podem ter uma estratégia clínica ou comunitária, quando dirigidas diretamente aos indivíduos ou às comunidades/populações, respectivamente.

São exemplos de ações preventivas a nível secundário o(a):

- A** dosagem de glicemia de jejum em paciente obeso, mas assintomático.
- B** facilidade de transporte, lazer e trabalho para pessoas com amputação .
- C** estímulo à prática de atividades físicas na Academia Carioca em pessoa de risco .
- D** uso de sinvastatina para evitar doença cardiovascular em paciente com pré-diabetes.

4000133790

### **Questão 14** Prevenção Quaternária

Um adolescente de 17 anos procura a Unidade de Saúde da Família buscando um atestado de saúde para realização de prática esportiva. Com finalidade de identificar condições que poderiam levar à morte súbita durante a prática esportiva, a avaliação médica deve incluir a obtenção de uma história pessoal e familiar para a ocorrência de cardiopatias e um exame

físico detalhado, com ênfase na identificação de sopros e outras alterações cardíacas. Em relação a realização de exames subsidiários:

- A Deve ser solicitado um teste de esforço.
- B Deve ser solicitado um ecocardiograma.
- C Não devem ser solicitados exames subsidiários.
- D Deve ser solicitado um eletrocardiograma de 12 derivações.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110895](#)

#### Questão 15 **Prevenção Quaternária**

Considerando o conceito de prevenção à saúde, a expressão “primeiro não causar danos” se relaciona ao(à):

- A indicação de tratar todos os tipos de sintomas das pessoas
- B escolha de terapias alternativas como primeira opção
- C necessidade de fazer exames periódicos de rotina
- D uso da demora permitida sempre que possível

Essa questão possui comentário do professor no site [4000076916](#)

#### Questão 16 **Medicina Preventiva** **Processo saúde/doença** **Epidemiologia**

Das neoplasias abaixo, a que apresenta menos evidências que justifiquem sua inclusão nas estratégias de rastreio atual é:

- A Colo de útero.
- B Mama.
- C Cólon.
- D Pulmão.
- E Reto.

4000078114

#### Questão 17 **Medicina Preventiva** **Processo saúde/doença** **Epidemiologia**

Na divulgação de programas que pretendem abordar populações no intuito de diagnosticar infecção pelo HIV, a ação que deve ser considerada mais importante é:

- A Distribuição de preservativos.
- B Teste ELISA e Western Blot confirmatórios.
- C Serviço de aconselhamento pré e pós testagem.
- D Divulgação de informação a parceiros, familiares e pessoas vivendo com HIV.
- E Distribuição de antirretrovirais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000078063](#)

**Questão 18** Prevenção Secundária

Mulher de 50 anos realiza mamografia como triagem do câncer de mama. Esta forma de prevenção é

- A terciária.
- B primária.
- C secundária.
- D comunitária.
- E gênero específica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000078025](#)

**Questão 19** Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Sobre os conceitos de prevenção na prática clínica da atenção primária, é CORRETO afirmar que:

- A Diagnóstico precoce e rastreamento de doenças são exemplos de prevenção primária.
- B As imunizações sugeridas no calendário vacinal são exemplos de prevenção secundária.
- C O processo de reabilitação clínica dos pacientes acometidos por acidente vascular cerebral é um exemplo de prevenção quaternária.
- D A prevenção secundária consiste em um conjunto de ações para evitar que um indivíduo ou população adoeca devido a algum agravo ou patologia.
- E A prevenção quaternária consiste em um conjunto de medidas para evitar intervenções médicas invasivas em indivíduos sob efeito de supermedicalização.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000012647](#)

**Questão 20** Processo saúde-doença

Preocupadas com a prevenção e o controle de doenças, nos últimos anos a OMS e OPAS têm se empenhado em difundir novos referenciais clínicos para assistência na Atenção Primária, fundamentados em: assistência fortemente relacionada com promoção e prevenção clínica em saúde; foco em incapacidades individualizadas; informação, automanejo, recursos comunitários e proatividade da equipe. Qual o conceito que se relaciona com esses novos referenciais?

- A Comorbidades.
- B Condições crônicas.
- C Doenças crônicas.
- D Multimorbidades.
- E Saúde coletiva.

4000006272

**Questão 21** Prevenção Quaternária

Considerando a prevenção quaternária como um campo de intervenção, o médico deve aplicar as diretrizes da:



- A Medicalização de doenças.
- B Medicina baseada em evidências.
- C Saúde mental no campo da ansiedade.
- D Triagem para câncer de mama e próstata.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000070840](#)

**Questão 22**   **Cuidados paliativos**   **Prevenção Quaternária**

Na avaliação de demência em uma senhora de 78 anos e confirmado o diagnóstico de Alzheimer avançado, os cuidados paliativos e orientações aos familiares devem consistir em:

- A Colocar sonda entérica preventiva para alimentação artificial, uma vez que os distúrbios alimentares e da deglutição são frequentes nas fases tardias da demência, independente de no momento do diagnóstico a paciente ser capaz de se alimentar de forma adequada.
- B Educar a família e a equipe de saúde sobre o fim da vida, enfatizando que os pacientes nos estágios finais da doença podem não sentir sede e que umedecer as mucosas pode aliviar o ressecamento local.
- C Iniciar nutrição parenteral a partir do momento em que a paciente não esteja se alimentando por via oral, pois prevenirá complicações infecciosas e metabólicas, melhorando sua qualidade de vida.
- D Iniciar imediatamente antibioticoterapia caso haja presença de infecções respiratórias e a família orientada a internar a paciente para melhorar a qualidade de sua sobrevivência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000070820](#)

**Questão 23**   **Prevenção em Saúde**

A hipertensão arterial sistêmica é um grave problema de saúde pública no Brasil, atingindo em torno de 20% da população adulta. Isso significa que há, aproximadamente, 20 milhões de portadores de hipertensão no país. Estudos populacionais mostram que os fatores de risco estão fortemente presentes na população brasileira. Frente a essa situação epidemiológica, o país vem, há anos, desenvolvendo uma política de controle da hipertensão arterial sistêmica que apresenta gastos significativos e crescentes sem, contudo, produzir resultados sanitários satisfatórios, já que as taxas de mortalidade por hipertensão arterial sistêmica não apresentam tendência de queda.

Considerando as informações apresentadas, a conduta indicada para o combate à hipertensão arterial sistêmica é:

Disponível em: [www.conass.org.br](http://www.conass.org.br)



- A elaborar um plano de cuidado para cada portador de hipertensão arterial sistêmica através de ações rotineiras de promoção de saúde enfrentando os fatores de risco.
- B elaborar um plano de cuidado coletivo para a comunidade portadora de hipertensão arterial sistêmica por meio de ações rotineiras de promoção de saúde sem necessidade do enfrentamento dos fatores de risco.
- C centrar a atenção aos portadores de hipertensão arterial sistêmica no cuidado profissional prestado por médicos, não sendo necessária uma atenção multiprofissional, visto que, são estes profissionais responsáveis pelo manejo clínico do paciente.
- D Desenvolver programas de educação permanente para os médicos envolvidos nos cuidados de pacientes hipertensos, com o objetivo de reduzir altos investimentos em terapia medicamentosa.
- E ofertar um maior número de cirurgias cardíacas, o que se tornará uma nova solução para os pacientes hipertensos para uma melhor qualidade de vida.

4000026404

#### Questão 24 **Processo saúde/doença**

Sabe-se que a enfermidade em seres vivos existe na Terra desde antes da aparição do homem e que formas importantes de doenças se mantêm. O acompanhamento e o estudo dessas condições no decorrer do tempo indicam que:

- A a percepção de vida condiciona a percepção de saúde e de doença de cada indivíduo.
- B as patologias predominantes são as mesmas quando se comparam as classes sociais em um mesmo momento histórico.
- C as transformações no panorama patológico são pouco expressivas ao longo da história.
- D os resultados obtidos revelam-se inapropriados, pois não são randomizados.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000024170](#)

#### Questão 25 **Prevenção Secundária**

O uso de anticoagulantes, na trombose venosa profunda, para diminuir o risco de embolia pulmonar, é um exemplo de prevenção

- A primária.
- B secundária.
- C terciária.
- D quaternária.

4000023958

#### Questão 26 **Prevenção Quaternária**

O conceito de "primeiro não causar danos" é um dos fundamentos centrais de prevenção:

- A Primária.
- B Secundária.
- C Terciária.
- D Quaternária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000128034](#)

### Questão 27 Prevenção Quaternária


Um menino com 7 anos de idade é encaminhado à Unidade Básica de Saúde (UBS) pela escola devido ao fato de que ele não consegue aprender a ler, o que tem impactado o seu desempenho escolar no último ano. Segundo relato do psicólogo do colégio, suspeita-se que o menino tenha déficit de atenção. De acordo com o histórico familiar, a criança é um dos 3 filhos de um casal que mora em uma casa de dois quartos. A avaliação da Equipe de Saúde da Família revela que o comportamento do menino em casa é tranquilo, que ele apresenta concentração em suas atividades e brinca com seus irmãos; não troca letras; não troca fonemas; não esquece atividades corriqueiras. Ao médico da equipe, a criança refere não gostar da escola porque sua professora não gosta dele. O médico chama a professora à UBS e, juntamente com sua equipe, reestabelece um canal de diálogo entre a professora e o menino. Após 2 meses, a equipe recebe a notícia de que a criança está evoluindo bem na escola. O conjunto de medidas adotadas na condução desse caso insere-se como prevenção:

- A Quaternária.
- B Terciária.
- C Secundária.
- D Primária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000049623](#)

### Questão 28 Prevenção em Saúde

A figura abaixo apresenta a distribuição espacial dos casos de febre amarela confirmados e em investigação pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil até o dia 06 de abril de 2017, com início dos sintomas a partir de 1º de dezembro de 2016.



Considerando a situação epidemiológica da febre amarela apresentada nos mapas, no período analisado, assinale a opção correta no que se refere às mudanças nas áreas de recomendação de vacinação.

- A** Intensificação das estratégias de vacinação de forma seletiva nos estados de Minas Gerais e Paraná, anteriormente áreas sem recomendação de vacinação contra a febre amarela.
- B** Determinação do estado de São Paulo como área com recomendação temporária de vacinação, anteriormente uma área sem recomendação de vacinação contra a febre amarela.
- C** Intensificação da vacinação em municípios afetados pela febre amarela no estado do Rio de Janeiro, mantido como área com recomendação permanente de vacinação.
- D** Determinação da maioria dos municípios do estado do Espírito Santo como áreas indicadas para a recomendação temporária de vacinação contra a febre amarela.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000049385](#)

### Questão 29

**Prevenção Primária**

**História Natural das Doenças**

**Prevenção Terciária**

Os níveis de prevenção primária, secundária, terciária e quartenária são assim definidos, diferenciados e hierarquizados com base na(o):

- A** Complexidade das tarefas envolvidas.
- B** Incorporação tecnológica ao trabalho.
- C** História natural das doenças.
- D** Custo das tarefas envolvidas.
- E** Conhecimento médico necessário para o trabalho.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000029322](#)

### Questão 30

**Prevenção Primária**

**Prevenção Terciária**

**Prevenção Secundária**

O conceito de prevenção está ancorado em uma estrutura temporal linear que visa impedir acontecimentos futuros indesejáveis. De acordo com essa afirmação, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda (Tratado de Medicina de Família e Comunidade — princípios, formação e prática):

- (1) Prevenção primária;
- (2) Prevenção secundária;
- (3) Prevenção terciária.
- ( ) Imunização;
- ( ) Hidroterapia aquática;
- ( ) Teste de Guthrie;
- ( ) Consulta médica fisiátrica;
- ( ) Triagem auditiva neonatal.

- A 1 - 3 - 2 - 3 - 2.
- B 1 - 3 - 3 - 2 - 3.
- C 1 - 3 - 3 - 1 - 2.
- D 3 - 3 - 2 - 3 - 2.
- E 2 - 1 - 3 - 2 - 3.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000026151](#)

**Questão 31** Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Uma mulher de 45 anos de idade, história de diabetes e asma brônquica, estava internada no Hospital Municipal com quadro de pneumonia comunitária. Ao receber alta hospitalar foi orientada a procurar uma Unidade Básica de Saúde para solicitar administração de vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica). Qual o tipo de prevenção objetivada a partir da ação descrita?

- A Primária.
- B Secundária.
- C Terciária.
- D Quarternária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126652](#)

**Questão 32** Prevenção Primária Prevenção Primordial Prevenção Terciária

Segundo o modelo explicativo do processo saúde-doença de Leavell & Clark (1976), amplamente difundido na saúde pública até os dias de hoje, no período pré-patogênico, podem ser aplicadas as seguintes medidas preventivas:

- A Promoção de saúde e Limitação do dano.
- B Proteção específica e Tratamento imediato.
- C Promoção da saúde e Diagnóstico precoce.
- D Proteção específica e Diagnóstico precoce.
- E Promoção da saúde e Proteção específica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000031852](#)

**Questão 33** Prevenção Quaternária

Ação feita para identificar, um paciente, ou população em risco de supermedicalização, protegê-lo de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis. Esta afirmação refere-se a:

- ☐ A Prevenção primária à saúde.
- ☐ B Prevenção secundária à saúde.
- ☐ C Prevenção terciária à saúde.
- ☐ D Prevenção quaternária à saúde.
- ☐ E Promoção à saúde.

### Questão 34 Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Na História Natural do Sarampo, quanto à prevenção, constituem ações primárias em Saúde:

- A Vigilância em área de baixa incidência, educação sanitária e imunização.
- B Educação sanitária, testes laboratoriais e quimioterapia.
- C Isolamento, testes laboratoriais e educação sanitária.
- D Diagnóstico precoce, informe de casos e terapia ocupacional.
- E Isolamento, testes laboratoriais e educação sanitária.

**Questão 35**      Prevenção Terciária

Paciente do sexo masculino, com 45 anos de idade, é dependente químico de cocaína, com uso por via inalatória e procurou o serviço especializado do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) para tratamento. A oferta desse atendimento no Sistema Único de Saúde caracteriza ações de que tipo?

- ☐ A Prevenção primordial.
- ☐ B Prevenção quaternária.
- ☐ C Prevenção terciária.
- ☐ D Prevenção secundária.
- ☐ E Prevenção primária.

### Respostas:

[illegible]