

Questão 1 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Considere a descrição abaixo, referente a um reflexo evidenciado pelo pediatra ao examinar um recém-nascido.

Rodando a cabeça do RN para um dos lados, ocorre abdução e flexão do membro superior do lado occipital bem como abdução e extensão do membro superior do lado facial.

A descrição corresponde ao reflexo de

- ☐ A Moro.
- ☐ B Magnus e Kleijn.
- ☐ C Landau e Magnus.
- ☐ D Galant.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000177550](#)

Questão 2 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Acerca do desenvolvimento no primeiro ano de vida, assinale a alternativa correta.

- ☐ A No primeiro mês de vida, observa-se uma extensão generalizada dos membros, a hipotonia fisiológica.
- ☐ B A preensão palmar reflexa dura cerca de nove meses.
- ☐ C Aos dois meses, deve sustentar-se quando levantado pelos braços.
- ☐ D A mudança de decúbito ocorrer a partir do 6º mês de vida.
- ☐ E A preensão polegar-indicador (pinça) inicia-se por volta dos oito meses de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170604](#)

Questão 3 **Avaliando o desenvolvimento**

Uma lactente de 6 meses, sexo feminino, nascida com 30 semanas, ganho de peso satisfatório, em aleitamento materno exclusivo até o momento, é levada para consulta de puericultura. A mãe acredita que sua filha está com atraso do desenvolvimento. Ao exame físico, o médico nota que a criança não consegue ficar sentada sem apoio, mas sustenta a cabeça na posição sentada; leva as mãos à boca; ao encostar brinquedo na mão, ela o segura; não se apoia sobre os braços e ainda não rola. Diante desse quadro, assinale a conduta correta.

- ☐ A Orientar atividades de estímulo para os pais realizarem e reavaliar o desenvolvimento em 3 meses.
- ☐ B Encaminhar para atendimento multidisciplinar, pois apresenta sinais de alerta para atraso do desenvolvimento.
- ☐ C Tranquilizar a mãe quanto à ausência de atraso de desenvolvimento e manter acompanhamento de rotina.
- ☐ D Encaminhar para neuropediatria, para investigação da etiologia do atraso de desenvolvimento já notável nessa avaliação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169851](#)

Questão 4 **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor**

Leandro acabou de completar 3 anos de idade e veio à consulta de puericultura, acompanhado de sua mãe, Roseli, que não tem nenhuma queixa. Qual achado indicaria atraso de desenvolvimento neuropsicomotor?

- A Não é capaz de copiar o desenho de um círculo.
- B Não é capaz de emparelhar objetos da mesma cor.
- C Não pula com um pé só.
- D Não consegue copiar o desenho de uma cruz.
- E Não forma frases com 2 palavras.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169608](#)

Questão 5 **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor**

Antônio é um lactente de 10 meses de idade e a mãe o trouxe para uma consulta de rotina. A anamnese completa e ao exame físico para avaliação dos marcos do desenvolvimento, qual dos achados abaixo é preocupante e deve ser motivo de melhor investigação nessa idade?

- A A criança apresenta somente os dentes incisivos centrais inferiores e superiores
- B A criança assenta-se utilizando o tripé de pernas com uma mão apoiada e segura um objeto com a mão, mas sem conseguir passá-lo para a outra mão
- C A criança fica de pé com apoio, mas quando colocada no chão não engatinha em quatro apoios, arrastando-se
- D A criança reconhece a face da mãe ou cuidador e chora quando é afastado dos mesmos

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168722](#)

Questão 6 **Pediatria Avaliando o desenvolvimento**

Menino, 1 ano e 2 meses de idade, é acompanhado em puericultura na UBS desde o nascimento, apresentando crescimento e desenvolvimento adequados. Na consulta de hoje, a mãe mostrou-se preocupada, pois o filho fala pouco e ainda não anda sozinho, diferentemente da outra filha que nessa idade falava bastante e andava pela casa sozinha. Ao avaliar os marcos do desenvolvimento, o médico observou que o menino fica de pé com apoio e troca passos, faz movimento de pinça ao pegar uma “bolinha de papel”, aponta com o indicador quando quer um objeto e fala “papá, mamá, qué, dá, não”. Qual é o diagnóstico mais provável do desenvolvimento?

- A Atraso no desenvolvimento motor grosseiro; desenvolvimento motor fino e de linguagem dentro do esperado.
- B Atraso do desenvolvimento motor fino; desenvolvimento motor grosseiro e de linguagem dentro do esperado.
- C Atraso do desenvolvimento da linguagem; desenvolvimento motor grosseiro e motor fino dentro do esperado.
- D Desenvolvimento motor grosseiro, motor fino e de linguagem dentro do esperado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166292](#)

Questão 7 **DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor** **Pediatria**

Durante a consulta de um bebê de 2 meses de idade, nota-se que a mãe, ao trocar a fralda do bebê, fala com ele num linguajar infantilizado (“manhês”). Como esta atitude é considerada?

- A Desnecessária, pois nesta idade não é possível reconhecer a fala.
- B Adequada, por denotar um bom vínculo entre a mãe e a criança.
- C Prejudicial, porque é um estímulo para o desenvolvimento inadequado da fala.
- D Inadequada, porque a linguagem expressiva se manifesta próximo aos 12 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165589](#)

Questão 8 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria Marcos Importantes

Lactente, sexo feminino, 11 meses de vida, está em consulta ambulatorial de rotina. Trata-se de criança prematura, nascida de 35 semanas, com peso de nascimento de 2110 g, sem intercorrências durante o seguimento. Na consulta de hoje, a maior preocupação da mãe é que a criança não engatinha. Na avaliação realizada na consulta, notado que a criança imita a mãe ao bater palmas, faz movimentos de pinça para pegar objetos, reage a uma conversa como se estivesse respondendo, mas com sons incompreensíveis, sem falar nenhuma palavra. Ela fica em pé com apoio, mas realmente não engatinha quando colocada de bruços.

Qual das alternativas contempla, respectivamente, a avaliação do desenvolvimento e a conduta indicada?

- A O atraso do desenvolvimento é justificado pela prematuridade, orientar estimulação motora e retorno precoce.
- B O desenvolvimento motor está atrasado mesmo se considerada a prematuridade, encaminhar para seguimento com fisioterapia.
- C O desenvolvimento está compatível com o esperado para a idade, sem necessidade de nenhuma intervenção específica.
- D O desenvolvimento motor e de linguagem estão atrasados para a idade, iniciar investigação com eletroencefalograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165585](#)

Questão 9 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria

Um casal de adolescentes traz seu filho de 6 meses à Unidade de Saúde, preocupado se seu desenvolvimento está se dando de forma normal. O lactente nasceu a termo e está em aleitamento materno exclusivo. Ao examiná-lo, o médico orienta o casal em relação à aquisição de novas habilidades pelo bebê. Aos 6 meses, o que se espera que um lactente com desenvolvimento normal seja capaz de fazer?

- A Arrastar-se e dar "tchau".
- B Engatinhar e bater palmas.
- C Ficar em pé com apoio e falar ao menos 1 palavra com sentido.
- D Segurar um objeto com as duas mãos, levá-lo à boca e rolar no leito.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163675](#)

Questão 10 Pediatria Avaliando o desenvolvimento

Lactente, sexo masculino, 11 meses, é trazido à consulta e, segundo a mãe, não está fazendo as mesmas coisas que as outras crianças da sua idade. Ainda não caminha, balbucia, mas não diz nenhuma palavra, além de "mama" e "papa". Apresenta uma boa interação social com a mãe, se interessa pelos brinquedos que são colocados ao seu alcance e campo visual. Senta com apoio, engatinha pouco e, por poucos segundos, consegue ficar em pé, apoiado. História pregressa:

nasceu pré-termo de 35 semanas de gestação, pesando 2.230g. Não apresentou intercorrências no período perinatal e iniciou o aleitamento materno nas primeiras 24h de vida. A orientação adequada, nesse caso, é:

- A Encaminhar para avaliação neurológica com investigação de imagem e eletroencefalograma.
- B Investigar audição, encaminhar ao neurologista e iniciar tratamento fonoaudiológico imediato.
- C Iniciar intervenção com fisioterapia e terapia ocupacional, duas vezes na semana, e fazer revisão em um mês.
- D Investigar audição e transtorno do espectro autista, iniciar tratamento fonoaudiológico e terapia ocupacional.
- E Considerar defasagem normal dentro dos padrões esperados se corrigida a idade gestacional e reavaliar em um mês.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163578](#)

Questão 11 **Pediatria** **Marcos Importantes**

Em relação aos reflexos primitivos e posturais da criança, o reflexo presente em uma criança normal aos 3 anos de idade é:

- A reflexo de Moro.
- B reflexo de preensão plantar.
- C reflexo tônico-cervical assimétrico.
- D marcha automática.
- E reflexo do paraquedista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000163517](#)

Questão 12 **12 meses**

Uma lactente de 13 meses de idade, de sexo feminino, é levada à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. A mãe está preocupada, pois a criança ainda não é capaz de andar sem apoio. Não há outras queixas. O pré-natal materno não possui intercorrências; nasceu de parto normal, com 40 semanas de idade gestacional; Boletim de Apgar no 1º minuto = 6; no 5º minuto = 9; e no 10º minuto = 10; com peso ao nascer = 3 200 g e comprimento ao nascer = 50 cm. No exame clínico neonatal, observou-se estalido à manobra de Ortolani à direita; na ocasião, realizou exame ultrassonográfico de quadril apresentando resultado I pelo método de Graf. Recebeu alta no segundo dia de vida. Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Desenvolvimento neuropsicomotor prévio: sorriso social aos 2 meses; fixou o pescoço aos três meses; sentou sem apoio aos sete meses; passou a distinguir familiares de estranhos e a reconhecer seu nome aos nove meses; primeiras palavras com significado aos 11 meses. Atualmente engatinha, fica em pé com apoio das mãos e arrisca alguns passos sem apoio, mas logo cai; usa copo com ajuda, compreende ordens simples, bate palma, manda beijo, fala “mama” e “papa” para referir-se à mãe e ao pai respectivamente. Não apresenta alterações ao exame clínico. A conduta adequada para essa criança, considerando o desenvolvimento da marcha é

- A manter acompanhamento de rotina.
- B encaminhar para fisioterapia motora para membros inferiores.
- C encaminhar ao neurologista devido à anoxia perinatal.
- D encaminhar ao ortopedista por suspeita de displasia congênita do quadril.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153213](#)

Questão 13 **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Você atende na consulta de puericultura o paciente CAG, 4 meses de vida, sexo masculino. Criança nascida a termo, PN= 3140g, Comprimento= 50 cm, sem intercorrências na gestação, parto ou nascimento. Mãe realizou pré-natal completo e este é o 1º filho do casal, que foi muito desejado. Não há parentesco entre os pais, tampouco casos de doença mental ou deficiências na família. Criança em amamentação exclusiva. Mãe refere bom desenvolvimento neuropsicomotor.

Exame físico sem particularidades ou alterações fenotípicas.

Peso = 7500 g (Escore Z entre 0 e +2 – curva OMS)

Comprimento = 65 cm (Escore Z entre 0 e +2 – curva OMS)

Perímetro cefálico = 43 cm (Escore Z +1 – curva OMS)

Ao utilizar o instrumento de vigilância do desenvolvimento da caderneta da criança para faixa etária de 4 meses, você encontra:

Marcos de desenvolvimento	1	2	3	4	5
A - levantar a cabeça quando deitado	P				
B - segurar a cabeça quando sentado	P				
C - rolar do lado para o outro	P				
D - sentar sem apoio	P				
E - engatinhar		P			
F - andar com apoio			P		
G - andar sozinho				P	
H - subir e descer escadas					P
I - brincar com blocos de montar					P
J - fazer palavras simples					P

Baseado nestas informações sobre os marcos de desenvolvimento de acordo com a faixa etária de CAG, qual é a conduta mais adequada?

- ☐ A Referir a criança para avaliação neuropsicomotora, pois CAG apresenta provável atraso no desenvolvimento.
- ☐ B Orientar a mãe sobre a estimulação da criança e marcar retorno em 30 dias, pois CAG apresenta sinais de alerta para o desenvolvimento.
- ☐ C Informar a mãe sobre sinais de alerta pois, apesar de CAG apresentar desenvolvimento neuromotor adequado para idade ele também possui fatores de risco.
- ☐ D Elogiar e orientar a mãe para que continue estimulando CAG, com retorno segundo a rotina do serviço já que a criança apresenta desenvolvimento neuromotor adequado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000179889](https://www.4000179889.com.br/)

Questão 14 **Pediatria** **Avaliando o desenvolvimento**

Lactente do sexo masculino com 10 meses de idade, é avaliado na consulta de puericultura e, segundo a mãe, não está fazendo as mesmas coisas que as outras crianças da sua idade. Ainda não caminha, balbucia, mas não diz nenhuma palavra, além de “mama” e “papa”. Apresenta uma boa interação social com a mãe, se interessa pelos brinquedos que são colocados ao seu alcance e campo visual. Senta com apoio, engatinha pouco e, por poucos segundos, consegue ficar em pé, apoiado. História pregressa: nasceu pré-termo de 35 semanas de gestação, pesando 2.230g. Não apresentou intercorrências no período perinatal e iniciou o aleitamento materno nas primeiras 24h de vida.

A orientação adequada, nesse caso, é:

- A Considerar defasagem normal dentro dos padrões esperados se corrigida a idade gestacional e reavaliar em um mês.
- B Iniciar intervenção com fisioterapia e terapia ocupacional, duas vezes na semana e reavaliar em um mês.
- C Encaminhar para avaliação neurológica com investigação de imagem e eletroencefalograma.
- D Investigar audição, encaminhar para avaliação com neurologista e iniciar tratamento fonoaudiológico imediato.

4000179709

Questão 15 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor 6 meses Pediatria

Cristiane, mãe de Roberto e Rogério, gêmeos de 6 meses de idade, procura atendimento no PSF de seu bairro, porque ela notou que os meninos são diferentes e está muito preocupada. Informa que fez o pré-natal na unidade sem nenhuma intercorrência e não teve qualquer problema no parto. Rogério foi o primeiro a nascer, e logo nasceu Roberto. Ela diz que Rogério é muito esperto, sustenta a cabeça, consegue seguir as pessoas com o olhar, já senta com o apoio, segura brinquedos com as mãozinhas. Roberto sustenta a cabecinha apenas por alguns minutos, não senta mesmo apoiado, mas reage a som e é muito sorridente, consegue observar um rosto muito proximamente a sua mãozinha, mas não consegue segurar os brinquedos.

A partir dessas informações, qual a orientação a ser dada à mãe dos bebês?

- A Explicar à mãe que mesmo gêmeos podem ser diferentes.
- B Atendimento ambulatorial por conta do atraso no desenvolvimento dos gêmeos.
- C Dar o diagnóstico de um estado neurológico avançado.
- D Referência a uma avaliação neuropediátrica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126841](#)

Questão 16 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor 6 meses Pediatria

Uma lactente com 6 meses de idade é levada à consulta de Puericultura na Unidade Básica de Saúde. A mãe relata ter feito 9 consultas pré-natais e não ter apresentado intercorrências em sua gestação. Informa que a criança nasceu a termo, com peso de 3 kg e sem intercorrências. Não há relato de doenças na história patológica pregressa. A mãe refere que a criança está saudável e em aleitamento materno exclusivo. Na avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, o profissional observa que ela troca objetos de uma mão para a outra, sustenta bem a cabeça, rola com facilidade e fica sentada apenas quando se apoia nas mãos. Nessa situação, o médico deve comunicar à mãe que a criança apresenta

- A desenvolvimento neuropsicomotor adequado, devendo retornar segundo calendário de Puericultura.
- B desenvolvimento neuropsicomotor adequado, devendo ser estimulada e reavaliada em 30 dias.
- C um provável atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, devendo ser estimulada e reavaliada em 7 dias.
- D um provável atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo necessário encaminhá-la para avaliação pelo neurologista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126841](#)

Questão 17 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria Puericultura

Menino com 7 meses de idade é levado pela mãe a Unidade Básica de Saúde em consulta de Puericultura. A mãe está preocupada, pois acha que ele é mais lento que os irmãos. Após anamnese detalhada, o pediatra realizou o exame físico e

afirmou que o exame neurológico e o desenvolvimento neuropsicomotor estavam condizentes com a idade. O que o pediatra observou em relação a linguagem, motricidade, comportamento adaptativo e reflexos arcaicos, respectivamente, para fazer tal afirmação?

- A Emissão espontânea sem intenção imitativa; sustentação cefálica; dirige a mão para objetos; reflexo de Moro.
- B Emissão bissilábica significativa; engatinha durante a consulta; preensão palmar em pinça; reflexo de Landau II.
- C Emissão espontânea sem intenção imitativa; senta-se com apoio; preensão palmar voluntária; reflexo de Moro incompleto.
- D Ecolalia; senta-se sem apoio; muda objeto de uma mão para outra; reflexo de preensão plantar.
- E Emissão de palavras-frase; capacidade de andar com apoio observada na consulta; bate palmas; reflexo do paraquedista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127233](#)

Questão 18 Neonatal DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Puericultura

A avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) de uma criança no primeiro mês de vida deve conter os dados relacionados à postura, tono, força muscular e movimentação; à observação da reação da criança aos estímulos sonoros e luminosos, do choro, da amamentação e à pesquisa dos reflexos transitórios de um recém-nascido de 15 dias de vida, nascido de apresentação cefálica, quando examinado em decúbito dorsal, ao tentar retificar os membros superiores e inferiores e abrir as mãos, espera-se:

- A Resistência às manobras de retificação dos membros e nenhuma para a abertura das mãos.
- B Nenhuma resistência à retificação dos membros, porém as mãos persistem fechadas.
- C Resistência às manobras de retificação dos membros e da abertura das mãos.
- D Nenhuma resistência às manobras de retificação dos membros e da abertura das mãos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127042](#)

Questão 19 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria Avaliando o desenvolvimento

Uma equipe de Saúde da Família está em visita domiciliar e avalia uma criança de oito meses. O menino está corado, com peso e estatura adequados para a idade, fixa e acompanha objetos em seu campo visual, balbucia e, colocado de bruços, levanta a cabeça momentaneamente. Ainda não passa da posição lateral para a linha média, nem rola da posição supina para a prona. Levantado pelos braços, permanece passivo e não ajuda com o corpo. A mãe expressa preocupação porque o irmão mais velho, com a mesma idade, já sentava sem apoio.

A conduta correta no caso é

- A antecipar a consulta seguinte.
- B referir a criança para serviço de maior complexidade.
- C agendar visitas mais frequentes pelo Agente Comunitário de Saúde.
- D orientar a família a estimular a criança e a não deixá-la sempre em posição supina quando desperta.
- E tranquilizar a família e orientar para as diferenças normais de crescimento e desenvolvimento entre crianças, dentro da faixa de normalidade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000129289

Questão 20 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor **Pediatria**

Analise a figura abaixo.



Com base na figura, pode-se afirmar que o desenvolvimento motor da criança se processa no sentido

- A cefalocaudal e distal-proximal.
- B caudocefálico e próximo-distal.
- C caudocefálico e distal-proximal.
- D cefalocaudal e próximo-distal.
- E centrocaudal e cefalodistal.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000153810

Respostas:

1	B	2	E	3	C	4	E	5	B	6	D	7	B	8	C	9	D	10	E	11	E
12	A	13	B	14	A	15	D	16	A	17	D	18	C	19	B	20	D				