

**Questão 1** Traumatismos Oculares Oftalmologia

Um paciente com 25 anos de idade, soldador, procurou Unidade de Pronto Atendimento relatando que, durante seu ofício, retirou o protetor facial momentaneamente e foi atingido por "flash" ocasionado pelo equipamento de solda no olho direito. O médico clínico socorrista evidenciou apenas eritema conjuntival. O paciente refere, nesse momento, irritabilidade e "sensação de areia" nos olhos, sem perda da acuidade visual.

Nesse caso, a melhor medida a ser adotada pelo médico socorrista antes de encaminhar o paciente para avaliação especializada é

- ☐ A curativo oclusivo e compressivo.
- ☐ B oftalmoscopia e retirada de corpo estranho com pinça.
- ☐ C aplicação de colírio contendo antimicrobianos e corticoesteroides.
- ☐ D irrigação ocular com soro fisiológico a 0,9% em temperatura ambiente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176632](#)

**Questão 2** Conjuntivite Neonatal Neonatologia

Recém-nascido, sexo masculino, 19 dias de vida, está em consulta ambulatorial. Trata-se de recém-nascido de termo, parto vaginal hospitalar, mãe com 28 anos de idade, sem seguimento adequado no pré-natal. Nota-se edema palpebral bilateral, conjuntivas hiperemiadas e secreção ocular purulenta há um dia. Sem outras alterações significativas ao exame clínico. Qual é o diagnóstico mais provável?

- ☐ A Conjuntivite por clamídia.
- ☐ B Conjuntivite química por nitrato de prata.
- ☐ C Conjuntivite gonocócica.
- ☐ D Obstrução de ducto lacrimal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165599](#)

**Questão 3** Abrasões Corneanas

Um paciente com 23 anos de idade procurou atendimento em Unidade Básica de Saúde devido ao aparecimento de dor ocular intensa. Ele relatou ser soldador e que, no dia anterior, não utilizou seu equipamento de proteção durante sua atividade com a solda elétrica. Acredita que pode ter entrado corpo estranho nos olhos, por isso resolveu procurar atendimento. Na inspeção, apresentou lacrimejamento e fotofobia. A conduta imediata para esse paciente, antes do encaminhamento para consulta especializada, é

- ☐ A uso de colírio anestésico e oclusão com pomada oftálmica.
- ☐ B uso de colírio anestésico e de anti-inflamatório não esteroidal oral.
- ☐ C irrigação com soro fisiológico e oclusão com pomada oftálmica.
- ☐ D irrigação com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação de emergência.

**Questão 4** Queimaduras Químicas Oculares Corpo Estranho Corneano e Conjuntival

Homem, 40 anos de idade, refere acidente com água sanitária atingindo os olhos, quando estava limpando o banheiro de casa há 20 minutos. Exame físico: fácies de dor, edema palpebral e hiperemia conjuntival em ambos os olhos, com grande possibilidade da presença de resíduos de hipoclorito de sódio. Qual a conduta inicial mais adequada?

- A Encaminhar para avaliação oftalmológica de urgência.
- B Realizar neutralização do pH básico com ácido fraco.
- C Realizar lavagem copiosa de ambos os olhos com soro fisiológico 0,9%.
- D Prescrever lubrificante ocular de 6 em 6h e reavaliação em 7 dias.

4000144738

**Questão 5** Abrasões Corneanas

Criança de 6 anos foi acompanhar o pai no serviço de instalação de cerca na fazenda. Refere que bateu algo no olho esquerdo e sentiu correr uma “água quente”. Exame ocular: não realizado devido ao blefaro-espasmo à esquerda. Até o especialista chegar, a conduta é:

- A jejum, colírio, pomada de antibiótico, curativo compressivo e estudo da profilaxia antitetânica.
- B jejum, colírio de antibiótico de hora em hora sem necessidade de curativo e avaliação da profilaxia antitetânica.
- C dieta livre, pois provavelmente se trata de abrasão corneana superficial.
- D jejum, curativo oclusivo, repouso e avaliação da profilaxia antitetânica.

4000141619

**Questão 6** Conjuntivite Bacteriana Pediatria

Recém-nascido com três dias de vida é trazido à consulta no PS devido à secreção ocular mucopurulenta abundante, edema palpebral e conjuntival em olho esquerdo, além de adenopatia pré-auricular ipsilateral, iniciadas há 24 horas. Com base no quadro clínico apresentado, assinale a alternativa correspondente à etiologia mais provável:

- A Conjuntivite química
- B Doença de Behçet neonatal
- C Herpes vírus
- D Conjuntivite bacteriana hiperaguda
- E Conjuntivite alérgica

Essa questão possui comentário do professor no site 4000131006

**Questão 7** Conjuntivite Alérgica

Sobre as conjuntivites alérgicas na faixa etária pediátrica assinale a alternativa incorreta:

- A Pode ocorrer em qualquer época do ano.
- B Pode ter relação com outras doenças alérgicas como a rinite.
- C Deve-se sempre utilizar colírio com corticoide para tratamento.
- D O diagnóstico geralmente é clínico.

4000106293

#### Questão 8 Conjuntivite Neonatal

Assinale a alternativa correta sobre a conjuntivite neonatal:

- A A conjuntivite gonocócica apresenta secreção purulenta abundante, com formação de pseudomembranas e resolução espontânea.
- B A conjuntivite química ocorre após 24 horas de vida, geralmente após o uso do colírio de nitrato de prata, e ocasiona edema palpebral bilateral, hiperemia e lacrimejamento.
- C A conjuntivite por clamídia nem sempre é transmitida durante o parto, por isso o primeiro sinal é secreção conjuntival abundante com edema palpebral.
- D A conjuntivite herpética é unilateral e pode ser transmitida por contato direto com pessoas que apresentem herpes labial.

4000106268

#### Questão 9 Conjuntivite Neonatal

Recém-nascido de três dias de idade, nascido de parto domiciliar, deu entrada na emergência pediátrica com edema palpebral, conjuntivas avermelhadas, secreção ocular abundante. Selecione abaixo a opção terapêutica recomendada.

- A Pomada oftalmológica de tobramicina.
- B Eritromicina.
- C Ceftriaxona, dose única.
- D Limpeza ocular com soro fisiológico.
- E Ampicilina e gentamicina endovenosa.

4000032172

#### Questão 10 Obstrução Congênita do Ducto Nasolacrimal

Você atende um lactente de 6 meses, com queixa de “secreção ocular”. O pai descreve uma secreção amarelada que fez com que o olho da criança amanhecesse grudado nos últimos 3 dias. Ao exame, o bebê sorri, e você percebe secreção hialina unilateral e um pouco de secreção amarelada. A conjuntiva está branca. A criança fixa o olhar e segue sua mão 180°. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Dacriocistite.
- B Obstrução do ducto lacrimal.
- C Conjuntivite viral.
- D Conjuntivite por *Chlamydia trachomatis*.
- E Conjuntivite por *Neisseria gonorrhoeae*.

4000020914

#### Questão 11 Tracoma

Mãe comparece à unidade básica com paciente com 3 anos com história de conjuntivite recorrente há mais de 1 ano sem resposta ao uso de colírio com antibiótico. Sobre o caso assinale a alternativa correta.

- A O médico não pode descartar má adesão ao tratamento, e por isso deve prescrever novo colírio e solicitar que venha à UBS para que seja aplicada a medicação por um novo profissional da saúde.
- B Como não houve resposta, o paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista sem urgência.
- C Deve-se ser aventada hipótese de tracoma e realizada a notificação de caso suspeito, além do tratamento específico.
- D O médico deve iniciar antibioticoterapia via oral imediatamente com amoxicilina na dose 50 mg por kg ao dia em três tomadas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000039795](#)

#### Questão 12 Conjuntivite Viral

O aumento de casos de conjuntivite em algumas épocas do ano deve ser o foco de atenção dos profissionais de saúde. As medidas terapêuticas podem ser instituídas, inicialmente, pelo médico clínico geral da unidade de atendimento antes do encaminhamento ao especialista (quando avaliada necessidade). Dentre elas, estão:

- A Compressa com água fervida ou filtrada gelada ou soro fisiológico gelado, três a quatro vezes ao dia, durante quinze minutos. Prescrição de colírios corticosteroides ou antibióticos quando persistirem os sintomas.
- B Compressa com água fervida ou filtrada gelada ou soro fisiológico gelado, cinco vezes ao dia, durante trinta minutos. Prescrição de colírios corticosteroides ou antibióticos quando persistirem os sintomas.
- C Compressa com água fervida ou filtrada gelada ou soro fisiológico gelado, cinco vezes ao dia, durante trinta minutos. Prescrição de colírios de lágrimas artificiais, como o colírio de hipromelose, duas gotas seis vezes ao dia quando persistirem os sintomas.
- D Compressa com água fervida ou filtrada gelada ou soro fisiológico gelado, três a quatro vezes ao dia, durante quinze minutos, principalmente enquanto persistirem os sintomas.
- E Compressa com água fervida ou filtrada gelada ou soro fisiológico gelado, cinco vezes ao dia, durante trinta minutos. Nos casos de edema palpebral fornecer anti-inflamatórios hormonais sistêmicos e prescrição de colírios antibióticos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000022435](#)

#### Questão 13 Traumatismos Oculares

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às lesões traumáticas do globo ocular.

- ☐ A O olho torna-se amolecido devido à diminuição da pressão intraocular e a câmara anterior pode apresentar-se plana e rasa.
- ☐ B Se a ruptura ocorreu na face anterior do globo ocular, seu conteúdo pode ser visto sendo eliminado para fora do olho.
- ☐ C O principal objetivo no tratamento inicial da ruptura do globo ocular é a proteção do olho lesado para evitar lesões adicionais.
- ☐ D Devem ser retirados todos os corpos estranhos, tecidos ou coágulos antes da aplicação do curativo estéril de proteção.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000002419](#)

#### Questão 14 **Queimaduras Químicas Oculares**

Com relação às queimaduras químicas do globo ocular, assinale a alternativa INCORRETA.

- ☐ A As substâncias alcalinas precipitam as proteínas teciduais, o que resulta na formação de uma barreira natural contra uma penetração tecidual maior.
- ☐ B O tratamento inicial consiste em irrigação contínua e abundante. Não deve ser tentada a neutralização do agente químico lesivo.
- ☐ C O blefaroespasma costuma ser intenso e as pálpebras devem ser abertas manualmente durante a irrigação.
- ☐ D As substâncias alcalinas combinam-se com os lipídeos das membranas celulares, levando à sua destruição e à rápida penetração do agente cáustico, estendendo sua ação destrutiva a outros tecidos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000002358](#)

#### Questão 15 **Conjuntivite Gonocócica**

Em relação ao tratamento da conjuntivite gonocócica no recém-nascido:

- ☐ A É realizado pela instilação de nitrato de prata a 1% logo após o surgimento dos sinais da doença.
- ☐ B Devem ser feitas avaliações do acometimento sistêmico, incluindo coleta de hemocultura e de líquido cefalorraquidiano.
- ☐ C É feito com instilação de colírio de antimicrobianos sem uso associado de antibióticos sistêmicos.
- ☐ D É tratada com cloranfenicol em altas doses devido ao padrão de resistência atual do agente infeccioso.

[4000130177](#)

#### Questão 16 **Ruptura do Globo Ocular e Lesão Ocular Penetrante**

Homem, 23a, teve o olho esquerdo atingido por um fragmento de madeira. Ao exame físico, olho esquerdo: ferimento cortante na esclera com evidência de saída de humor aquoso.

A conduta antes da avaliação do especialista é:

- A Curativo protetor, sem compressão sobre o globo ocular.
- B Curativo compressivo e exame radiográfico de crânio.
- C Comprimir as bordas das feridas para rafia.
- D Pingar o ferimento e curativo compressivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130162](#)

#### Questão 17 **Corpo Estranho Corneano e Conjuntival**

Na coordenação do cuidado de situações oftalmológicas na APS, assinale a alternativa correta que o MFC deve referenciar a pessoa ao oftalmologista, após o primeiro atendimento e medidas iniciais.

- A Isadora, 23 anos, babá, com hiperemia conjuntival, fotofobia e lacrimejamento importantes há 4 dias, compatíveis com conjuntivite viral.
- B Antônio, 27 anos, indígena, com artrite assimétrica subaguda, uretrite não-gonocócica e conjuntivite reativa compatíveis com síndrome de Reiter.
- C Patrícia, 15 anos, estudante, com hiperemia conjuntival e secreção mucopurulenta importantes há 3 dias, além da visão turva, compatíveis com conjuntivite bacteriana.
- D José, 52 anos, marceneiro, com corpos estranhos (duas pequenas farpas de madeira) na córnea, desvio da pupila e redução da acuidade visual.
- E Marina, 53 anos, negra, com hemorragia conjuntival em limbo temporal direito, após pico hipertensivo sistêmico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000115826](#)

#### Questão 18 **Tracoma**

Um médico de uma unidade básica de saúde foi chamado pela direção de uma escola de ensino fundamental para avaliar algumas crianças que se apresentavam com os olhos vermelhos. A professora do 3º ano está preocupada com o número crescente de alunos que têm se queixado de dor, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento e dificuldade de olhar para ambientes claros. Dos 43 alunos da turma dessa professora, 10 já apresentaram as queixas. Ao examinar as crianças, chama atenção do médico a presença de triquíase com cicatriz na conjuntiva tarsal, hiperemia conjuntival importante e pouca secreção purulenta. Além da orientação sobre medidas de higiene e modo de transmissão do agente etiológico, a conduta nesse caso é:

- A Afastar do ambiente escolar as crianças que apresentam o problema e prescrever tobramicina 0,3% tópica com tratamento.
- B Prescrever medicamentos para alívio dos sintomas e aguardar resolução espontânea do problema nas crianças atingidas.
- C Realizar cultura para confirmação de agentes etiológicos e prescrever tobramicina 0,03% tópica para tratamento das crianças atingidas pelo problema.
- D Realizar tratamento coletivo com azitromicina 20 mg/kg de peso, por via oral, durante 3 dias e programar o controle de tratamento para as crianças atingidas pelo problema.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126891](#)

#### Questão 19 **Conjuntivites Anatomia do Aparelho Visual**

Sobre a conjuntiva do globo ocular, analise as afirmativas abaixo:

I - Constitui um tecido liso, flexível e avascularizado, que tem como função principal servir de barreira contra agressões exógenas, inclusive micro-organismos;

II - É uma membrana mucosa que reveste o globo ocular em sua superfície anterior e as pálpebras, superior e inferior, nas suas superfícies posteriores;

III - É um reservatório da secreção lacrimal e permite movimentação do globo ocular sem que o atrito entre em sua superfície lisa e a córnea cause dano para a mesma;

IV - Nas conjuntivites virais, o infiltrado celular é tipicamente de polimorfonucleares neutrófilos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- A I, II, III e IV.
- B II, III, e IV, apenas.
- C II e III, apenas.
- D I, apenas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126445](#)

#### Questão 20 Obstrução Congênita do Ducto Nasolacrimal

Um lactente de 4 meses de vida é trazido à consulta de Puericultura em Unidade Básica de Saúde. A mãe relata lacrimejamento persistente no olho esquerdo, desde o nascimento. Realizou tratamento para conjuntivite com colírio de tobramicina por três vezes nos últimos dois meses, sem melhoras. Ao exame físico, constatou-se lacrimejamento em olho esquerdo, com leve hiperemia conjuntival, sem secreção ou edema palpebral. A conduta adequada nesse caso é

- A coletar material para cultura.
- B indicar colírio antialérgico.
- C tratar com novo colírio antibiótico.
- D massagear a região nasolacrimal para desobstrução.

4000126590

#### Respostas:

1	D	2	A	3	C	4	C	5	D	6	D	7	C	8	D	9	C	10	B	11	C
12	D	13	D	14	A	15	B	16	A	17	D	18	D	19	C	20	D				