

Questão 1 Planejamento familiar

Uma paciente com 19 anos de idade, solteira, busca orientação médica em Unidade Básica de Saúde. Relata que teve duas gestações anteriores, sendo um parto a termo e um aborto, e que tem um filho vivo e saudável de 3 anos de idade. Informa que contraiu infecção pelo HIV há 2 anos e utiliza terapia antirretroviral há 6 meses. Está assintomática e sem sinais clínicos de patologias. Os exames de rotina mostram contagens de LT-CD4+ acima de 500 células/mm³ e carga viral indetectável. Ela refere início de um relacionamento com parceiro soropositivo de 35 anos de idade há 1 mês. Refere, ainda, que o parceiro tem dois filhos vivos saudáveis e que o casal não deseja ter filhos.

Nessa situação, está indicado

- ☐ A realização de laqueadura tubária associada ao uso de preservativo.
- ☐ B uso de anticoncepcional hormonal associado ao uso de preservativo.
- ☐ C uso do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre.
- ☐ D realização de vasectomia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176634](#)

Questão 2 Interações medicamentosas

Uma mulher com 25 anos de idade, casada, atendida em uma Unidade Básica de Saúde, queixa-se de sangramentos intermenstruais nos últimos meses. A paciente relata que mudou de contraceptivo hormonal oral (CHO) por sua própria iniciativa há 3 meses: usava CHO composto por etinilestradiol 35 mcg em associação com acetato de ciproterona 2 mg e mudou para CHO composto por etinilestradiol 20 mcg em associação com gestodeno 75 mcg. Ela tem como antecedentes relevantes ser multigesta (2 partos normais, o último há 3 anos) e apresenta quadro de convulsões tônico-clônicas controladas com o uso de anticonvulsivante fenitoína 300 mg ao dia.

Diante desse quadro clínico, a orientação que deve ser dada à paciente para corrigir o problema é

- ☐ A usar fármacos que reduzam o sangramento na fase dos sangramentos intermenstruais, por exemplo, anti-inflamatórios e/ou antifibrinolíticos.
- ☐ B voltar a fazer uso de CHO de dose maior, podendo ser o mesmo que usava antes (etinilestradiol 35 mcg em associação com acetato de ciproterona 2 mg).
- ☐ C inserir o Dispositivo Intrauterino (DIU), pois existe contraindicação ao uso de métodos hormonais estroprogestativos por via oral.
- ☐ D usar outro CHO com o progestógeno acetato de ciproterona, pois o gestodeno frequentemente se associa com maior risco de sangramentos intermenstruais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176629](#)

Questão 3 Planejamento familiar

A respeito da contracepção hormonal, assinale a afirmativa correta.

- A** O Índice de Pearl (IP) é o indicador mais utilizado para avaliar a eficácia do método. Entre os métodos disponíveis no Brasil, o Sistema Intrauterino (SIU) de Levonorgestrel apresenta um menor IP em relação ao implante subdérmico.
- B** Contraceptivos combinados orais podem ser classificados em monofásicos, quando a dose dos hormônios é idêntica em todas as pílulas da cartela; bi ou trifásicos, quando há variações de dose de estrogênio e progesterona ao longo do ciclo.
- C** O implante de progestagênio consiste em um bastão subdérmico único revestido por um polímero de etilenovinil acetato contendo 68mg de gestrinona.
- D** O anel vaginal pode ter efeito hepatotóxico, uma vez que o etinilestradiol e o etonorgestrel de sua composição têm o efeito de primeira passagem pelo fígado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000175349](#)

Questão 4 Planejamento familiar

Ana foi à consulta de enfermagem com a intenção de discutir métodos contraceptivos. Ela tem dezesseis anos de idade, GOP0, enxaquecas com aura, ocasionalmente, e adenoma hepático descoberto em exame ocasional. Considerando, nesse caso hipotético, os critérios de elegibilidade para contraceptivos hormonais da OMS de 2015 e o índice de Pearl dos métodos contraceptivos, o melhor método para Ana seria o(a)

- A** pílula de estrogênio e progestágeno.
- B** espermicida.
- C** dispositivo intrauterino de cobre 380a.
- D** tabelinha (Ogino-Knaus).
- E** injetável trimestral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170638](#)

Questão 5 Métodos hormonais combinados

Uma mulher de dezoito anos de idade iniciou as atividades sexuais com seu namorado e buscou um método contraceptivo, tendo preferência por anticoncepcional hormonal oral. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a escolha do método deve ser cuidadosa, porque

- A** o anticoncepcional oral combinado aumenta o risco de acidente vascular cerebral em mulheres com enxaqueca com aura.
- B** a presença de antecedente de infarto agudo do miocárdio em parente de primeiro grau contraindica o uso do anticoncepcional oral combinado.
- C** o DIU de levonorgestrel é uma boa opção para o controle de sangramento vaginal inexplicável.
- D** as pílulas de estrogênio isolado para mulheres com hipertensão, ainda que controlada (abaixo de 160 x 100 mmHg), estão contraindicadas.
- E** pílulas combinadas são contraindicadas para mulheres HIV positivas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170613](#)

Questão 6 Contraindicações

Mulher procura o ambulatório de planejamento familiar, pois deseja inserir DIU de cobre. Assinale qual das condições listadas seria contraindicação dessa aplicação.

- A NIC II de colo do útero.
- B Recém-operada de Ca de mama.
- C Portadora de mioma submucoso.
- D Nuliparidade.
- E Hipotireóideia em terapêutica com tiroxina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169969](#)

Questão 7 **Contraindicações**

Paciente de 38 anos procura atendimento para orientação em relação ao uso de anticoncepcionais orais combinados. História médica pregressa sem qualquer alteração, mas refere ser fumante, consumindo uma média de 20 cigarros por dia. Apresenta níveis na medida da pressão arterial, durante a consulta, de 140/90. Exame físico geral e ginecológico sem alterações. Traz exames de laboratório compatíveis com dislipidemia: CT: 260mg/dL, e LDL: 140mg/dL. A orientação médica é contraindicar o uso de contraceptivos hormonais orais combinados pelos critérios de elegibilidade da OMS, primariamente devido à:

- A Idade da paciente.
- B Tabagismo.
- C Níveis alterados de pressão arterial.
- D Dislipidemia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169547](#)

Questão 8 **Planejamento familiar**

Mulher de 38 anos, tabagista, referindo fluxo menstrual volumoso, nega comorbidades e deseja método contraceptivo da rede pública. No exame físico, PA 140/90 mmHg, IMC = 46,0 kg/m². Os exames atuais bioquímicos demonstram dislipidemia moderada, o ultrassom transvaginal mostra miomatose intramural com componente submucoso, o ultrassom de mamas mostra cistos mamários bilaterais, a citologia oncológica está normal. Qual opção mais adequada para contracepção disponível no serviço público (UBS)?

- A DIU (dispositivo intrauterino) de Cobre.
- B Contraceptivos hormonais orais combinados.
- C SIU (sistema intra-uterino de levonorgestrel - 20 ng/24h).
- D Acetato de medroxiprogesterona de depósito (injetável trimestral).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169287](#)

Questão 9 **Lei do planejamento familiar**

A lei nº 9263/1996. Lei do Planejamento Familiar, no capítulo I, artigo 10, fala sobre a permissão da esterilização voluntária da mulher. Sobre essa Lei é correto afirmar, exceto:

- A A esterilização voluntária da mulher é permitida em situação de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro conceito, testemunhado em um relatório escrito e assinado por 2 médicos.
- B Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização voluntária depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.
- C A esterilização cirúrgica em pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante autorização da família da mulher.
- D É vedada a esterilização cirúrgica durante o período de parto, aborto ou até o 42^a dia do pós parto ou pós aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade.

4000168908

Questão 10 Lei do planejamento familiar

Mulher, 19 anos, três gestações prévias, duas cesarianas a termos e um abortamento precoce, procura assistência na unidade básica de saúde, solicitando encaminhamento para realização de laqueadura tubária. Afirmar ser solteira, sem parceria fixa Vive com os dois filhos e a mãe em casa com quatro cômodos: dois quartos, uma cozinha e um banheiro. Tabagista, nega morbidades e faz uso irregular de contraceptivo hormonal combinado oral. Possui dois gatos e um cão de estimação. Considerando o contexto exposto e a Lei de Planejamento Familiar nº 9.263/1996, CORRETO afirmar que:

- A A solicitação da paciente não poderá ser atendida por não ser casada nem estar em união estável
- B Sua idade inferior a 25 anos e Impedimento legal à laqueadura tubária
- C A paciente poderá realizar a laqueadura tubária, se for respeitado o prazo de seis meses entre a manifestação da vontade e a realização do ato operatório
- D A laqueadura tubaria solicitada pela paciente poderá ser atendida por ela já possuir uma prole constituída

4000168737

Questão 11 Adolescentes

Uma adolescente de 16 anos pede para que sua mãe dê licença, durante a consulta, para que ela tire algumas dúvidas com seu pediatra. Após a mãe se retirar, a paciente conta que iniciou a vida sexual com seu namorado e que gostaria de usar anticoncepcional oral (ACO), mas sem que sua mãe saiba. Nesse caso, qual das seguintes opções é a conduta mais adequada do médico quanto à prescrição de anticoncepcional oral?

- A O sigilo médico, nessa situação, pode ser quebrado, uma vez que a paciente está sob risco de engravidar ou de contrair infecção sexualmente transmissível.
- B O pediatra pode prescrever o ACO, mas somente com o consentimento da mãe.
- C O pediatra pode prescrever o ACO, mas, após a consulta, deve comunicar sua conduta à mãe, em segredo.
- D O pediatra pode prescrever o ACO, respeitando a vontade da paciente em manter o assunto em sigilo.
- E O pediatra deve conversar sobre opções contraceptivas, mas não deve prescrever ACO, por se tratar de adolescente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167147

Questão 12 Planejamento familiar

Mulher, 40 anos de idade, nuligesta, iniciou vida sexual recentemente e gostaria de método contraceptivo. Refere

enxaqueca sem aura e convulsões há 5 anos e faz uso de topiramato diariamente. Qual dos métodos contraceptivos indicados é considerado categoria 3, para a paciente em questão, segundo a Classificação da OMS?

- A Desogestrel via oral.
- B Etonogestrel subcutâneo.
- C Medroxiprogesterona intramuscular.
- D Levonorgestrel intrauterino.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166246](#)

Questão 13 Planejamento familiar

Uma mulher com diagnóstico recente de epilepsia iniciou uso de carbamazepina. Solicita orientação quanto ao uso do anticoncepcional.

De acordo com os métodos disponíveis no Brasil e de acordo com os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde, assinale a alternativa com a melhor opção (recomendação 1).

- A Implante contraceptivo
- B Contraceptivo transdérmico
- C Dispositivo intrauterino de cobre
- D Anticoncepcional oral combinado
- E Contraceptivo hormonal vaginal

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164700](#)

Questão 14 Planejamento familiar

Primípara puerpera teve parto vaginal há 1 semana. Gostaria de fazer uso de método contraceptivo. Está em aleitamento materno. O método contraceptivo que deve ser prescrito para ela, dentre as opções abaixo, é

- A DIU hormonal.
- B implante subcutâneo.
- C DIU de cobre.
- D injetável mensal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164426](#)

Questão 15 Contracepção de emergência

Mulher de 24 anos comparece à consulta, relatando relação sexual desprotegida há 48 horas, quando se encontrava no 9º dia do ciclo menstrual. Refere ciclos menstruais regulares com intervalos de 30 dias. Não utiliza contraceptivo hormonal, por ter história familiar de tromboembolismo. Deseja saber se pode utilizar contraceptivo hormonal de emergência. A recomendação é:

- A não iniciar, pois deveria ter sido utilizado em até 24 horas após a relação
- B iniciar na época prevista para ovulação, entre o 14º e o 15º dia do ciclo
- C iniciar o mais cedo possível, durante as próximas 24 horas
- D não iniciar, pois há história familiar de tromboembolismo

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164076](#)

Questão 16 Métodos hormonais combinados

Uma mulher de 30 anos de idade busca orientação ginecológica quanto ao uso de método contraceptivo. O motivo principal da troca é o sangramento irregular nos últimos 6 meses e a mulher não quer correr o risco de engravidar. Gesta 2; abortos 0. Nega comorbidades. Atualmente em uso de contraceptivo oral combinado (15 mcg de etinilestradiol e 60 mcg de gestodeno).

Diante do caso apresentado, o profissional de saúde deve

- A trocar o método por um anticoncepcional injetável trimestral.
- B iniciar pílula de desogestrel 75 mcg após 1 mês de intervalo.
- C interromper o método por 3 meses e reiniciar o mesmo esquema.
- D trocar por compostos com doses mais elevadas de estrogênio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153223](#)

Questão 17 Implante subdérmico

Paciente de 32 anos procura o ambulatório de Planejamento Familiar porque deseja orientação quanto ao implante de progesterona. Tem 1 filho de parto normal, ciclo menstrual regular, sem comorbidades.

Qual o principal efeito adverso deste método?

- A Cefaleia.
- B Amenorreia.
- C Ganho de peso.
- D Irregularidade menstrual.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000151627](#)

Questão 18 Contraindicações

Uma mulher com 38 anos de idade, com crises de enxaqueca com aura, realizou encontros de planejamento familiar, desejando utilizar anel vaginal combinado ou dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel como método contraceptivo. A orientação sobre esses métodos em relação à enxaqueca dessa paciente é que

- A o anel vaginal é contraindicado, mas o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel é adequado.
- B o anel vaginal é adequado, mas o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel é contraindicado.
- C o anel vaginal e o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel são contraindicados.
- D o anel vaginal e o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel são adequados.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146547](#)

Questão 19 **Lei do planejamento familiar**

Hoje, com os relacionamentos mais instáveis e a procura por novos relacionamentos e novas famílias, abre-se espaço para novas gestações, as quais podem ser impedidas por uma laqueadura ou uma vasectomia. Quanto aos critérios para ligadura tubária no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A Pode ser feita em mulheres com 1 filho vivo, que deve ter mais de 2 anos de idade.
- B Pode ser feita em mulheres com mais de 25 anos de idade.
- C Pode ser feita em menores de 18 anos, com consentimento dos pais, mesmo sem filhos.
- D Confere um índice de falha de 0,1 (1 em 1 000 pacientes).
- E Confere índice de falha menor do que a vasectomia.

4000146354

Questão 20 **Contraindicações**

Paciente de 23 anos comparece à consulta solicitando início do uso de contracepção. A mesma refere enxaqueca com aura em acompanhamento com neurologista há 3 anos. Dentre as opções abaixo qual a MENOS APROPRIADA para essa paciente?

- A Etinilestradiol 20mcg e levonorgestrel 100mcg diários.
- B Acetato de medroxiprogesterona 150mg trimestral.
- C Dispositivo intrauterino de cobre por 10 anos.
- D Desogestrel via oral contínuo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146190](#)

Questão 21 **Inserção**

Mulher, 24 anos de idade, nuligesta, deseja de inserção de dispositivo intrauterino (DIU) para contracepção. Qual procedimento é indispensável para a inserção do dispositivo?

- A Colposcopia
- B Ultrassonografia transvaginal
- C Citologia oncótica de colo uterino
- D Toque bimanual

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146004](#)

Questão 22**Contraindicações****Contraindicações****Contraindicações**

Mulher, 37 anos de idade, iniciou novo relacionamento e vem para consulta desejando iniciar método contraceptivo. Tabagista de 1 maço de cigarro por dia, sem comorbidades prévias. Pressão arterial: 120 x 70 mmHg, IMC: 27 kg/m², exame ginecológico sem alterações. Ultrassonografia transvaginal com útero bicornú. Qual é o método indicado?

- A Anel vaginal
- B Anticoncepcional hormonal oral combinado
- C Método de barreira
- D Adesivo transdérmico

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146002](#)

Questão 23**Contraindicações**

A contracepção com dispositivo intrauterino de cobre é contraindicada na seguinte situação:

- A mulher infectada pelo vírus da imunodeficiência humana
- B sangramento uterino anormal de etiologia desconhecida
- C adolescente nuligesta
- D pós-parto imediato

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145828](#)

Questão 24**Índice de Pearl**

Paciente com 20 anos, Gesta 0, procura o ambulatório de Planejamento Familiar para orientação contraceptiva. Informa início da vida sexual aos 15 anos, com uso regular de condom desde então. Durante o processo de educação em saúde para escolha do método contraceptivo, relata que obteve informações acerca dos métodos considerados de primeira linha em eficácia contraceptiva e que desejaria fazer uso de um deles, caso não houvesse contraindicação. Os métodos que preenchem os critérios de eficácia manifestados pela paciente e que poderiam ser usados por ela são

- A progestogênio oral, progestogênio injetável, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel.
- B contraceptivo hormonal oral combinado, anel vaginal, adesivo transdérmico
- C DIU de cobre, progestogênio injetável, adesivo transdérmico.
- D DIU de cobre, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, implante subdérmico de progestogênio.
- E progestogênio oral, progestogênio injetável, implante subdérmico de progestogênio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145703](#)

Questão 25**Critérios de elegibilidade da OMS**

Paciente no menacme com desejo de anticoncepção procura a Unidade Básica de Saúde referindo ser portadora de cardiopatia, tendo histórico de endocardite bacteriana e cursando atualmente com hipertensão pulmonar severa. Considerando os critérios médicos de elegibilidade da OMS para uso dos métodos anticoncepcionais, essa paciente **NÃO** deve utilizar:

- A Implante de Etonogestrel.
- B Anticoncepcional Injetável de Progesterona.
- C Preservativo.
- D Anticoncepcional Hormonal Oral Combinado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000142330](#)

Questão 26 **Contraindicações**

Paciente ASP, 25 anos, chega ao ambulatório de anticoncepção para iniciar método contraceptivo adequado, pois refere que há seis meses apresentou quadro de trombose estando internada por sete dias em unidade de terapia intensiva. O método de escolha para essa paciente é:

- A Anticoncepcional hormonal oral combinado.
- B Dispositivo intrauterino de cobre.
- C Anticoncepcional hormonal oral com progestágeno.
- D Dispositivo intrauterino hormonal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127867](#)

Questão 27 **Complicações pósinserção** **Gravidez em usuárias de DIU**

Durante o renascimento moderno do DIU, diversas melhorias resultaram em métodos mais seguros e efetivos. Apesar do custo inicial maior, sua ação efetiva prolongada resulta em relação custo/efetividade competitiva quanto a outras formas de contracepção. Ainda há alguns efeitos colaterais indesejados, assim como equívocos acerca de seu uso.

Sobre a temática, analise as assertivas.

I - Pacientes com DIU intra- abdominal, fora do útero pode causar dano. Identificado por laparoscopia, o dispositivo inerte pode ser removido no mesmo procedimento.

II - Pacientes grávidas e com DIU, a identificação precoce da gestação é importante. Se até antes da 14ª semana de gestação, com a extremidade final do dispositivo visível no colo uterino, deverá ser mantido.

III - Se a extremidade final do DIU não estiver visível, as tentativas de localização e remoção do dispositivo não resultam em perda da gestação.

Está correto o que se afirma em

- A I e II, apenas.
- B I, apenas.
- C III, apenas.
- D II e III, apenas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127967](#)

Questão 28**Critérios de elegibilidade da OMS****Anticoncepção hormonal apenas com progesterona****Orais**

Uma mulher com 36 anos de idade, Gesta 2 Para 2, procura a Unidade Básica de Saúde solicitando informações para utilização de método contraceptivo. Está assintomática, faz acompanhamento médico regular e apresenta resultado normal de citologia cervicovaginal colhida há 2 meses. Registra-se, como antecedente, colecistectomia há 2 anos, que cursou com trombose venosa profunda no membro inferior direito no pós-operatório. A paciente relata que, atualmente, não faz uso de qualquer medicação e nega tabagismo e outras doenças. Uma opção contraceptiva adequada para essa paciente é o uso de anticoncepcional à base de:

- A Etinilestradiol 50 mcg, por via oral, mensal.
- B Noretisterona 0,35 mg, por via oral, de uso contínuo.
- C Etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 0,15 mg, por via oral, mensal.
- D Enantato de noretisterona 50 mg + valerato de estradiol 5 mg, injetável, mensal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126927](#)

Questão 29**Critérios de elegibilidade da OMS****Tabela dos critérios de elegibilidade OMS**

Paciente de 35 anos, nuligesta, tabagista há 5 anos, 20 cigarros por dia. Procurou a UBS para fazer a coleta de colpocitologia e estava interessada em receber orientação anticoncepcional. Considerando o caso, o médico orientou a opção mais segura:

- A DIU e SIU de levonorgestrel apresentam contraindicações em fumantes.
- B Compostos apenas por progestagênios estão liberados (categoria 1 da OMS).
- C Métodos hormonais combinados sem cautela (categoria 2 da OMS).
- D O injetável combinado mensal recebe categoria 3 da OMS.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126958](#)

Questão 30**Contraindicações****Dispositivos intrauterinos**

Uma paciente de 20 anos de idade, Gesta 2 Para 1 Aborto 1, procura atendimento médico para orientação quanto à contracepção. Desde os 8 anos de idade tem diagnóstico de epilepsia de difícil controle, estando atualmente em uso de carbamazepina (1.000 mg/dia) e ácido valpróico (1.500 mg/dia). Diante desse quadro, seria mais recomendado

- A o dispositivo intrauterino.
- B a laqueadura tubária bilateral.
- C o diafragma com geleia espermicida.
- D a anticoncepção hormonal combinado de baixa dosagem.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126623](#)

Questão 31**Adolescentes**

Uma adolescente com 15 anos de idade, com menarca aos 12 anos, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde porque deseja usar anticoncepcional combinado oral (ACO). Iniciou atividade sexual há seis meses e teme uma gravidez indesejada. Está menstruada no dia da consulta. Nega comorbidades ou uso de medicações. Qual a conduta correta para a paciente?

- A Orientar uso de camisinha apenas.
- B Prescrever ACO e orientar uso de condom.
- C Não prescrever ACO, pois a paciente é menor de idade.
- D Orientar que a paciente venha à consulta acompanhada da mãe.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126789](#)

Questão 32 Lei do planejamento familiar

Uma mulher com 27 anos de idade apresenta o seguinte histórico: gestação = 3, parto = 1 (vaginal), aborto = 1 (provocado). A paciente, com gestação de 28 semanas, está realizando acompanhamento pré-natal em Unidade Básica de Saúde, sem intercorrências. Esta é a primeira consulta com o médico. No prontuário constam os seguintes registros do atendimento com a enfermeira: trata-se de gestação não planejada e indesejada; a gestante manifestou desejo de ser submetida a laqueadura tubária por ocasião do parto desta gestação. A paciente relata relacionamento fixo, mas conturbado, com o pai de seu único filho. Nega violência física ou sexual. Considerando as questões ético-legais envolvendo o planejamento familiar, a conduta indicada para a paciente é:

- A apresentar o caso à Secretaria de Saúde para avaliação e sua consideração na decisão final.
- B agendar consulta conjunta para o casal, com o objetivo de apresentar todos os métodos contraceptivos disponíveis.
- C orientar que a paciente informe na maternidade, por ocasião da admissão para o parto, sobre seu desejo de ser submetida à laqueadura.
- D encaminhar para o serviço de Obstetrícia de referência, devido ao risco obstétrico desta gestação e da especificidade da solicitação.

4000126777

Questão 33 Critérios de elegibilidade da OMS

Nos critérios de elegibilidade da OMS para uso de método anticoncepcional, na categoria 2 se enquadram os métodos que:

- A podem ser usados, pois as vantagens superam possíveis riscos.
- B não devem ser usados, já que os riscos superam os benefícios.
- C são de última escolha, pois necessitam acompanhamento rigoroso.
- D podem ser usados sem restrições e o acompanhamento é o habitual.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126730](#)

Questão 34 Métodos hormonais combinados Anticoncepção hormonal apenas com progesterona

Em relação aos efeitos metabólicos dos componentes dos anticoncepcionais orais, está comprovado que

- A os progestagênios diminuem a resistência à insulina.
- B o etinil-estradiol reduz a albumina hepática.
- C os progestagênios aumentam o HDL-colesterol.
- D o etinil-estradiol reduz o colesterol total.
- E o etinil-estradiol reduz os fatores de coagulação VII e XII.

4000153865

Questão 35 **Inserção**

Uma mulher puerpéra de 29 anos, gesta = 5, para = 5, último parto há 2 meses, procura o Posto de Saúde para fazer planejamento familiar. A paciente é casada e informa ter apenas um parceiro sexual. Além disso, nega história de hipertensão, diabetes ou doenças sexualmente transmissíveis. A paciente está assintomática por ocasião dessa consulta. Após as reuniões de orientação reprodutiva, a paciente optou pela inserção do dispositivo intrauterino.

Nesse caso, que procedimento deve ser realizado antes do início do uso desse método?

- A Colposcopia.
- B Ultrassonografia transvaginal.
- C Exame pélvico especular e toque bimanual.
- D Coleta de citologia cérvico-vaginal preventiva.
- E Triagem para doenças sexualmente transmissíveis: anti HIV e VDRL.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000129309](#)

Questão 36 **Sigilo profissional em crianças e adolescentes Parecer CFM n 25 de 2013 Adolescentes**

Uma adolescente com idade de 14 anos procura uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para a sua primeira consulta ginecológica, pois deseja usar anticoncepcional oral. Ela iniciou atividade sexual há 6 meses e refere menarca aos 11 anos de idade e ciclos regulares. A adolescente nega comorbidades e diz, ainda, que os pais não sabem do início da atividade sexual. Qual a conduta mais adequada frente ao caso relatado acima?

