

## Cálculo Diferencial - Actividad 1

Resolver los siguientes ejercicios de forma analítica y comprobar los resultados con MAPLE.

1. Dado  $f(x) = x^3 - 10x^2 + 31x - 30$  demuestre que:

(a)  $f(0) = -30$

(b)  $f(2) = 0$

(c)  $f(3) = f(5)$

(d)  $f(1) > f(-3)$

(e)  $f(-1) = -6f(6)$

(f)  $f(y) = y^3 - 10y^2 + 31y - 30$

(g)  $f(a) = a^3 - 10a^2 + 31a - 30$

(h)  $f(yz) = y^3z^3 - 10y^2z^2 + 31yz - 30$

(i)  $f(x-2) = x^3 - 16x^2 + 83x - 140$

2. Si  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  encuentre:

(a)  $f(0)$

(c)  $f(-\frac{1}{2})$

(a) \_\_\_\_\_

(c) \_\_\_\_\_

(b)  $f(-1)$

(d)  $f(1\frac{1}{3})$

(b) \_\_\_\_\_

(d) \_\_\_\_\_

3. Si  $f(x) = x^3 - 10x^2 + 31x - 30$  y  $\phi(x) = x^4 - 55x^2 - 210x - 216$  demuestre que:

(a)  $f(2) = \phi(-2)$

(c)  $f(5) = \phi(-4)$

(b)  $f(3) = \phi(-3)$

(d)  $f(0) + \phi(0) + 246 = 0$

4. Si  $F(x) = 2^x$ , encuentre:

(a)  $F(0)$

(c)  $F(\frac{1}{3})$

(a) \_\_\_\_\_

(c) \_\_\_\_\_

(b)  $F(-3)$

(d)  $F(-1)$

(b) \_\_\_\_\_

(d) \_\_\_\_\_

5. Dado  $F(x) = x(x-1)(x+6)(x-\frac{1}{2})(x+\frac{5}{4})$ , demuestre que:

(a)  $F(0) = F(1) = F(-6) = F(\frac{1}{2}) = F(-\frac{5}{4}) = 0$

6. Si  $f(m_1) = \frac{m_1-1}{m_1+1}$  demuestre que:

$$\frac{f(m_1) - f(m_2)}{1 + f(m_1)f(m_2)} = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2}$$

7. Si  $\phi(x) = a^x$  demuestre que  $\phi(y) \cdot \phi(z) = \phi(y+z)$

8. Dado  $\phi(x) = \log \frac{1-x}{1+x}$  demuestre que:

$$\phi(x) + \phi(y) = \phi\left(\frac{x+y}{1+xy}\right)$$

9. Si  $f(\phi) = \cos \phi$ , demuestre que:

$$f(\phi) = f(-\phi) = -f(\pi - \phi) = -f(\pi + \phi)$$

10. Si  $f(x) = \frac{2x-3}{x+7}$ , encuentre  $f(\sqrt{2})$ .