

# • EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

## ▲ FORMA GENERALE:

$$E(y, y', \dots, y^{(k)}, t) = 0 \quad t \in I$$

↳ VARIABILE INDIPENDENTE

## ALTRE NOTAZIONI, PER FUNZIONI DERIVATE


$$y' = \frac{dy}{dt} \quad y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} \quad y^{(k)} = \frac{d^k y}{dt^k}$$

• UNA SOLUZIONE È UNA  $y$  CHE SODDISFA L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE

### DEFINIZIONE RIGOROSA:

SIA  $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$      $\Omega$  "APERTO"

APERTO =  $\forall x \in \Omega$ , ESISTE UN DISCO CENTRATO IN  $x$  TUTTO CONTENUTO IN  $\Omega$   
 $D_x \subset \Omega$



UNA  $y: I \rightarrow \mathbb{R}$  È SOLUZ. SE

- $y$  È DERIVABILE SU  $I$
- $(x, y(x)) \in \Omega$ ,  $\forall x \in I$
- $y'(x) = f(x, y)$   $\forall x \in I$

• L'ORDINE È L'ORDINE MASSIMO DELLE DERIVATE COINVOLTE NELL'EQUAZIONE

• NON TUTTE LE EQ. DIFFERENZIALI HANNO SOLUZIONE IN GENERALE CI DOBBIAMO CHIEDERE (SULLA SOLUZIONE):

- ESISTENZA
- UNICITA'
- MOLTIPLICITA'
- SOLUZIONI ESPLICITE (CIOÈ SVOLGIMENTO & RICERCA)

• ESEMPIO NOTEVOLE: MALTHUS ( $y' = ky$ )

- HA SOLUZIONE  $y = C \cdot e^{kt}$  (TROVATA MOLTIPL. PER  $e^{-kt}$ )
- QUESTA  $y$  INGLOBA TUTTE LE SOLUZIONI POSSIBILI

## ► PROBLEMA DI CAUCHY

SELEZIONA UNA SOLUZIONE PARTICOLARE CON UNA CONDIZIONE INIZIALE

ES: 
$$\begin{cases} y' = f(x, y) & \text{EQ. DIFF.} \\ y(0) = 1 & \text{CONDIZ. INIZIALE} \end{cases} \quad \begin{cases} y' = f(x, y) & (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \\ y(x_0) = y_0 & \text{NOTI} \end{cases}$$

UNA CERTA  $y$  È SOLUZIONE SE:

- $y = y(x)$  soddisfa  $y' = f(x, y)$  su QUALCHE INTERVALLO
- $x_0 \in I$
- $y(x_0) = y_0$

## ► EQ. DIFFERENZIALE DI PRIMO ORDINE IN FORMA NORMALE

(1)  $y' = f(x, y)$       COEFF.  $y'$  SEMPRE 1

$\downarrow$        $\searrow$   
 VARIABILE      FUNZ.  
 INDIPENDENTE      INCOGNITA

## ► TEOREMA FONDAMENTALE CALCOLO INTEGRALE RIVISITATO

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall x \in [a, b] \quad \text{CONTINUA}$

$y(x) := \int_{x_0}^x f(t) dt + y_0, \quad \forall x \in [a, b]$

È SOLUZIONE UNICA DEL PC

- DIM IMMEDIATA:  $\left( \int_{x_0}^x f(t) dt + y_0 \right)' = y'(x) = f(x) \quad (\checkmark)$

$\wedge \quad y(x_0) = \underbrace{\int_{x_0}^{x_0} f(t) dt}_0 + y_0 \Rightarrow y(x_0) = y_0$

- DIM UNICITÀ

SUPPONGO  $\begin{cases} y_1' = f(x) \\ y_1(x_0) = y_0 \end{cases} \quad \wedge \quad \begin{cases} y_2' = f(x) \\ y_2(x_0) = y_0 \end{cases}$

SOTTRAGGO

$\begin{cases} (y_1 - y_2)' = f(x) - f(x) = 0 \\ (y_2 - y_1)(x_0) = y_0 - y_0 = 0 \end{cases} \quad \wedge \quad M = y_1 - y_2 \Rightarrow \begin{cases} M' = 0 \\ M(x_0) = 0 \end{cases}$

CIOÈ:

$M(x) = c \quad \begin{cases} M' = 0 & \text{solo con } f \text{ costante} \\ \text{QUINDI } c = 0 & \forall x \in [a, b] \end{cases}$

CIOÈ  $y_1 = y_2$


• UN PC PUO' AVERE INFINITE SOLUZIONI (ES: PEANO)  $\begin{cases} y' = 3y^{2/3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$

QUESTO HA SOLUZIONE BANALE  $y = 0$

MA ANCHE  $y(x) = (x+c)^3$

PEANO RISOLVE CONSIDERANDO  $y(-c) = 0$  CON  $c < 0$

$$y_c(x) = \begin{cases} (x+c)^3 & x > -c \\ 0 & x \leq -c \end{cases}$$



• QUESTO È UN ES DI EQUAZIONE A VARIABILI SEPARABILI

$$y' = a(x)b(x), \quad b(y) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{y'(x)}{b(y(x))} = a(x)$$

2 INTEGRANDO  $\int \frac{y'(x)}{b(y(x))} dx = \int a(x) dx$  e PER SOSTITUZIONE

$$\int \frac{dy}{b(y)}$$

• EQ. LINEARI DEL PRIMO ORDINE A COEFF. VARIABILI

FORMA GENERALE:  $y' + p(x)y = q(x)$   $p(x), q(x) \in C(I)$

$C(I) \Rightarrow$  CLASSE DI f CONTINUE IN I

OPPURE:  $y' = \underbrace{q(x) - p(x)y}_{f(x,y)}$  o  $\mathcal{I}y = q(x)$  dove  $\mathcal{I}y := y' + p(x)y$

• PROPRIETA' DI LINEARITA'

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, y_1, y_2$  DERIVABILI su I e  $\mathcal{I}y = \mathcal{I}(y)$ :

$$\mathcal{I}(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \mathcal{I}y_1 + \beta \mathcal{I}y_2$$

DIM:

$$\mathcal{I}(\alpha y_1 + \beta y_2) = (\alpha y_1 + \beta y_2)' + p(x)(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha y_1' + \beta y_2' + \alpha p(x)y_1 + \beta p(x)y_2$$

$$\begin{aligned} \text{-RACCOLGO } \alpha \text{ e } \beta &\Rightarrow \alpha(y_1' + p(x)y_1) + \beta(y_2' + p(x)y_2) \\ &= \alpha \mathcal{I}(y_1) + \beta \mathcal{I}(y_2) \quad \checkmark \end{aligned}$$

# • TEOREMA DELLE EQ. DI PRIMO ORDINE LINEARI

UNA EQ. IN FORMA  $y' + p(x)y = q(x)$  È

(A)  $y(x) = e^{-\int p(x)} \left\{ c + \int e^{\int p(x)} \cdot q(x) dx \right\}$

DOVE  $\int p(x)$  RAPPRESENTA UNA GENERICA PRIMITIVA (CON  $c$  "INGLOBATA")

(B) IL PC  
 $\begin{cases} y' + p(x)y = q(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad x_0 \in I$  HA SOLUZIONE UNICA GRAZIE ALLA CONDIZ. INIZIALE (CIOÈ TROVA LA  $c$ )

DIM (B)

PONGO  $Q(x) = \int e^{\int p(x)} \cdot q(x) dx$  e QUINDI:  $y_0 = y(x_0) = e^{-\int p(x)} \{c + Q(x)\}$   
 e  $c = y_0 e^{\int p(x)} - Q(x_0)$

UNICITÀ:

$$\begin{cases} y_1' + p(x)y_1 = q(x) \\ y_1(x_0) = y_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_2' + p(x)y_2 = q(x) \\ y_2(x_0) = y_0 \end{cases}$$

• SOTTRAGGO

$$\begin{cases} y_1' - y_2' + p(x)(y_1 - y_2) = q(x) - q(x) = 0 \\ y_1(x_0) - y_2(x_0) = y_0 - y_0 = 0 \end{cases}$$

e pongo  $M = y_1 - y_2$

$$\begin{cases} M' + p(x)M = 0 \\ M(x_0) = 0 \end{cases}$$

CHE È UN CASO DEL PC DI (A), QUINDI RISOLVO CON FORMULA

$$M(x) = e^{-\int p(x)} \left\{ c + e^{\int p(x)} \cdot 0 \right\} = c e^{-\int p(x)}$$

e VISTO CHE  $M(x_0) = 0$  (e L'ESPOENZIALE NON SI ANNULLA) ALLORA  $c = 0$

e  $M(x) = 0 \quad \forall x \in I$  CIOÈ  $y_1 = y_2$  ✓

DIM (A)

CON IL "METODO DEL FATTORE INTEGRANTE"

PONGO  $M(x) = \exp \int p(x) dx > 0$

$$M'(x) = \exp \int p(x) dx \cdot p(x) = M(x) \cdot p(x) \quad (\text{DERIVATA ESPONENZIALE})$$

• MOLTIPLICO PER  $M(x)$

$$y' M(x) + \underbrace{p(x)} \cdot \underbrace{y M(x)} = q(x) M(x)$$

CIOÈ  $y' M(x) + M'(x) y = q(x) M(x)$

$(y(x) M(x))' = q(x) M(x)$  e INTEGRANDO

$y(x) = \frac{\int q(x) M(x) dx}{M(x)}$  ✓

## ● EQUAZIONE DI BERNOULLI:

RISOLVE LE EQUAZIONI DI TIPO:  $y' + p(x)y = q(x)y^\alpha$ ,  $p(x), q(x) \in C(I)$

$\alpha = 1$  e  $0$  SONO GIÀ NOTI e ASSUMO  $y(x) \neq 0 \forall x \in I$

DIVIDO PER  $y^\alpha$

$y'y^{-\alpha} + p(x)y^{1-\alpha} = q(x)$  e PONGO  $z := y^{1-\alpha}$  e  $z' := (1-\alpha)y^{-\alpha} \cdot y'$

RISCRIVENDO CON  $z$  ...  $\frac{z'}{1-\alpha} + p(x)z = q(x) \Rightarrow z' + p(x)(1-\alpha)z = q(x)(1-\alpha)$

RISOLVIBILE CON TEOREMA DELLE EQ. DI 1 ORDINE LINEARI (TES. 2)

## ● EQUAZIONE DI RICCATI:

$y' = r(x) + p(x)y + q(x)y^2$  \*  $r, p, q \in C(I)$  e CONSCIAMO PER HP  $y_0' = *$

## RISOLUZIONE

USO  $z(x)$  COME  $\Rightarrow y(x) = y_0(x) + \boxed{\frac{1}{z(x)}}$  SAREBBE IL "RESTO" e DERIVO:

$y' = y' - \frac{1}{z^2} \cdot z'$  e SOSTITUISCO NELLA FORMULA INIZIALE

$\Rightarrow y_0' - \frac{z'}{z^2} = r(x) + p(x) \left( y_0(x) + \frac{1}{z(x)} \right) + q(x) \left( y_0^2(x) + \frac{2y_0(x)}{z(x)} + \frac{1}{z^2(x)} \right)$  PERCHÉ  $y_0$  È SOLUZIONE

$= -\frac{z'}{z^2} = \frac{p(x)}{z(x)} + \frac{2y_0(x)q(x)}{z(x)} + \frac{p(x)}{z^2(x)} = 0$  (NOTENUTTO PER  $z(x)$ )  $\Rightarrow \underline{z' + 2q(x)y_0(x) - z = -r(x)z}$

FORMA APPLICABILE AL TES. 2 SU  $z$ , e TROVO  $y$  CON  $y(x) = y_0(x) + \frac{1}{z(x)}$


## ● CONTINUITÀ DI UNA $f(x, y)$

UNA  $f(x, y)$  È CONTINUA IN  $(x_0, y_0)$  SE:

-  $(x_0, y_0) \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^2$  (DOMINIO FUNZIONE)

-  $\lim_{x, y \rightarrow x_0, y_0} f(x, y) = f(x_0, y_0)$  CIOÈ  $\exists L \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists \delta > 0$  t.c.  $|f(x, y) - L| < \varepsilon \quad \forall (x, y) \in \Omega$  t.c.  $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$

\* DISTANZA TRA 2 PUNTI



## ● ESEMPI DI $f$ CONTINUE

- SE  $f(x, y) := g(x)$  (e  $g(x) \in C(I) \Rightarrow f(x, y) \in C(I \times \mathbb{R})$ )

-  $+$ ,  $-$ ,  $\cdot$  DI  $f$  CONTINUE SONO CONTINUE

- IL QUOT. DI  $f$  CONTINUE È CONTINUO  $\forall (x, y) \in \Omega - \{DENOM = 0\}$

- I POLINOMI SONO  $f$  CONTINUE SU  $\Omega = \mathbb{R}^2$

- LE  $f$  RAZIONALI SONO CONTINUE SUL LORO DOMINIO

- SE  $g(x) \in C(I)$  e  $f(x, y) \in C(x, g(x))$ , ALLORA  $f(x, y)$  È CONTINUA SU  $I$

-  $f(x, y) \in C(U \subseteq \Omega)$  e  $g(x) \in C(\text{CODOM. DI } f)$  ALLORA  $g(f(x, y)) \in C(U \subseteq \mathbb{R}^2)$

## ● TEOREMA DI PEANO ( $\exists$ SOLUZIONI PC)

HP: DATO UN GENERALE (PC) e  $(x_0, y_0) \in \Omega$ ,  $f(x) \in C(\Omega)$  e  $\Omega$  "APERTO" ( $\forall x, y \exists$  DISCO CONTENUTO IN  $\Omega$ )

ALLORA  $\exists y: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  DEFINITA SU QUALCHE  $I$  CONTENENTE  $x_0$ , SOLUZIONE DEL (PC)

## ● TEO. 3: $\exists$ e UNICITA' GLOBALE SU (PC)

SIA  $\Omega = [a, b] \times \mathbb{R}$  (ma ANCHE  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ):

- $(x_0, y_0) \in \Omega$
- $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  i.c.  $f \in C(\Omega)$
- $L > 0$  i.c.  $|f(x, y) - f(x, z)| \leq L|y - z| \quad \forall (x, y), (x, z) \in \Omega \Rightarrow$  IPOTESI DI LIPSCHITZ

ALLORA  $\exists$   $y_0$  È UNICA LA SOLUZ. DEL (PC) PER  $I = [a, b]$  (o  $\mathbb{R}$  se  $\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ )

## ● TEO. 4: $\exists$ e UNICITA' LOCALE

DATTA  $B_r$  "BOLLA APERTA CENTRATA IN  $(x_0, y_0)$  e DI RAGGIO  $r \Rightarrow B_r(x_0, y_0) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ i.c. } \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < r \right\}$

•  $f \in C(B_r)$

DISTANZA PUNTO  $(x, y)$  DAL CENTRO E RAGGIO

ALLORA IL PC HA SOLUZIONE UNICA DEFINITA SU  $I$  (CONTENENTE  $x_0$ )  $\subset \mathbb{R}$

È POSSIBILE DIMOSTRARE IL TEO. 2 USANDO IL TEOREMA 3:

DA  $y' = q(x) - p(x)y = f(x, y)$  e  $\bullet \in C(I, \mathbb{R} \times \mathbb{R})$  CONSIDERO  $[a, b] \subseteq I$  e  $f \in C(\Omega)$

$\Omega = [a, b] \times \mathbb{R}$   
 $x_0 \in$

IMONGO C'HP DI LIPSCHITZ:

$|q(x) - p(x)y - q(x) + p(x)z| \leq L|y - z| \Rightarrow |-p(x)y + p(x)z| \leq L|y - z| \Rightarrow |p(x)| \cdot |y - z| \leq L|y - z|$

$\Rightarrow$  PONGO  $L = \max(p(x))$  IN  $[a, b]$  (CHE ESISTE PER WEIERSTRASS) e QUINDI LA DISQ. È VERIF.

e SE HO UNICITA' e ESISTENZA SU  $[a, b]$  ARBITRARIO, LA HO SU  $I$

## ● EQUAZIONI DIFFERENZIALI DI ORDINE SUPERIORE

- STRUTTURA GENERALE:  $f^{(k)} = f(x, y, \dots, y^{(k-1)})$

DATO IL SEGUENTE (PC)  $y$  È UNA SOLUZIONE SU  $I$  SE: (CON  $f: \Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ )

(PC)  $\begin{cases} y^{(k)} = f(x, y, \dots, y^{(k-1)}) \\ y(x_0) = y_0 \\ y^{(1)}(x_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(k-1)}(x_0) = y_{k-1} \end{cases}$

•  $y$  È DERIVABILE SU  $I$

•  $(x, y(x), \dots, y^{(k-1)}(x)) \in \Omega \quad \forall x \in I$

•  $y^{(k)}(x) = f(x, y(x), \dots, y^{(k-1)}(x))$  SU QUALCHE  $I$  (CIÒ SE VERIFICA L'EQ. DIFF.)

## ● EQ. DIFF. "LINEARI" DI ORDINE SUPERIORE

SONO SOLO GENERALIZZAZIONI DELLA FORMA  $y' + p(x)y = q(x) \Rightarrow \mathcal{L}(y) = q(x)$

CIÒ È:  $y^{(k)} + \sum_{i=0}^{k-1} a_i(x) y^{(i)} = b(x)$  CON  $a, b \in C(I) \quad I \subseteq \mathbb{R}$

NOTA:  $\mathcal{L}(y) = 0$  È DETTA EQUAZIONE OMOGENEA ASSOCIATA A  $\mathcal{L}(y) = q(x)$

## • TEOREMA 5, § 2 UNICITÀ SOLUZIONI (PC)

AVENDO  $I \subseteq \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$ ,  $a, b \in C(I)$ :  $(PC) \begin{cases} \text{eq. diff.} \\ \vdots \\ y^{(k-1)}(x_0) = y_k \end{cases}$  HA SOLUZIONE A QUESTA  $y = y(x)$  È UNICA SU  $I$

---

## • INDIPENDENZA LINEARE DI FUNZIONI

DATE  $k$  FUNZIONI  $v_1, \dots, v_k$  DEFINITE SU  $I$ , SONO LIN. INDIPENDENTI SE:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0 \quad \forall x \in I \quad \text{e} \quad c_1 = c_2 = \dots = 0$$

---