Solução numérica de equações diferenciais ordinárias

Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br

Conteúdos

Informações sobre os conteúdos

1. Problema de valor inicial
2. Aplicação de diferenciação numérica
3. Método de Euler
4. Métodos de Taylor
5. Métodos de Runge-Kutta
6. Análise de convergência e estabilidade
7. Métodos multi-passos

Problema de valor inicial

A razão para se estudar métodos numéricos para aproximar soluções de problema de valor inicial (PVI) é a dificuldade de se encontrar, analiticamente, as soluções da equação. Em muitos casos, a teria nos garante existência e unicidade de solução, mas não sabemos qual é a expressão analítica desta solução.
Os métodos que estudaremos aqui se baseiam em: dado o PVI:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \tag{1}$$

construímos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ que, embora não necessariamente, para nós serão igualmente espaçados, ou seja: $x_{i+1} - x_i = h$.

Exemplos

Example

Seja o PVI:

$$\begin{aligned} y' &= -y + x, \ x \in [0,1] \\ y(0) &= 1 \end{aligned} . \tag{2}$$

Example

$$\begin{aligned} y' &= t - 3y, \ t \in [0,2] \\ y(0) &= 1 \end{aligned} \tag{3}$$

Aplicação de diferenciação numérica

- A fórmula progressiva, que dada por:

$$y'(x) = \frac{y(x+h) - y(x)}{h} - \frac{h}{2}y''(\xi) \tag{4}$$

- Fórmula regressiva

$$y'(x) = \frac{y(x) - y(x-h)}{h} + \frac{h}{2}y''(\xi) \tag{5}$$

- Fórmula centrada

$$y'(x) = \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{3!}y''(\xi) \tag{6}$$

Método de passo um (ou passo simples) - Euler

Um método numérico que podemos aplicar à solução aproximada de um PVI: $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ é o método de Euler, o qual consiste em: como conhecemos x_0 e $y_0 = y(x_0)$, então sabemos calcular $y'(x_0) = f(x_0, y_0)$. Assim, a reta que passa por (x_0, y_0) com coeficiente angular $y'(x_0)$, $r_0(x)$ é conhecida:

$$r_0(x) = y(x_0) + (x - x_0)\, y'(x_0) \tag{7}$$

Escolhido $h = x_{k+1} - x_k$, $y(x_1) \approx y_1 = r_0(x_1) = y_0 + hy'(x_0)$, ou seja,

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0). \tag{8}$$

Método de Euler - GRAFICAMENTE

O raciocínio é repetido com (x_1, y_1) e $y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$ e assim, sucessivamente, o método de Euler nos fornece

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k), \;\; k = 0, 1, 2, \ldots. \tag{9}$$



Figura 1: Método de Euler.

Exemplos

Example

Seja o PVI:

$$\begin{aligned} y' = y, \;\; t \in [0,2] \\ y(0) = 1 \end{aligned} \tag{10}$$

Trabalhando com quatro casas decimais, use o método de Euler para aproximar $y(0.04)$ com $\epsilon \leq 5 \times 10^{-4}$.

Métodos de série de Taylor

Os métodos que usam o desenvolvimento em série de Taylor de $y(x)$ teoricamente fornecem soluções para qualquer equação diferencial. No entanto, do ponto de vista computacional, os métodos de série de Taylor de ordem mais elevada são considerados inaceitáveis pois, a menos de uma classe restrita de funções $f(x, y)$, o cálculo das derivadas totais envolvidas é extremamente complicado.

Exemplos

Example

Calcular $y(2.1)$ usando a série de Taylor de 2ª ordem para o PVI:

$$\begin{aligned} xy' &= x - y \\ y(2) &= 2. \end{aligned} \tag{11}$$

Métodos Runge-Kutta

A idéia básica destes métodos é aproveitar as qualidades dos métodos de série de Taylor e ao mesmo tempo eliminar seu maior defeito que é o cálculo de derivadas de $f(x, y)$ que, conforme vimos, torna os métodos de série de Taylor computacionalmente inaceitáveis.
Podemos dizer que os métodos de Runge-Kutta de ordem p se caracterizam pelas três propriedades:

- são de passo um;
- não exigem o cálculo de qualquer derivada de $f(x, y)$; pagam por isso, o preço de calcular $f(x, y)$ em vários pontos;
- após expandir $f(x, y)$ por Taylor para função de duas variáveis em torno de (x_n, y_n) e agrupar os termos semelhantes, sua expressão coincide com a do método de série de Taylor de mesma ordem.

Métodos de Runge-Kutta de 1ª ordem - método de Euler

Já vimos que o método de Euler é um método de série de Taylor de 1ª ordem:

$$y_{n+1} = y_n + hy', \;\; n = 0, 1, 2, \;\; ..., \tag{12}$$

então,

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \;\; n = 0, 1, 2, ... \tag{13}$$

e o método de Euler satisfaz as três propriedades acima que o caracterizam como um método de Runge-Kutta de ordem $p = 1$.

Métodos de Runge-Kutta de 2ª ordem - Euler melhorado

Exporemos inicialmente um método particular que é o método de Heun, ou método de Euler Aperfeiçoado, pois ele tem uma interpretação geométrica bastante simples.
Conforme o próprio nome indica, este método consiste em fazer mudanças no método de Euler para assim conseguir um método de ordem mais elevada.

Método de Euler Aperfeiçoado - GRAFICAMENTE

O valor fornecido para y_{n+1} pelo método de Euler Aperfeiçoado é:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n, y_n) + f(x_n + h, y_n + hy'_n)\right], \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{14}$$



Figura 2: Euler aperfeiçoado.

Verificar que o método de Euler Aperfeiçoado tem ordem 2

Observamos que este método é de passo um e só trabalha com cálculos de $f(x, y)$, não envolvendo suas derivadas. Assim, para verificarmos que ele realmente é um método de Runge-Kutta de 2ª ordem, falta verificar se sua fórmula concorda com a do método de série de Taylor até os termos de 2ª ordem em h:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} f_x(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} f(x_n, y_n) f_y(x_n, y_n) \tag{15}$$

com $e(x_{n+1}) = \frac{h^2}{3!}\ \mathrm{y}'''(\xi_{n+1})$.

Runge-Kutta de segunda ordem (General formula)

In the forward Euler method, we used the information on the slope or the derivative of y at the given time step to extrapolate the solution to the next time-step. The LTE for the method is $O(h^2)$, resulting in a first order numerical technique. Runge-Kutta methods are a class of methods which judiciously uses the information on the 'slope' at more than one point to extrapolate the solution to the future time step. Let's discuss first the derivation of the second order RK method where the LTE is $O(h^3)$. Given the IVP of Eq. 6, and a time step h, and the solution y_n at the nth time step, let's say that we wish to compute y_{n+1} in the following fashion:

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(y_n, t_n) \\ k_2 &= hf(y_n + \beta k_1, t_n + \alpha h) \\ y_{n+1} &= y_n + ak_1 + bk_2 \end{aligned} \tag{16}$$

Runge-Kutta 2

where the constants α, β, a and b have to be evaluated so that the resulting method has a LTE $O(h^3)$. Note that if $k_2 = 0$ and $a = 1$, then Eq. reduces to the forward Euler method.
Now, let's write down the Taylor series expansion of y in the neighborhood of t_n correct to the h^2 term i.e.,

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h\frac{dy}{dt}|_{t_n} + \frac{h^2}{2}\frac{d^2y}{dt^2}|t_n + O(h^3). \tag{17}$$

However, we know from the IVP that $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$ so that

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{df(t, y)}{dt} = f_t + ff_y. \tag{18}$$

Construction of the RK2

So from the above analysis, we get

$$y_{n+1} = y_n + hf(y_n, t_n) + \frac{h^2}{2}(f_t + ff_y) + O(h^3). \tag{19}$$

However, the term k_2 in the proposed RK method can be expanded correct to $O(h^3)$ as

$$\begin{aligned} k_2 &= hf(t_n + \alpha h, y_n + \beta k_1) \\ &= h\left(f(t_n, y_n + \alpha h f_t) + \beta k_1 f_t\right) + O(h^3). \end{aligned} \tag{20}$$

Determination of the constants

Comparing the terms with identical coefficients gives us the following system of equations to determine the constants:

$$\begin{aligned} a + b &= 1 \\ \alpha b &= \frac{1}{2} \\ \beta b &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{21}$$

There are infinitely many choices of a, b, α and β which satisfy Eq., we can choose for instance $\alpha = \beta = 1$ and $a = b = \frac{1}{2}$. With this choice, we have the classical second order accurate Runge-Kutta method (RK2) which is summarized as follows.

Algorithm of the RK2 method

The Second Order Runge-Kutta Method (RK2) is given as

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(t_n, y_n) \\ k_2 &= hf(y_n + k_1, t_n + h) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \end{aligned}. \tag{22}$$

Método Runge-Kutta de ordem 4

O mais usado e popular dos métodos Runge-Kutta é o método de ordem 4, também conhecido como método Runge-Kutta clássico.
Seja o problema de valor inicial dado a seguir:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \tag{23}$$

Here y is an unknown function (scalar or vector) of time t, which we would like to approximate; we are told that $\frac{dy}{dt}$, the rate at which y changes, is a function of t and of y itself. At the initial time t_0 the corresponding y value is y_0. The function f and the initial conditions t_0, y_0 are given.

RK4

Now we pick a step-size $h > 0$ and define:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right), \\ t_{n+1} &= t_n + h \end{aligned} \tag{24}$$

for $n = 0, 1, 2, 3, \ldots,$ using[3]

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + h\frac{k_1}{2}\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + h\frac{k_2}{2}\right), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3). \end{aligned} \tag{25}$$

RK4

Here y_{n+1} is the RK4 approximation of $y(t_{n+1})$, and the next value (y_{n+1}) is determined by the present value (y_n) plus the weighted average of four increments, where each increment is the product of the size of the interval, h, and an estimated slope specified by function f on the right-hand side of the differential equation.

- k_1 is the slope at the beginning of the interval, using y (Euler's method);
- k_2 is the slope at the midpoint of the interval, using y and k_1;
- k_3 is again the slope at the midpoint, but now using y and k_2;
- k_4 is the slope at the end of the interval, using y and k_3.

RK4

In averaging the four slopes, greater weight is given to the slopes at the midpoint. If f is independent of y, so that the differential equation is equivalent to a simple integral, then RK4 is Simpson's rule.[5]
The RK4 method is a fourth-order method, meaning that the local truncation error is on the order of $O(h^5)$, while the total accumulated error is on the order of $O(h^4)$.
In many practical applications the function f is independent of t (so called autonomous system, or time-invariant system, especially in physics), and their increments are not computed at all and not passed to function f, with only the final formula for t_{n+1} used.

Figura RK4



Figura 3: Slopes do método RK4

Análise de convergência e estabilidade

Seja $y(x_n)$ a solução exata do PVI

$$\begin{aligned} y' &= f(x, y) \\ y(a) &= \alpha \end{aligned} \tag{26}$$

no ponto x_n e y_n uma aproximação obtida por um método numérico para essa solução.

Definition

O erro global no ponto x_n é definido por

$$e_n = y(x_n) - y_n. \tag{27}$$

A análise do erro global nos permite estabelecer a convergência de um método. Esta é uma propriedade muito desejável para um método numérico, pois ela irá nos agarantir que ao refinarmos a malha o resultado numérico se torna mais próximo do resultado exato.

Definição de convergência

Definition

Dizemos que um método numérico é convergente se o erro global e_n converge para zero quando n tende para infinito de maneira que o ponto x_n permaneça fixo.

Isto quer dizer que a convergência está sendo analisada no ponto $x_n = a + nh$ e para que este ponto permaneça fixo, a quantidade nh deve permanecer fixa, portanto se n tende para infinito necessariamente h deve tender a zero, ou seja, a malha está sendo refinida para cada novo valor de n da sequência. É possível verificar a convergência de um método numérico diretamente a partir de sua definição. No entanto esta é uma maneira muito trabalhosa e é então preferível fazê-lo indiretamente utilizando os conceitos de consistência e zero-estabilidade.

Estabilidade

Os conceitos estudados anteriormente, convergência, consistência e zero-estabilidade, dizem respeito a $h \to 0$. No entanto, quanto menor o valor de h, tanto maior será o número de cálculos que deverão ser efetuados para produzir uma solução aproximada em determinado ponto x, fixado. Isto pode levar a um acúmulo, não controlado, de erros e nesse caso dizemos que esse método é *não estável* ou *instável*. A estabilidade (h fixo) é muito importante para problemas que exigem um número muito grande de aplicações repetidas de um método para obter a solução em um dado intervalo.

Mais discussão sobre estabilidade

Como em geral não é possível predizer o número de passos necessários para obtenção da solução, é aconselhável que, por precaução, tenhamos um controle do comportamento do erro, isto é, um controle da propagação do erro. Na verdade, a escolha do tamanho h da malha está intimamente ligada à estabilidade do método, e é o parâmetro através do qual é possível exercer esse controle. Podemos interpretar um método numérico como uma máquina de produzir números a partir de dados iniciais. Como esses dados iniciais contém sempre erro (de arredondamento do computador por exemplo), se essa máquina tiver o defeito de amplificá-los, em pouco tempo o crescimento do erro dominará a solução produzida pela máquina e esta perderá o seu significado.

Métodos multi-passos