



Instituto Metrópole Digital  
Universidade Federal do Rio Grande do  
Norte  
Campus de Natal

---

## **Lista de exercícios: Vetores no plano e no espaço**

**Prof. Dr. Irineu Lopes Palhares Junior**

Lista de exercícios

Natal  
Agosto de 2022

## Sumário

1	Soma de vetores e multiplicação por escalar	2
2	Norma e produto escalar; Projeção ortogonal	11

# **1 Soma de vetores e multiplicação por escalar**

- 4) Seja o triângulo de vértices  $A(4, -1, -2)$ ,  $B(2, 5, -6)$  e  $C(1, -1, -2)$ . Calcular o comprimento da mediana do triângulo relativa ao lado  $AB$ .

### Solução

A mediana em questão, de acordo com a Figura 1.64, é o segmento que tem como extremidades o ponto médio  $M$  de  $AB$  e o vértice oposto  $C$ . Então, o comprimento da mediana é o módulo do vetor  $\overrightarrow{MC}$ .

$$M\left(\frac{4+2}{2}, \frac{-1+5}{2}, \frac{-2-6}{2}\right) \text{ ou } M(3, 2, -4)$$

e

$$\overrightarrow{MC} = C - M = (1, -1, -2) - (3, 2, -4) = (-2, -3, 2)$$

Portanto

$$|\overrightarrow{MC}| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + 2^2} = \sqrt{4+9+4} = \sqrt{17}$$




Figura 1.64

### Problemas Propostos

- Dados os vetores  $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ ,  $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$  e  $\vec{w} = -2\vec{i} + \vec{j}$ , determinar
  - $2\vec{u} - \vec{v}$
  - $\vec{v} - \vec{u} + 2\vec{w}$
  - $\frac{1}{2}\vec{u} - 2\vec{v} - \vec{w}$
  - $3\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v} - \frac{1}{2}\vec{w}$
- Dados os vetores  $\vec{u} = (3, -1)$  e  $\vec{v} = (-1, 2)$ , determinar o vetor  $\vec{x}$  tal que
  - $4(\vec{u} - \vec{v}) + \frac{1}{3}\vec{x} = 2\vec{u} - \vec{x}$
  - $3\vec{x} - (2\vec{v} - \vec{u}) = 2(4\vec{x} - 3\vec{u})$
- Dados os pontos  $A(-1, 3)$ ,  $B(2, 5)$ ,  $C(3, -1)$  e  $O(0, 0)$ , calcular
  - $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{AB}$
  - $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{BC}$
  - $3\overrightarrow{BA} - 4\overrightarrow{CB}$
- Dados os vetores  $\vec{u} = (2, -4)$ ,  $\vec{v} = (-5, 1)$  e  $\vec{w} = (-12, 6)$ , determinar  $a_1$  e  $a_2$  tais que  $\vec{w} = a_1\vec{u} + a_2\vec{v}$
- Dados os pontos  $A(3, -4)$  e  $B(-1, 1)$  e o vetor  $\vec{v} = (-2, 3)$ , calcular
  - $(B - A) + 2\vec{v}$
  - $(A - B) - \vec{v}$
  - $B + 2(B - A)$
  - $3\vec{v} - 2(A - B)$
- Sejam os pontos  $A(-5, 1)$  e  $B(1, 3)$ . Determinar o vetor  $\vec{v} = (a, b)$  tal que
  - $B = A + 2\vec{v}$
  - $A = B + 3\vec{v}$

Construir o gráfico correspondente a cada situação.

- 7) Representar no gráfico o vetor  $\overrightarrow{AB}$  e o correspondente vetor posição, nos casos:
- $A(-1, 3)$  e  $B(3, 5)$
  - $A(-1, 4)$  e  $B(4, 1)$
  - $A(4, 0)$  e  $B(0, -2)$
  - $A(3, 1)$  e  $B(3, 4)$
- 8) Qual o ponto inicial do segmento orientado que representa o vetor  $\vec{v} = (-1, 3)$ , sabendo que sua extremidade está em  $(3, 1)$ ? Representar graficamente este segmento.
- 9) No mesmo sistema cartesiano xOy, representar
- os vetores  $\vec{u} = (2, -1)$  e  $\vec{v} = (-2, 3)$ , com origem nos pontos  $A(1, 4)$  e  $B(1, -4)$ , respectivamente;
  - os vetores posição de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .
- 10) Sejam os pontos  $P(2, 3)$ ,  $Q(4, 2)$  e  $R(3, 5)$ .
- Representar em um mesmo gráfico os vetores posição de  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  de modo que  $Q = P + \vec{u}$ ,  $R = Q + \vec{v}$  e  $P = R + \vec{w}$ .
  - Determinar  $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ .
- 11) Encontrar o vértice oposto a B, no paralelogramo ABCD, para
- $A(-3, -1)$ ,  $B(4, 2)$  e  $C(5, 5)$
  - $A(5, 1)$ ,  $B(7, 3)$  e  $C(3, 4)$
- 12) Sabendo que  $A(1, -1)$ ,  $B(5, 1)$  e  $C(6, 4)$  são vértices de um paralelogramo, determinar o quarto vértice de cada um dos três paralelogramos possíveis de serem formados.
- 13) Dados os pontos  $A(-3, 2)$  e  $B(5, -2)$ , determinar os pontos M e N pertencentes ao segmento AB tais que  $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$  e  $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$ . Construir o gráfico, marcando os pontos A, B, M, N e P, devendo P ser tal que  $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB}$ .
- 14) Sendo  $A(-2, 3)$  e  $B(6, -3)$  extremidades de um segmento, determinar
- os pontos C, D e E que dividem o segmento AB em quatro partes de mesmo comprimento;
  - os pontos F e G que dividem o segmento de AB em três partes de mesmo comprimento.
- 15) O ponto P pertence ao segmento de extremos  $A(x_1, y_1)$  e  $B(x_2, y_2)$  e a distância dele ao ponto A é a terça parte da distância dele ao ponto B. Expressar as coordenadas de P em função das coordenadas de A e B.
- 16) Dados os vetores  $\vec{u} = (1, -1)$ ,  $\vec{v} = (-3, 4)$  e  $\vec{w} = (8, -6)$ , calcular
- $|\vec{u}|$
  - $|\vec{v}|$
  - $|\vec{w}|$
  - $|\vec{u} + \vec{v}|$
  - $|2\vec{u} - \vec{w}|$
  - $|\vec{w} - 3\vec{u}|$
  - $\frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|}$
  - $\left| \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \right|$

- 17) Calcular os valores de  $a$  para que o vetor  $\vec{u} = (a, -2)$  tenha módulo 4.
- 18) Calcular os valores de  $a$  para que o vetor  $\vec{u} = (a, \frac{1}{2})$  seja unitário.
- 19) Provar que os pontos A(-2, -1), B(2, 2), C(-1, 6) e D(-5, 3), nesta ordem, são vértices de um quadrado.
- 20) Encontrar um ponto P de eixo Ox de modo que a sua distância ao ponto A(2, -3) seja igual a 5.
- 21) Dados os pontos A(-4, 3) e B(2, 1), encontrar o ponto P nos casos
- P pertence ao eixo Oy e é eqüidistante de A e B;
  - P é eqüidistante de A e B e sua ordenada é o dobro da abscissa;
  - P pertence à mediatriz do segmento de extremos A e B.
- 22) Encontrar o vetor unitário que tenha (I) o mesmo sentido de  $\vec{v}$  e (II) sentido contrário a  $\vec{v}$ , nos casos:
- $\vec{v} = -\vec{i} + \vec{j}$
  - $\vec{v} = 3\vec{i} - \vec{j}$
  - $\vec{v} = (1, \sqrt{3})$
  - $\vec{v} = (0, 4)$
- 23) Dado o vetor  $\vec{v} = (1, -3)$ , determinar o vetor paralelo a  $\vec{v}$  que tenha:
- sentido contrário ao de  $\vec{v}$  e duas vezes o módulo de  $\vec{v}$ ;
  - o mesmo sentido de  $\vec{v}$  e módulo 2;
  - sentido contrário ao de  $\vec{v}$  e módulo 4.
- 24) Traçar no mesmo sistema de eixos os retângulos de vértices
- A(0, 0, 1), B(0, 0, 2), C(4, 0, 2) e D(4, 0, 1)
  - A(2, 1, 0), B(2, 2, 0), C(0, 2, 2) e D(0, 1, 2)
- 25) Traçar o retângulo formado pelos pontos (x, y, z) tal que
- $x = 0, 1 \leq y \leq 4$  e  $0 \leq z \leq 4$
  - $-1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$  e  $z = 3$
- 26) Construir o cubo constituído dos pontos (x, y, z), de modo que
- $-4 \leq x \leq -2, 1 \leq y \leq 3$  e  $0 \leq z \leq 2$
  - $-2 \leq x \leq 0, 2 \leq y \leq 4$  e  $-4 \leq z \leq -2$
- 27) Construir o paralelepípedo retângulo formado pelos pontos (x,y,z), de modo que  $1 \leq x \leq 3, 3 \leq y \leq 5$  e  $0 \leq z \leq 4$ . Quais as coordenadas dos oito vértices do paralelepípedo?
- 28) Calcular a distância do ponto A(3, 4, -2)
- ao plano xy;
  - ao plano xz;
  - ao plano yz;
  - ao eixo dos x;
  - ao eixo dos y;
  - ao eixo dos z.
-




Figura 1.65

- 29) A Figura 1.65 apresenta um paralelepípedo retângulo de arestas paralelas aos eixos coordenados e de medidas 2, 1 e 3. Determinar as coordenadas dos vértices deste sólido, sabendo que  $A(2,-1,2)$ .

- 30) O paralelepípedo retângulo de dimensões 3, 4 e 5 está referido ao sistema  $Oxyz$  conforme a Figura 1.66. Considerando um segundo sistema chamado de  $O'x'y'z'$ , onde  $Ox \parallel O'x'$ ,  $Oy \parallel O'y'$  e  $Oz \parallel O'z'$ , e sendo  $O'$  um dos vértices do paralelepípedo de acordo com a figura, determinar as coordenadas dos pontos  $O$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  e  $O'$  em relação aos sistemas dados.




Figura 1.66

- 31) Dados os pontos  $A(2, -2, 3)$  e  $B(1, 1, 5)$  e o vetor  $\vec{v} = (1, 3, -4)$ , calcular:
- $A + 3\vec{v}$
  - $(A - B) - \vec{v}$
  - $B + 2(B - A)$
  - $2\vec{v} - 3(B - A)$
- 32) Dados os pontos  $A(3, -4, -2)$  e  $B(-2, 1, 0)$ , determinar o ponto  $N$  pertencente ao segmento  $AB$  tal que  $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$ .
- 33) Dados os pontos  $A(1, -2, 3)$ ,  $B(2, 1, -4)$  e  $C(-1, -3, 1)$ , determinar o ponto  $D$  tal que  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$ .

- 34) Sabendo que  $3\vec{u} - 4\vec{v} = 2\vec{w}$ , determinar a, b, e c, sendo  $\vec{u} = (2, -1, c)$ ,  $\vec{v} = (a, b - 2, 3)$  e  $\vec{w} = (4, -1, 0)$ .
- 35) Dados os vetores  $\vec{u} = (2, 3, -1)$ ,  $\vec{v} = (1, -1, 1)$  e  $\vec{w} = (-3, 4, 0)$ ,  
a) determinar o vetor  $\vec{x}$  de modo que  $3\vec{u} - \vec{v} + \vec{x} = 4\vec{x} + 2\vec{w}$ ;  
b) encontrar os números  $a_1$ ,  $a_2$  e  $a_3$  tais que  $a_1\vec{u} + a_2\vec{v} + a_3\vec{w} = (-2, 13, -5)$ .
- 36) Representar no mesmo sistema Oxyz o vetor  $\vec{v} = (1, -1, 3)$  com origem nos pontos O(0, 0, 0), A(-3, -4, 0), B(-2, 4, 2), C(3, 0, -4) e D(3, 4, -2).
- 37) Sendo A(2, -5, 3) e B(7, 3, -1) vértices consecutivos de um paralelogramo ABCD e M(4, -3, 3) o ponto de interseção das diagonais, determinar os vértices C e D.
- 38) Determinar os três vértices de um triângulo, sabendo que os pontos médios de seus lados são M(5, 0, -2), N(3, 1, -3) e P(4, 2, 1).
- 39) Dados os pontos A(1, -1, 3) e B(3, 1, 5), até que ponto se deve prolongar o segmento AB, no sentido de A para B, para que seu comprimento quadruple de valor?
- 40) Sendo A(-2, 1, 3) e B(6, -7, 1) extremidades de um segmento, determinar  
a) os pontos C, D e E, nesta ordem, que dividem o segmento AB em quatro partes de mesmo comprimento;  
b) os pontos F e G, nesta ordem, que dividem o segmento AB em três partes de mesmo comprimento.
- 41) O ponto A é um dos vértices de um paralelepípedo e os três vértices adjacentes são B, C e D. Sendo AA' uma diagonal do paralelepípedo, determinar o ponto A' nos seguintes casos:  
a) A(3, 5, 0), B(1, 5, 0), C(3, 5, 4) e D(3, 2, 0)  
b) A(-1, 2, 1), B(3, -1, 2), C(4, 1, -3) e D(0, -3, -1)  
c) A(-1, 2, 3), B(2, -1, 0), C(3, 1, 4) e D(-2, 0, 5)
- 42) Apresentar o vetor genérico que satisfaz a condição:  
a) paralelo ao eixo dos x; e) ortogonal ao eixo dos y;  
b) representado no eixo dos z; f) ortogonal ao eixo dos z;  
c) paralelo ao plano xy; g) ortogonal ao plano xy;  
d) paralelo ao plano yz; h) ortogonal ao plano xz.
- 43) Quais dos seguintes vetores  $\vec{u} = (4, -6, 2)$ ,  $\vec{v} = (-6, 9, -3)$ ,  $\vec{w} = (14, -21, 9)$  e  $\vec{t} = (10, -15, 5)$  são paralelos?
- 44) Dado o vetor  $\vec{w} = (3, 2, 5)$ , determinar a e b de modo que os vetores  $\vec{u} = (3, 2, -1)$  e  $\vec{v} = (a, 6, b) + 2\vec{w}$  sejam paralelos.
- 45) A reta que passa pelos pontos A(-2, 5, 1) e B(1, 3, 0) é paralela à reta determinada por C(3, -1, -1) e D(0, m, n). Determinar o ponto D.
- 46) Verificar se são colineares os pontos:  
a) A(-1, -5, 0), B(2, 1, 3) e C(-2, -7, -1)
-



- b)  $A(2, 1, -1)$ ,  $B(3, -1, 0)$  e  $C(1, 0, 4)$   
 c)  $A(-1, 4, -3)$ ,  $B(2, 1, 3)$  e  $C(4, -1, 7)$
- 47) Sabendo que o ponto  $P(m, 4, n)$  pertence à reta que passa pelos pontos  $A(-1, -2, 3)$  e  $B(2, 1, -5)$ , calcular  $m$  e  $n$ .
- 48) Encontrar o vértice oposto a  $B$ , no paralelogramo  $ABCD$ , para  
 a)  $A(-1, 0, 3)$ ,  $B(1, 1, 2)$  e  $C(3, -2, 5)$   
 b)  $A(4, 0, 1)$ ,  $B(5, 1, 3)$  e  $C(3, 2, 5)$
- 49) Verificar se são unitários os seguintes vetores:  
 $\vec{u} = (1, 1, 1)$  e  $\vec{v} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$
- 50) Determinar o valor de  $n$  para que o vetor  $\vec{v} = (n, -\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$  seja unitário.
- 51) Determinar o valor de  $a$  para que  $\vec{u} = (a, -2a, 2a)$  seja um versor.
- 52) Dados os pontos  $A(1, 0, -1)$ ,  $B(4, 2, 1)$  e  $C(1, 2, 0)$ , determinar o valor de  $m$  para que  $|\vec{v}| = 7$ , sendo  $\vec{v} = m\vec{AC} + \vec{BC}$ .
- 53) Determinar o valor de  $y$  para que seja equilátero o triângulo de vértices  $A(4, y, 4)$ ,  $B(10, y, -2)$  e  $C(2, 0, -4)$ .
- 54) Obter o ponto  $P$  do eixo das abscissas equidistante dos pontos  $A(3, -1, 4)$  e  $B(1, -2, -3)$ .
- 55) Obter um ponto  $P$  do eixo das cotas cuja distância ao ponto  $A(-1, 2, -2)$  seja igual a 3.
- 56) Dado o vetor  $\vec{v} = (2, -1, -3)$ , determinar o vetor paralelo a  $\vec{v}$  que tenha  
 a) sentido contrário ao de  $\vec{v}$  e três vezes o módulo de  $\vec{v}$ ;  
 b) o mesmo sentido de  $\vec{v}$  e módulo 4;  
 c) sentido contrário ao de  $\vec{v}$  e módulo 5.


### Respostas de Problemas Propostos

- 1) a)  $(3, -5)$       b)  $(-5, 4)$       c)  $(1, -\frac{1}{2})$       d)  $(\frac{13}{2}, -9)$
- 2) a)  $(-\frac{15}{2}, \frac{15}{2})$       b)  $(\frac{23}{5}, -\frac{11}{5})$
- 3) a)  $(-4, 1)$       b)  $(2, 5)$       c)  $(-5, -30)$
- 4)  $a_1 = -1$  e  $a_2 = 2$
- 5) a)  $(-8, 11)$       b)  $(6, -8)$       c)  $(-9, 11)$       d)  $(-14, 19)$
- 6) a)  $\vec{v} = (3, 1)$       b)  $\vec{v} = (-2, -\frac{2}{3})$
- 8)  $(4, -2)$
- 10) b)  $\vec{0}$
- 11) a)  $D(-2, 2)$       b)  $D(1, 2)$

- 12)  $(2, 2)$ ,  $(0, -4)$  e  $(10, 6)$
- 13)  $M(1, 0)$ ,  $N(\frac{7}{3}, -\frac{2}{3})$ ,  $P(9, -4)$
- 14) a)  $C(0, \frac{3}{2})$ ,  $D(2, 0)$ ,  $E(4, -\frac{3}{2})$   
b)  $F(\frac{2}{3}, 1)$ ,  $G(\frac{10}{3}, -1)$
- 15)  $P(\frac{3}{4}x_1 + \frac{x_2}{4}, \frac{3}{4}y_1 + \frac{y_2}{4})$
- 16) a)  $\sqrt{2}$                       c) 10                      e)  $2\sqrt{13}$                       g)  $(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$   
b) 5                      d)  $\sqrt{13}$                       f)  $\sqrt{34}$                       h) 1
- 17)  $\pm 2\sqrt{3}$
- 18)  $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$
- 20)  $(6, 0)$  ou  $(-2, 0)$
- 21) a)  $P(0, 5)$                       b)  $P(-5, -10)$                       c)  $P(x, 3x + 5)$ ,  $x \in \mathbb{R}$
- 22) a)  $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$  e  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$                       b)  $(\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}})$  e  $(-\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}})$   
c)  $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  e  $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$                       d)  $(0, 1)$  e  $(0, -1)$
- 23) a)  $(-2, 6)$                       b)  $(\frac{2}{\sqrt{10}}, -\frac{6}{\sqrt{10}})$                       c)  $(-\frac{4}{\sqrt{10}}, \frac{12}{\sqrt{10}})$
- 27) Vértices da base inferior:  $(1, 3, 0)$ ,  $(1, 5, 0)$ ,  $(3, 3, 0)$  e  $(3, 5, 0)$   
Vértices da base superior:  $(1, 3, 4)$ ,  $(1, 5, 4)$ ,  $(3, 3, 4)$  e  $(3, 5, 4)$
- 28) a) 2                      c) 3                      e)  $\sqrt{13}$   
b) 4                      d)  $2\sqrt{5}$                       f) 5
- 29)  $B(2, -3, 2)$ ,  $C(3, -3, 2)$ ,  $D(3, -1, 2)$ ,  $E(3, -1, 5)$ ,  $F(2, -1, 5)$ ,  $G(2, -3, 5)$ ,  $H(3, -3, 5)$
- 30) em relação a  $Oxyz$ :  $O(0, 0, 0)$ ,  $A(3, 0, 0)$ ,  $B(3, 4, 0)$ ,  $C(0, 4, 5)$ ,  $D(3, 0, 5)$  e  $O'(3, 4, 5)$   
em relação a  $O'x'y'z'$ :  $O(-3, -4, -5)$ ,  $A(0, -4, -5)$ ,  $B(0, 0, -5)$ ,  $C(-3, 0, 0)$ ,  $D(0, -4, 0)$  e  $O'(0, 0, 0)$
- 31) a)  $(5, 7, -9)$                       b)  $(0, -6, 2)$                       c)  $(-1, 7, 9)$                       d)  $(5, -3, -14)$
- 32)  $N(1, -2, -\frac{6}{5})$
- 33)  $D(-2, -6, 8)$
-

- 34)  $a = -\frac{1}{2}$ ,  $b = \frac{7}{4}$ ,  $c = 4$
- 35) a)  $\vec{x} = (\frac{11}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{4}{3})$   
 b)  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = -3$ ,  $a_3 = 1$
- 37) C(6, -1, 3) e D(1, -9, 7)
- 38) (4, -1, -6), (6, 1, 2) e (2, 3, 0)
- 39) (9, 7, 11)
- 40) a)  $(0, -1, \frac{5}{2})$ ,  $(2, -3, 2)$ ,  $(4, -5, \frac{3}{2})$   
 b)  $(\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}, \frac{7}{3})$ ,  $(\frac{10}{3}, -\frac{13}{3}, \frac{5}{3})$
- 41) a) (1, 2, 4)      b) (9, -7, -4)      c) (5, -4, 3)
- 42) a) (x, 0, 0)      c) (x, y, 0)      e) (x, 0, z)      g) (0, 0, z)  
 b) (0, 0, z)      d) (0, y, z)      f) (x, y, 0)      h) (0, y, 0)
- 43) são paralelos:  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  e  $\vec{t}$
- 44)  $a = 9$  e  $b = -15$
- 45) D(0, 1, 0)
- 46) a) sim      b) não      c) sim
- 47)  $m = 5$  e  $n = -13$
- 48) a) D(1, -3, 6)      b) D(2, 1, 3)
- 49)  $\vec{v}$  é unitário
- 50)  $\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$
- 51)  $\pm \frac{1}{3}$
- 52) 3 ou  $-\frac{13}{5}$
- 53)  $\pm 2$
- 54) P(3, 0, 0)
- 55) P(0, 0, 0) ou P(0, 0, -4)
- 56) a) (-6, 3, 9)      b)  $(\frac{8}{\sqrt{14}}, -\frac{4}{\sqrt{14}}, -\frac{12}{\sqrt{14}})$       c)  $(-\frac{10}{\sqrt{14}}, \frac{5}{\sqrt{14}}, \frac{15}{\sqrt{14}})$

## **2 Norma e produto escalar; Projeção ortogonal**

**Solução****Figura 2.15**

A Força  $\vec{F}$  (Figura 2.15) é decomposta em  $\vec{F} = 8\vec{i} + 6\vec{j}$ ; onde  $8 = |\vec{F}| \cos \theta$ ,  $6 = |\vec{F}| \sin \theta$  e  $\vec{d} = 20\vec{i} + 0\vec{j}$ .

O trabalho realizado pela força  $\vec{F}$  pode ser calculado por

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \text{ (produto escalar)}$$

$$W = (8\vec{i} + 6\vec{j}) \cdot (20\vec{i} + 0\vec{j})$$

$$W = 160 \text{ J}$$

ou por

$$W = |\vec{F}| |\vec{d}| \cos \theta$$

$$W = (10\text{N})(20\text{m})(\cos 36,9^\circ)$$

$$W = 160 \text{ J}$$

**Problemas Propostos**

- Dados os vetores  $\vec{u} = (2, -3, -1)$  e  $\vec{v} = (1, -1, 4)$ , calcular
  - $2\vec{u} \cdot (-\vec{v})$
  - $(\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot (\vec{v} - 2\vec{u})$
  - $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$
  - $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$
- Sejam os vetores  $\vec{u} = (2, a, -1)$ ,  $\vec{v} = (3, 1, -2)$  e  $\vec{w} = (2a - 1, -2, 4)$ . Determinar  $a$  de modo que  $\vec{u} \cdot \vec{v} = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} + \vec{w})$ .
- Dados os pontos A (4, 0, -1), B (2, -2, 1) e C (1, 3, 2) e os vetores  $\vec{u} = (2, 1, 1)$  e  $\vec{v} = (-1, -2, 3)$ , obter o vetor  $\vec{x}$  tal que
  - $3\vec{x} + 2\vec{v} = \vec{x} + (\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u})\vec{v}$
  - $(\overrightarrow{BC} \cdot \vec{v})\vec{x} = (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{v} - 3\vec{x}$
- Determinar o vetor  $\vec{v}$ , paralelo ao vetor  $\vec{u} = (2, -1, 3)$ , tal que  $\vec{v} \cdot \vec{u} = -42$ .
- Determinar o vetor  $\vec{v}$ , sabendo que  $|\vec{v}| = 5$ ,  $\vec{v}$  é ortogonal ao eixo Ox,  $\vec{v} \cdot \vec{w} = 6$  e  $\vec{w} = \vec{i} + 2\vec{j}$ .
- Determinar o vetor  $\vec{v}$ , ortogonal ao eixo Oy,  $\vec{v} \cdot \vec{v}_1 = 8$  e  $\vec{v} \cdot \vec{v}_2 = -3$ , sendo  $\vec{v}_1 = (3, 1, -2)$  e  $\vec{v}_2 = (-1, 1, 1)$ .
- Dados os vetores  $\vec{u} = (1, 2, -3)$ ,  $\vec{v} = (2, 0, -1)$  e  $\vec{w} = (3, 1, 0)$ , determinar o vetor  $\vec{x}$  tal que  $\vec{x} \cdot \vec{u} = -16$ ,  $\vec{x} \cdot \vec{v} = 0$  e  $\vec{x} \cdot \vec{w} = 3$ .
- Sabendo que  $|\vec{u}| = 2$ ,  $|\vec{v}| = 3$  e  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$ , calcular
  - $(\vec{u} - 3\vec{v}) \cdot \vec{u}$
  - $(2\vec{v} - \vec{u}) \cdot (2\vec{v})$
  - $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} - 4\vec{u})$
  - $(3\vec{u} + 4\vec{v}) \cdot (-2\vec{u} - 5\vec{v})$

- 9) Calcular  $\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ , sabendo que  $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$ ,  $|\vec{u}| = 2$ ,  $|\vec{v}| = 3$  e  $|\vec{w}| = 5$ .
- 10) Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo equilátero cujo lado mede 20 cm. Calcular  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$  e  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$ .
- 11) O quadrilátero ABCD (Figura 2.16) é um losango de lado 2. Calcular:
- $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$
  - $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
  - $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$
  - $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$
  - $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC}$
  - $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DA}$
- 12) Calcular  $|\vec{u} + \vec{v}|$ ,  $|\vec{u} - \vec{v}|$  e  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ , sabendo que  $|\vec{u}| = 4$ ,  $|\vec{v}| = 3$  e o ângulo entre  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  é de  $60^\circ$ .
- 13) Sabendo que  $|\vec{u}| = \sqrt{2}$ ,  $|\vec{v}| = 3$  e que  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  formam ângulo de  $\frac{3\pi}{4}$  rad, determinar
- $|(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - 2\vec{v})|$
  - $|\vec{u} - 2\vec{v}|$
- 14) Verificar para os vetores  $\vec{u} = (4, -1, 2)$  e  $\vec{v} = (-3, 2, -2)$  as desigualdades
- $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq |\vec{u}| |\vec{v}|$  (Desigualdade de Schwarz)
  - $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$  (Desigualdade Triangular)
- 15) Qual o valor de  $\alpha$  para que os vetores  $\vec{a} = \alpha \vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$  e  $\vec{b} = 2\vec{i} + (1 - 2\alpha)\vec{j} + 3\vec{k}$  sejam ortogonais?
- 16) Dados os vetores  $\vec{a} = (2, 1, \alpha)$ ,  $\vec{b} = (\alpha + 2, -5, 2)$  e  $\vec{c} = (2\alpha, 8, \alpha)$ , determinar o valor de  $\alpha$  para que o vetor  $\vec{a} + \vec{b}$  seja ortogonal ao vetor  $\vec{c} - \vec{a}$ .
- 17) Dados os pontos A(-1, 0, 5), B(2, -1, 4) e C(1, 1, 1), determinar x tal que  $\overrightarrow{AC}$  e  $\overrightarrow{BP}$  sejam ortogonais, sendo P (x, 0, x - 3).
- 18) Provar que os pontos A(-1, 2, 3), B(-3, 6, 0) e C(-4, 7, 2) são vértices de um triângulo retângulo.
- 19) Dados os pontos A(m, 1, 0), B(m - 1, 2m, 2) e C(1, 3, -1), determinar m de modo que o triângulo ABC seja retângulo em A. Calcular a área do triângulo.
- 20) Encontrar os vetores unitários paralelos ao plano yOz e que são ortogonais ao vetor  $\vec{v} = (4, 1, -2)$ .
- 21) Determinar o vetor  $\vec{u}$  tal que  $|\vec{u}| = 2$ , o ângulo entre  $\vec{u}$  e  $\vec{v} = (1, -1, 0)$  é  $45^\circ$  e  $\vec{u}$  é ortogonal a  $\vec{w} = (1, 1, 0)$ .




Figura 2.16

- 22) Seja o vetor  $\vec{v} = (2, -1, 1)$ . Obter
- um vetor ortogonal a  $\vec{v}$ ;
  - um vetor unitário ortogonal a  $\vec{v}$ ;
  - um vetor de módulo 4 ortogonal a  $\vec{v}$ .
- 23) Sendo  $\vec{a} \perp \vec{b}$ ,  $|\vec{a}| = 6$  e  $|\vec{b}| = 8$ , calcular  $|\vec{a} + \vec{b}|$  e  $|\vec{a} - \vec{b}|$ .
- 24) Demonstrar que sendo  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  vetores dois a dois ortogonais, então
- $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$ .
  - $|\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + |\vec{w}|^2$ .
- 25) Determinar o ângulo entre os vetores
- $\vec{u} = (2, -1, -1)$  e  $\vec{v} = (-1, -1, 2)$ .
  - $\vec{u} = (1, -2, 1)$  e  $\vec{v} = (-1, 1, 0)$ .
- 26) Seja o triângulo de vértices  $A(3, 4, 4)$ ,  $B(2, -3, 4)$  e  $C(6, 0, 4)$ . Determinar o ângulo interno ao vértice B. Qual o ângulo externo ao vértice B?
- 27) Calcular os ângulos internos do triângulo de vértices  $A(2, 1, 3)$ ,  $B(1, 0, -1)$  e  $C(-1, 2, 1)$ .
- 28) Calcular o valor de  $m$  de modo que seja  $120^\circ$  o ângulo entre os vetores  $\vec{u} = (1, -2, 1)$  e  $\vec{v} = (-2, 1, m + 1)$ .
- 29) Calcular  $n$  para que seja de  $30^\circ$  o ângulo entre os vetores  $\vec{v} = (-3, 1, n)$  e  $\vec{k}$ .
- 30) Se  $|\vec{u}| = 4$ ,  $|\vec{v}| = 2$  e  $120^\circ$  o ângulo entre os vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ , determinar o ângulo entre  $\vec{u} + \vec{v}$  e  $\vec{u} - \vec{v}$  e construir uma figura correspondente a estes dados.
- 31) Seja o cubo de aresta  $a$  representado na Figura 2.17. Determinar:
- $\vec{OA} \cdot \vec{OC}$
  - $\vec{OA} \cdot \vec{OD}$
  - $\vec{OE} \cdot \vec{OB}$
  - $|\vec{OB}|$  e  $|\vec{OG}|$
  - $\vec{EG} \cdot \vec{CG}$
  - $(\vec{ED} \cdot \vec{AB}) \cdot \vec{OG}$
  - o ângulo agudo entre a diagonal do cubo e uma aresta;
  - o ângulo agudo formado por duas diagonais do cubo.
- 32) Calcular os ângulos diretores do vetor  $\vec{v} = (6, -2, 3)$ .
- 33) Os ângulos diretores de um vetor  $\vec{a}$  são  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  e  $120^\circ$  e  $|\vec{a}| = 2$ . Determinar  $\vec{a}$ .
- 34) Os ângulos diretores de um vetor podem ser de  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  e  $90^\circ$ ? Justificar.
- 35) Mostrar que existe um vetor cujos ângulos diretores são  $30^\circ$ ,  $90^\circ$  e  $60^\circ$ , respectivamente, e determinar aquele que tem módulo 10.




Figura 2.17

- 36) Determinar um vetor unitário ortogonal ao eixo Oz e que forme  $60^\circ$  com o vetor  $\vec{i}$ .
- 37) Determinar o vetor  $\vec{a}$  de módulo 5, sabendo que é ortogonal ao eixo Oy e ao vetor  $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{k}$ , e forma ângulo obtuso com o vetor  $\vec{i}$ .
- 38) Determinar o vetor  $\vec{v}$  nos casos
- $\vec{v}$  é ortogonal ao eixo Oz,  $|\vec{v}| = 8$ , forma ângulo de  $30^\circ$  com o vetor  $\vec{i}$  e ângulo obtuso com  $\vec{j}$ ;
  - $\vec{v}$  é ortogonal ao eixo Ox,  $|\vec{v}| = 2$ , forma ângulo de  $60^\circ$  com o vetor  $\vec{j}$  e ângulo agudo com  $\vec{k}$ .
- 39) O vetor  $\vec{v}$  é ortogonal aos vetores  $\vec{u} = (1, 2, 0)$  e  $\vec{w} = (2, 0, 1)$  e forma ângulo agudo com o vetor  $\vec{j}$ . Determinar  $\vec{v}$ , sabendo que  $|\vec{v}| = \sqrt{21}$ .
- 40) Dados os vetores  $\vec{u} = (3, 0, 1)$  e  $\vec{v} = (-2, 1, 2)$ , determinar  $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$  e  $\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v}$ .
- 41) Determinar os vetores projeção de  $\vec{v} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$  sobre os eixos cartesianos x, y e z.
- 42) Para cada um dos pares de vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ , encontrar a projeção ortogonal de  $\vec{v}$  sobre  $\vec{u}$  e decompor  $\vec{v}$  como soma de  $\vec{v}_1$  com  $\vec{v}_2$ , sendo  $\vec{v}_1 \parallel \vec{u}$  e  $\vec{v}_2 \perp \vec{u}$ .
- $\vec{u} = (1, 2, -2)$  e  $\vec{v} = (3, -2, 1)$
  - $\vec{u} = (1, 1, 1)$  e  $\vec{v} = (3, 1, -1)$
  - $\vec{u} = (2, 0, 0)$  e  $\vec{v} = (3, 5, 4)$
  - $\vec{u} = (3, 1, -3)$  e  $\vec{v} = (2, -3, 1)$
- 43) Sejam  $A(2, 1, 3)$ ,  $B(m, 3, 5)$  e  $C(0, 4, 1)$  vértices de um triângulo (Figura 2.18).
- Para que valor de m o triângulo ABC é retângulo em A?
  - Calcular a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC.
  - Determinar o ponto H, pé da altura relativa ao vértice A.
  - Mostrar que  $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$ .
- 44) Determinar o valor de k para que os vetores  $\vec{u} = (-2, 3)$  e  $\vec{v} = (k, -4)$  sejam
- paralelos;
  - ortogonais.
- 45) Obter os dois vetores unitários ortogonais a cada um dos vetores
- $4\vec{i} + 3\vec{j}$
  - $(-2, 3)$
  - $(-1, -1)$




Figura 2.18



- 46) Determinar um par de vetores unitários e ortogonais entre si, em que um deles seja paralelo a  $\vec{v} = 6\vec{i} + 8\vec{j}$ .
- 47) Determinar, aproximadamente, o ângulo entre os pares de vetores
- $\vec{u} = (2, 1)$  e  $\vec{v} = (4, -2)$
  - $\vec{u} = (1, -1)$  e  $\vec{v} = (-4, -2)$
  - $\vec{u} = (1, 1)$  e  $\vec{v} = (-1, 1)$
- 48) Dados os vetores  $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j}$  e  $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j}$ , determinar o módulo e o ângulo que os seguintes vetores formam com o vetor  $\vec{i}$ :
- $\vec{u}$
  - $\vec{v}$
  - $\vec{u} + \vec{v}$
  - $\vec{u} - \vec{v}$
  - $\vec{v} - \vec{u}$
- 49) Determinar o valor de  $a$  para que seja  $45^\circ$  o ângulo entre os vetores  $\vec{u} = (2, 1)$  e  $\vec{v} = (1, a)$ .
- 50) Para cada um dos pares de vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ , encontrar o vetor projeção ortogonal de  $\vec{v}$  sobre  $\vec{u}$  e decompor  $\vec{v}$  como soma de  $\vec{v}_1$  com  $\vec{v}_2$ , sendo  $\vec{v}_1 \parallel \vec{u}$  e  $\vec{v}_2 \perp \vec{u}$ .
- $\vec{u} = (1, 0)$  e  $\vec{v} = (4, 3)$
  - $\vec{u} = (1, 1)$  e  $\vec{v} = (2, 5)$
  - $\vec{u} = (4, 3)$  e  $\vec{v} = (1, 2)$

### Respostas de Problemas Propostos

- 2
    - 21
    - 4
    - 4
  - $a = \frac{5}{8}$
  - $(3, 6, -9)$
    - $(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1)$
  - $(-6, 3, -9)$
  - $(0, 3, 4)$  ou  $(0, 3, -4)$
  - $(2, 0, -1)$
  - $\vec{x} = (2, -3, 4)$
  - 7
    - 38
    - 4
    - 181
  - 19
  - 200 e -200
  - 0
    - 2
    - 2
    - 2
    - 4
    - 4
  - $\sqrt{37}, \sqrt{13}$  e 7
  - 37
    - $\sqrt{50}$
  - 5
-

- 16) 3 ou -6
- 17)  $x = \frac{25}{2}$
- 18)  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$
- 19)  $m = 1$  e  $\frac{\sqrt{30}}{2}$
- 20)  $(0, \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}})$  ou  $(0, -\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}})$
- 21)  $(1, -1, \sqrt{2})$  ou  $(1, -1, -\sqrt{2})$
- 22) a) Dentre os infinitos possíveis:  $(1, 1, -1)$   
 b) Um deles:  $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$   
 c) Um deles:  $(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}, -\frac{4}{\sqrt{3}})$
- 23) 10 e 10
- 25) a)  $120^\circ$                       b)  $150^\circ$
- 26)  $45^\circ$  e  $135^\circ$
- 27)  $\hat{A} \cong 50^\circ 57'$ ,  $\hat{B} \cong 57^\circ 1'$ ,  $\hat{C} \cong 72^\circ 2'$
- 28) 0 ou -18
- 29)  $\sqrt{30}$
- 30)  $\arccos \frac{3}{\sqrt{21}} \cong 49^\circ 6'$
- 31) a) 0                      c) 0                      e)  $a^2$                       g)  $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3} \cong 54^\circ 44'$   
 b) 0                      d)  $a\sqrt{2}$  e  $a\sqrt{3}$                       f)  $(a^3, a^3, a^3)$                       h)  $\arccos (\frac{1}{3}) \cong 70^\circ 31'$
- 32)  $\alpha = \arccos (\frac{6}{7}) \cong 31^\circ$                        $\beta = \arccos (-\frac{2}{7}) \cong 107^\circ$   
 $\gamma = \arccos (\frac{3}{7}) \cong 65^\circ$
- 33)  $\vec{a} = (\sqrt{2}, 1, -1)$
- 34) Não,  $\cos^2 45^\circ + \cos^2 60^\circ + \cos^2 90^\circ \neq 1$
- 35)  $(5\sqrt{3}, 0, 5)$
- 36)  $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$  ou  $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$

- 37)  $\vec{a} = (-2\sqrt{5}, 0, -\sqrt{5})$
- 38) a)  $(4\sqrt{3}, -4, 0)$  b)  $(0, 1, \sqrt{3})$
- 39)  $(-2, 1, 4)$
- 40)  $(\frac{8}{9}, -\frac{4}{9}, -\frac{8}{9})$  e  $(-\frac{6}{5}, 0, -\frac{2}{5})$
- 41)  $4\vec{i}, -3\vec{j}, 2\vec{k}$
- 42) a)  $\vec{v}_1 = (-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ,  $\vec{v}_2 = (\frac{10}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$   
 b)  $\vec{v}_1 = (1, 1, 1)$  e  $\vec{v}_2 = (2, 0, -2)$   
 c)  $\vec{v}_1 = (3, 0, 0)$  e  $\vec{v}_2 = (0, 5, 4)$   
 d)  $\vec{v}_1 = (0, 0, 0)$  ( $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  são ortogonais) e  $\vec{v}_2 = \vec{v}$
- 43) a)  $m = 3$  b)  $\frac{9}{26}\sqrt{26}$  c)  $H(\frac{51}{26}, \frac{87}{26}, \frac{94}{26})$
- 44) a)  $\frac{8}{3}$  b)  $-6$
- 45) a)  $(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$  e  $(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  b)  $(\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}})$  e  $(-\frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{2}{\sqrt{13}})$   
 c)  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$  e  $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$
- 46)  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  e  $(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$  ou  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  e  $(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$
- 47) a)  $\arccos(\frac{3}{5}) \cong 53^\circ$  b)  $\arccos(-\frac{1}{\sqrt{10}}) \cong 108^\circ$  c)  $90^\circ$
- 48) a)  $\sqrt{2}, 45^\circ$  d)  $\sqrt{5}, \arccos(-\frac{1}{\sqrt{5}}) \cong 117^\circ$   
 b)  $\sqrt{5}, \arccos(\frac{2}{\sqrt{5}}) \cong 26^\circ$  e)  $\sqrt{5}, \arccos(\frac{1}{\sqrt{5}}) \cong 63^\circ$   
 c)  $3, 0^\circ$
- 49)  $3$  ou  $-\frac{1}{3}$
- 50) a)  $\vec{v}_1 = (4, 0), \vec{v}_2 = (0, 3)$  c)  $\vec{v}_1 = (\frac{8}{5}, \frac{6}{5}), \vec{v}_2 = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$   
 b)  $\vec{v}_1 = (\frac{7}{2}, \frac{7}{2}), \vec{v}_2 = (-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$
-