สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-1192

<u>ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ก่อนการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี (^{131}I) ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล</u>

1. หยุดยาไทรอยด์ฮอร์โมน (Euthyrox) 4-6 สัปดาห์
   หลังจากหยุดยา ผู้ป่วยอาจมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีอาการเหล่านี้
   - เหนื่อยง่าย อ่อนแรง
   - ใจสั่น
   - อ้วนขึ้น ทั้งๆที่รับประทานไม่มาก
   - บวม ที่ใบหน้า รอบดวงตา ลำตัว แขน และขา
   - เฉื่อยชา ทำงานช้า คิดช้า ขาดสมาธิ ความจำไม่ดี
   - ง่วงนอนตลอดเวลา
   - ท้องผูก ฯลฯ
2. งดอาหารและยาที่มีไอโอดีนสูง 2 สัปดาห์
   ตัวอย่างอาหารที่มีไอโอดีนต่ำ
   - ผักสด
   - เนื้อสด

   <u>งด อาหารทะเลทุกชนิด ทั้งสดและแห้ง</u>
   - เบเกอรี่ทุกชนิด
   - ผัก ผลไม้ดองทุกชนิด
   - เครื่องปรุงรส น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสหอย เกลือ
   - อาหารที่เติมไอโอดีน
3. ในผู้ป่วยสตรี วัยเจริญพันธ์ ให้คุมกำเนิด ก่อนมารักษา จนถึง 6 เดือน หลังรักษาด้วยไอโอดีนรังสี
4. ในมารดาที่ให้นมบุตร งดให้นมบุตรเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่มารักษาด้วยไอโอดีนรังสี