envYura

Plantas susceptibles de uso sostenible en la zona andina de la provincia de Cotopaxi, Ecuador

Marcelo F. Amores Palma

septiembre, 2026



Libro construido con Quarto.

Por: Marcelo F. Amores Palma

© ENVINATU. Todos los derechos reservados.

Índice

Presentación **1**

1 Alstroemerieae **3**
1.1 *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb. . . . 3
Referencias . . . 5

2 Amaranthaceae **7**
2.1 *Alternanthera porrigens* (Jacq.) Kuntze . . . 7
2.2 *Amaranthus asplundii* Thell. . . . 8
2.3 *Amaranthus hybridus* L. . . . 9
2.4 *Guilleminea densa* (Willd.) Moq. . . . 10
Referencias . . . 12

3 Amaryllidaceae **13**
3.1 *Stenomesson aurantiacum* (Kunth) Herb. . . . 13

4 Apiaceae **15**
4.1 *Stenomesson aurantiacum* (Kunth) Herb. . . . 15

5 Araliaceae **17**
Referencias . . . 17

6 Aspleniaceae **19**
Referencias . . . 19

7 Asteraceae **21**
Referencias . . . 21

8 Berberidaceae **23**
Referencias . . . 23

9 Brassicaceae **25**
Referencias . . . 25

10 Bromeliaceae **27**
Referencias . . . 27

11 Calceolariaceae **29**
Referencias . . . 29

12 Campanulaceae **31**
Referencias 31

13 Caprifoliaceae **33**
Referencias 33

14 Caryophyllaceae **35**
Referencias 35

15 Coriariaceae **37**
Referencias 37

16 Cyperaceae **39**
Referencias 39

17 Dryopteridaceae **41**
Referencias 41

18 Elaeocarpaceae **43**
Referencias 43

19 Ephedraceae **45**
Referencias 45

20 Equisetaceae **47**
Referencias 47

21 Ericaceae **49**
Referencias 49

22 Escalloniaceae **51**
Referencias 51

23 Euphorbiaceae **53**
Referencias 53

24 Fabaceae **55**
Referencias 55

25 Gentianaceae **57**
Referencias 57

26 Geraniaceae **59**
Referencias 59

27 Grossulariaceae **61**
Referencias 61

28 Gunneraceae **63**
Referencias 63

29 Hypericaceae **65**
Referencias 65

30 Iridaceae **67**
Referencias 67

31 Juncaceae **69**
Referencias 69

32 Lamiaceae **71**
Referencias 71

33 Loranthaceae **73**
Referencias 73

34 Lycopodiaceae **75**
Referencias 75

35 Malvaceae **77**
Referencias 77

36 Melastomataceae **79**
Referencias 79

37 Montiaceae **81**
Referencias 81

38 Myricaceae **83**
Referencias 83

39 Onagraceae **85**
Referencias 85

40 Orchidaceae **87**
Referencias 87

41 Orobanchaceae **89**
Referencias 89

42 Oxalidaceae **91**
Referencias 91

43 Passifloraceae **93**
Referencias 93

44 Phrymaceae **95**
Referencias 95

45 Piperaceae **97**
Referencias 97

46 Plantaginaceae **99**
Referencias 99

47 Poaceae **101**
Referencias 101

48 Polygonaceae **103**
Referencias 103

49 Ranunculaceae **105**
Referencias 105

50 Rosaceae **107**
Referencias 107

51 Rubiaceae **109**
Referencias 109

52 Scrophulariaceae **111**
Referencias 111

53 Solanaceae **113**
Referencias 113

54 Violaceae **115**
Referencias 115

Listado de Figuras

1.1 Distribución de *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb. 4
1.2 Registros fotográficos de *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb. 5

2.1 Registros fotográficos de *Alternanthera porrigens* (Jacq.) Kuntze 8
2.2 Registros fotográficos de *Amaranthus asplundii* Thell. 9
2.3 Registro fotográfico de *Amaranthus cruentus* L. 11
2.4 Registros fotográficos de *Guilleminea densa* (Willd.) Moq. 12

Listado de Tablas

Presentación

Ecuador alberga una de las concentraciones de diversidad biológica y genética más notables del planeta, un patrimonio natural que alcanza una expresión singular y fascinante en los ecosistemas de la zona central de los Andes ecuatorianos. La presente obra constituye el resultado integral de un esfuerzo macro de investigación, monitoreo y síntesis científica, guiado por dos pilares fundamentales: el conocimiento y la conservación de la biodiversidad para su uso sostenible, y el ejercicio de una ciencia abierta, accesible y colaborativa. Bajo un marco metodológico adaptado para comprender los constantes cambios espacio-temporales en la distribución de las especies, este proyecto articula la documentación biológica con proyecciones de monitoreo continuo y una comunicación pedagógica y permanente, buscando vincular el rigor científico con la sensibilización y el beneficio directo de la sociedad.

1 Alstroemerieae

1.1. *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb.

Planta comunmente conocida como: Ishpapuru, Manka paki, Aya manzana, Achiotillo, Papa monte, Veneno de perro, Laytu, Ligtu.

Susceptibilidad de uso y aprovechamiento sostenible

Tóxico para vertebrados:

- El fruto y las semillas contienen una sustancia tóxica, que puede causar la muerte a animales medianos (perros) y grandes, incluso al hombre.

Medicinal:

- Se usa para tratar “pegados” (sic) del seno.
- Trata afecciones indeterminadas.



Figura 1.1: Distribución de *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb., registrada en GBIF, consultado el 03-09-2026

Bomarea multiflora (L.f.) Mirb. ha sido registrada en las siguientes áreas geográficas: Colombia; Ecuador.



(a) *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb. observada en Tanicuchi, Ecuador por Marcelo Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/263432122



(b) *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb. observada en Toacaso, Ecuador por Marcelo Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/147781902

Figura 1.2: Registros fotográficos de *Bomarea multiflora* (L.f.) Mirb.

[1] [2]

Referencias

2 Amaranthaceae

2.1. *Alternanthera porrigens* (Jacq.) Kuntze

Planta comunmente conocida como: Sikchus, Clavel, Moradilla, Moradilla blanca, Moradilla morada, Moradilla rosada, Troturo, Verbena de monte, Managafaqui, Telba.

Susceptibilidad de uso y aprovechamiento sostenible

Medicinal:

- La flor, en infusión, se bebe para tratar cólicos.
- Se usa como expectorante y para tratar afecciones hepáticas y renales.
- La flor se usa para tratar la tos.
- La flor en infusión, se toma como emenagogo.
- La horchata se usa como diurético.
- La horchata se bebe, en cocción junto con "ataco" (Amaranthus sp.), una rama de ruda (Ruta graveolens), flores de alfalfa (Medicago sativa), azúcar y alcohol de caña, durante la menstruación.
- La infusión de la flor y hojas, mezclada con toronjil y manzanilla, se bebe para tratar el dolor de riñones.
- La infusión de la planta detiene el sangrado de las mujeres después del parto.
- La infusión de la planta sola o mezclada con taraxaco, llantén escancel, caballo chupa, y calaguala, se usa para tratar afecciones del hígado y riñones, así como para regular la menstruación y para aliviar malestares femeninos.
- La planta, en infusión junto con otras especies, se usa para regular la menstruación.
- La raíz se usa para curar la diabetes.
- La planta, en infusión, se usa para tratar afecciones del hígado y de los riñones.
- Las hojas machacadas con agua se ingieren para tratar los dolores de cabeza causados por el frío.
- Es cicatrizante.
- Para detener las hemorragias.
- Se dice que el zumo puede curar el cáncer.
- Las hojas se aplican en un emplasto para aliviar golpes.

- Para tratar afecciones indeterminadas.

Social:

- Se usa para limpiar el "mal aire" y curar el "espanto".
- Junto con Guilleminea densa, Amaranthus hybridus, Margyricarpus pinnatus, Asplenium monanthes y Muehlenbeckia tamnifolia, es útil para las mujeres después del parto como lavador de sangre.



(a) *Alternanthera porrigens* (Jacq.) Kuntze observada en Latacunga, Ecuador por Marcelo Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/345739262



(b) *Alternanthera porrigens* (Jacq.) Kuntze observada en Latacunga, Ecuador por Marcelo Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/334766621

Figura 2.1: Registros fotográficos de *Alternanthera porrigens* (Jacq.) Kuntze

2.2. *Amaranthus asplundii* Thell.

Planta comunmente conocida como: Ataco, Ataku de castilla, Bledo, Bledo blanco, Bledo macho, Bledo negro, Salig.

Susceptibilidad de uso y aprovechamiento sostenible

Alimenticio:

- El fruto y las hojas tiernas son comestibles, se usan en la preparación de coladas, ensaladas y morcillas de chancho.

Medicinal:

- El zumo de la raíz machacada se usa para tratar el malestar producido por los cólicos.
- La flor en infusión y mezclada con aguardiente, se usa para tratar el resfrío.
- La infusión de la raíz se bebe para tratar el colerín.
- La raíz machacada se usa para tratar la holanda (enfermedad causada por un virus), ampollas e inflamaciones en la boca.
- Es carminativa.
- La decocción de la raíz se bebe para tratar la diarrea en los niños.



(a) *Amaranthus asplundii* Thell. observada en Tanicuchi, Ecuador por Marcelo Amores Palma68RM+M3, Tanicuchi, Ecuador por Marcelo Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/144882591

(b) *Amaranthus asplundii* Thell. observada en (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/141982960

Figura 2.2: Registros fotográficos de *Amaranthus asplundii* Thell.

2.3. *Amaranthus hybridus* L.

Planta comunmente conocida como: Ataku, Sankurachi, Ataco, Bledo.

Susceptibilidad de uso y aprovechamiento sostenible

Alimenticio:

- Las hojas son comestibles, se consumen fritas con maní, en encurtidos y en ensaladas.

Aditivo de los alimentos:

- La flor y las hojas se usan como colorante en la preparación de la colada morada, durante la fiesta de los difuntos.
- Se mezcla con harina de maíz negro y se fermenta.
- Se usa como colorante de mermeladas, como condimento y para preparar embutidos de cerdo (morcillas).

Materiales:

- La flor hervida y mezclada con "puma maki", se usa como tinte.

Social:

- La planta en infusión, se usa para limpiar la sangre.
- Junto con Guilleminea densa, Alternanthera porrigens, Margyricarpus pinnatus, Asplenium monanthes y Muehlenbeckia tamnifolia, es útil para las mujeres después del parto como lavador de sangre.

Medicinal:

- La planta entera en infusión, se usa para tratar ataques.
- La planta entera en infusión, se usa para controlar los nervios.
- La planta entera en infusión, se usa para purgar a las personas que tienen muchos granos y espinillas.
- Es carminativo.
- Útil para regular la menstruación.
- Se emplea para tratar afecciones del corazón.
- La infusión de la planta se toma con miel para tratar la "inflamación del frío".
- Es utilizada para tratar la diarrea.
- Es utilizada para purgar a fin de limpiar el sistema digestivo.

2.4. *Guilleminea densa* (Willd.) Moq.

Planta comunmente conocida como: Kuchi ataku, Sankiwana, Alfombrilla, Felpa, Sanguinaria, Huagroma.

Susceptibilidad de uso y aprovechamiento sostenible

Medicinal:

- La infusión de la planta, en particular de las raíces, se usa para aliviar malestares femeninos y para regular la sangre.



Figura 2.3: *Amaranthus cruentus* L. observada en Tanicuchi, Ecuador por Marcelo Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/71943648

- Junto con Alternanthera porrigens, Amaranthus hybridus, Margyricarpus pinnatus, Asplenium monanthes y Muehlenbeckia tamnifolia, es útil para las mujeres después del parto como lavador de sangre.



(a) *Guilleminea densa* (Willd.) Moq. observada en Once de Noviembre y Latacunga, Ecuador por MarceloDanecu y Santiago Zamora, Ecuador por Marcelo Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/146479259 **(b)** *Guilleminea densa* (Willd.) Moq. observada en Amores Palma (Licencia: CC BY-NC 4.0). https://www.inaturalist.org/observations/146446385

Figura 2.4: Registros fotográficos de *Guilleminea densa* (Willd.) Moq.

[1] [2]

Referencias

3 Amaryllidaceae

3.1. *Stenomesson aurantiacum* (Kunth) Herb.

Susceptibilidad de uso y aprovechamiento sostenible

Medicinal:

- Los vástagos de la planta contienen sustancias, todavía no identificadas, que actúan como purgantes drásticos.

4 Apiaceae

4.1. *Stenomesson aurantiacum* (Kunth) Herb.

Susceptibilidad de uso y aprovechamiento sostenible

Medicinal:

- Los vástagos de la planta contienen sustancias, todavía no identificadas, que actúan como purgantes drásticos.

5 Araliaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

6 Aspleniaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

7 Asteraceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

8 Berberidaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

9 Brassicaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

10 Bromeliaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

11 Calceolariaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

12 Campanulaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

13 Caprifoliaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

14 Caryophyllaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

15 Coriariaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

16 Cyperaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

17 Dryopteridaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

18 Elaeocarpaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

19 Ephedraceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

20 Equisetaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

21 Ericaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

22 Escalloniaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

23 Euphorbiaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

24 Fabaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

25 Gentianaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

26 Geraniaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

27 Grossulariaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

28 Gunneraceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

29 Hypericaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

30 Iridaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

31 Juncaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

32 Lamiaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

33 Loranthaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

34 Lycopodiaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

35 Malvaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

36 Melastomataceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

37 Montiaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

38 Myricaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

39 Onagraceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

40 Orchidaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

41 Orobanchaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

42 Oxalidaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

43 Passifloraceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

44 Phrymaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

45 Piperaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

46 Plantaginaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

47 Poaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

48 Polygonaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

49 Ranunculaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

50 Rosaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

51 Rubiaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

52 Scrophulariaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

53 Solanaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

54 Violaceae

En desarrollo...

[1][2]

Referencias

1. de la Torre, L., Navarrete, H., Muriel M., P., Macía, M. J., & Balslev, H. (Eds.). (2008). *Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador*. Herbario QCA de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador & Herbario AAU del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aarhus. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/b80ee8d6-b073-4788-b63e-176042ec952d/content
2. Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador - MAE. (2025). *Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador*. Checklist dataset via GBIF.org. https://doi.org/10.60545/eifqjo