

4. Se considera un octaedro regular de arista 1 cm. Determine las dimensiones del cilindro de revolución de volumen máximo inscrito en dicho octaedro y cuyo eje está sobre una diagonal.

Este problema figura resuelto en la página 34 del volumen 1 y es el problema 10.7 del volumen 5 de Problemas de Oposiciones de Editorial Deimos.

SOLUCIÓN: Deben calcularse el radio r y la altura h del cilindro de mayor volumen entre los inscritos en el octaedro como se indica en la figura adjunta. El volumen del cilindro vale:


$$V(r, h) = \pi r^2 h$$

Intentamos encontrar una relación entre las variables r y h que permitan escribir el volumen del cilindro en función de una sólo de ellas para derivar esta expresión.

El cilindro toca a cada cara del octaedro, que es un triángulo equilátero, en un único punto situado en una altura de dicho triángulo. En la figura, el cilindro toca a la cara ABC del octaedro sólo en el punto Q .

Si M es el punto medio de la arista BC , la altura AM mide, como todas las alturas de todas las caras del tetraedro, en virtud del *Teorema de Pitágoras*,

$$AM = \sqrt{AB^2 - BM^2} = \sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$




De aquí se deduce inmediatamente la mitad de la altura del octaedro, que es

$$OA = \sqrt{AM^2 - OM^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Por la semejanza de los triángulos PQA y OMA , se tiene que $\frac{PQ}{OM} = \frac{PA}{OA}$, es decir,

$$\frac{r}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{h}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \quad \text{o bien,} \quad r = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{2}}\right)$$



Para que pueda hablarse de cilindro, es obvio que la altura h de éste debe ser positiva y menor que la altura del octaedro, que es $2 \cdot OA = \sqrt{2}$. Se trata por tanto de calcular, caso de existir, el mínimo absoluto de la función $V : (0, \sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$V(h) = \pi r^2 h = \pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(1 - \frac{h}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot h = \frac{\pi h}{8} (\sqrt{2} - h)^2$$

La función V es derivable en todo el intervalo $(0, \sqrt{2})$ y para cada h de dicho intervalo es

$$V'(h) = \frac{\pi}{8} (\sqrt{2} - h)(\sqrt{2} - 3h)$$

Resulta así que $V'(h)=0$ sólo cuando $h=\frac{\sqrt{2}}{3}$, y es inmediato que $V'(h)>0$ si $0<h<\frac{\sqrt{2}}{3}$ y que $V'(h)<0$ si $\frac{\sqrt{2}}{3}<h<\sqrt{2}$. Es así que V es estrictamente creciente en el intervalo $(0,\frac{\sqrt{2}}{3})$ y estrictamente decreciente en el intervalo $(\frac{\sqrt{2}}{3},\sqrt{2})$, por lo que V alcanza máximo absoluto en $h=\frac{\sqrt{2}}{3}$. De ello se desprende que el cilindro de volumen máximo inscrito en el octaedro de arista 1 es el de altura $h=\frac{\sqrt{2}}{3}$ y radio $r=\frac{1}{2}\left(1-\frac{h}{\sqrt{2}}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$.

El volumen de dicho cilindro es

$$V\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)=\frac{\pi\sqrt{2}}{24}\cdot\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2=\frac{\pi\sqrt{2}}{27}$$