Análisis factorial-pssicología

Edgar Ortiz Mota

2022-05-09

```
 #descarga de paquetes y librerias
install.packages("psych")
library(psych)


install.packages("polycor")
library(polycor)
```

1.- Lectura de la matriz de datos

```
x<-as.data.frame(state.x77)
```

2.- Quitar los espacios de los nombres

```
colnames(x)[4]="Life.Exp"
colnames(x)[6]= "HS.Grad"
```

3.- Separa n (estados) y p (variables)

```
 n<-dim(x)[1]
p<-dim(x)[2]
```

4.- Generacion de un scater plot para la visualización de variables originales.

```
pairs(x, col="blue", pch=19, main="matriz original")
```



Transformación de algunas variables

1.- Aplicamos logaritmo para las columnas 1,3 y 8

```
x[,1]<-log(x[,1])
colnames(x)[1]<-"Log-Population"

x[,3]<-log(x[,3])
colnames(x)[3]<-"Log-Illiteracy"

x[,8]<-log(x[,8])
colnames(x)[8]<-"Log-Area"
```

Grafico scater para la visualizacion de la matriz original con 3 variables que se incluyeron

```
pairs(x,col="blue", pch=19, main="Matriz original")
```



Nota: Como las variables tiene diferentes unidades de medida, se va a implementar la matriz de correlaciones para estimar la matriz de carga

#————————————-Reduccion de la dimensionalidad Análsis Factorial de componentes principales (PCFA) ——————————

1.- Calcular la matriz de medias y de correlaciones Matriz de medias

```
mu<-colMeans(x)
mu
```

```
## Log-Population         Income Log-Illiteracy       Life.Exp         Murder
##   7.863443e+00   4.435800e+03   3.128251e-02   7.087860e+01   7.378000e+00
##        HS.Grad          Frost       Log-Area
##   5.310800e+01   1.044600e+02   1.066237e+01
```

Matriz de correlaciones

```
R<-cor(x)
R
```

```
##                Log-Population       Income Log-Illiteracy   Life.Exp     Murder
## Log-Population     1.00000000  0.034963788     0.28371749 -0.1092630  0.3596542
## Income             0.03496379  1.000000000    -0.35147773  0.3402553 -0.2300776
## Log-Illiteracy     0.28371749 -0.351477726     1.00000000 -0.5699943  0.6947320
## Life.Exp          -0.10926301  0.340255339    -0.56999432  1.0000000 -0.7808458
## Murder             0.35965424 -0.230077610     0.69473198 -0.7808458  1.0000000
## HS.Grad           -0.32211720  0.619932323    -0.66880911  0.5822162 -0.4879710
## Frost             -0.45809012  0.226282179    -0.67656232  0.2620680 -0.5388834
## Log-Area           0.08541473 -0.007462068    -0.05830524 -0.1086351  0.2963133
##                   HS.Grad       Frost     Log-Area
## Log-Population -0.3221172 -0.45809012  0.085414734
## Income          0.6199323  0.22628218 -0.007462068
```

```
## Log-Illiteracy -0.6688091 -0.67656232 -0.058305240
## Life.Exp        0.5822162  0.26206801 -0.108635052
## Murder         -0.4879710 -0.53888344  0.296313252
## HS.Grad         1.0000000  0.36677970  0.196743429
## Frost           0.3667797  1.00000000 -0.021211992
## Log-Area        0.1967434 -0.02121199  1.000000000
```

2.- Reducción de la dimensionalidad mediante

#Análisis factorial de componentes principales (PCFA).

1.- Calcular los valores y vectores propios.

```
eR<-eigen(R)
```

2.- Valores propios

```
eigen.val<-eR$values
eigen.val
```

```
## [1] 3.6796976 1.3201021 1.1357357 0.7517550 0.6168266 0.2578511 0.1366186
## [8] 0.1014132
```

3.- Vectores propios

```
eigen.vec<-eR$vectors
eigen.vec
```

```
##             [,1]        [,2]        [,3]       [,4]        [,5]       [,6]
## [1,] -0.23393451 -0.41410075  0.50100922  0.2983839  0.58048485  0.0969034
## [2,]  0.27298977 -0.47608715  0.24689968 -0.6449631  0.09036625 -0.3002708
## [3,] -0.45555443  0.04116196  0.12258370 -0.1824471 -0.32684654 -0.6084112
## [4,]  0.39805075 -0.04655529  0.38842376  0.4191134 -0.26287696 -0.3565095
## [5,] -0.44229774 -0.27640285 -0.21639177 -0.2610739  0.02383706  0.1803894
## [6,]  0.41916283 -0.36311753 -0.06807465 -0.1363534 -0.34015424  0.3960855
## [7,]  0.36358674  0.21893783 -0.37542494 -0.1299519  0.59896253 -0.3507630
## [8,] -0.03545293 -0.58464797 -0.57421867  0.4270918 -0.06252285 -0.3012063
##            [,7]        [,8]
## [1,] -0.1777562 -0.23622413
## [2,]  0.3285840  0.12483849
## [3,] -0.3268997 -0.39825363
## [4,] -0.3013983  0.47519991
## [5,] -0.4562245  0.60970476
## [6,] -0.4808140 -0.40675672
## [7,] -0.4202943 -0.06001175
## [8,]  0.2162424 -0.05831177
```

4.- Calcular la proporcion de variabilidad

```
prop.var<-eigen.val/sum(eigen.val)
prop.var
```

```
## [1] 0.45996220 0.16501277 0.14196697 0.09396938 0.07710332 0.03223139 0.01707733
## [8] 0.01267665
```

5.- Calcular la proporcion de variabilidad acumulada

```
prop.var.acum<-cumsum(eigen.val)/sum(eigen.val)
prop.var.acum
```

```
## [1] 0.4599622 0.6249750 0.7669419 0.8609113 0.9380146 0.9702460 0.9873233
```

```
## [8] 1.0000000
```

#————————————- Estimacion de la matriz de carga————————————–

Nota: se estima la matriz de carga usando los autovalores y autovectores. se aplica la rotación varimax

Primera estimación de Lamda mayuscula se calcula multiplicando la matriz de los 3 primeros autovectores por la matriz diagonal formada por la raiz cuadrada de los primeros 3 autovalores.

```
L.est.1<-eigen.vec[,1:3] %*% diag(sqrt(eigen.val[1:3]))
```

Matriz de carga

```
L.est.1
```

```
##             [,1]        [,2]        [,3]
## [1,] -0.44874575 -0.47578394  0.53393005
## [2,]  0.52366367 -0.54700365  0.26312322
## [3,] -0.87386900  0.04729332  0.13063856
## [4,]  0.76356236 -0.05349003  0.41394671
## [5,] -0.84843932 -0.31757498 -0.23061066
## [6,]  0.80406070 -0.41720642 -0.07254777
## [7,]  0.69745163  0.25155014 -0.40009375
## [8,] -0.06800771 -0.67173536 -0.61195003
```

Rotación varimax

```
L.est.1.var<-varimax(L.est.1)
L.est.1.var
```

```
## $loadings
##
## Loadings:
##      [,1]   [,2]   [,3]
## [1,]                0.840
## [2,]  0.785 -0.106  0.121
## [3,] -0.665         0.583
## [4,]  0.763  0.384 -0.168
## [5,] -0.573 -0.528  0.517
## [6,]  0.825 -0.202 -0.323
## [7,]  0.281        -0.794
## [8,]        -0.906
##
##                 [,1]  [,2]  [,3]
## SS loadings    2.744 1.300 2.091
## Proportion Var 0.343 0.163 0.261
## Cumulative Var 0.343 0.506 0.767
##
## $rotmat
##            [,1]      [,2]       [,3]
## [1,]  0.7824398 0.1724744 -0.5983649
## [2,] -0.5274231 0.6944049 -0.4895169
## [3,]  0.3310784 0.6986089  0.6342970
```

#———————————- Estimación de la matriz de los errores———————————–

1.- Estimación de la matriz de perturbaciones

```
Psi.est.1<-diag(diag(R-as.matrix(L.est.1.var$loadings)%*% t(as.matrix(L.est.1.var$loadings))))
Psi.est.1
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]     [,6]      [,7]
## [1,] 0.2871756 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
## [2,] 0.0000000 0.3573295 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
## [3,] 0.0000000 0.0000000 0.2170499 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
## [4,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2427595 0.0000000 0.000000 0.0000000
## [5,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1261156 0.000000 0.0000000
## [6,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.174162 0.0000000
## [7,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.2902087
## [8,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
##           [,8]
## [1,] 0.0000000
## [2,] 0.0000000
## [3,] 0.0000000
## [4,] 0.0000000
## [5,] 0.0000000
## [6,] 0.0000000
## [7,] 0.0000000
## [8,] 0.1696637
```

2.- Se utiliza el método Análisis de factor principal (PFA) para estimación de autovalores y autovectores

```
RP<-R-Psi.est.1
RP
```

```
##                Log-Population       Income Log-Illiteracy   Life.Exp     Murder
## Log-Population     0.71282441  0.034963788     0.28371749 -0.1092630  0.3596542
## Income             0.03496379  0.642670461    -0.35147773  0.3402553 -0.2300776
## Log-Illiteracy     0.28371749 -0.351477726     0.78295012 -0.5699943  0.6947320
## Life.Exp          -0.10926301  0.340255339    -0.56999432  0.7572405 -0.7808458
## Murder             0.35965424 -0.230077610     0.69473198 -0.7808458  0.8738844
## HS.Grad           -0.32211720  0.619932323    -0.66880911  0.5822162 -0.4879710
## Frost             -0.45809012  0.226282179    -0.67656232  0.2620680 -0.5388834
## Log-Area           0.08541473 -0.007462068    -0.05830524 -0.1086351  0.2963133
##                   HS.Grad       Frost     Log-Area
## Log-Population -0.3221172 -0.45809012  0.085414734
## Income          0.6199323  0.22628218 -0.007462068
## Log-Illiteracy -0.6688091 -0.67656232 -0.058305240
## Life.Exp        0.5822162  0.26206801 -0.108635052
## Murder         -0.4879710 -0.53888344  0.296313252
## HS.Grad         0.8258380  0.36677970  0.196743429
## Frost           0.3667797  0.70979126 -0.021211992
## Log-Area        0.1967434 -0.02121199  0.830336270
```

#Calculo de la matriz de autovalores y autovectores

```
eRP<-eigen(RP)
```

Autovalores

```
eigen.val.RP<-eRP$values
eigen.val.RP
```

```
## [1]  3.46137648  1.10522195  0.88152416  0.48705680  0.35360597  0.02813553
## [7] -0.06758176 -0.11380367
```

Autovectores

```
eigen.vec.RP<-eRP$vectors
eigen.val.RP
```

```
## [1]  3.46137648  1.10522195  0.88152416  0.48705680  0.35360597  0.02813553
## [7] -0.06758176 -0.11380367
```

Proporcion de variabilidad

```
prop.var.RP<-eigen.val.RP/ sum(eigen.val.RP)
prop.var.RP
```

```
## [1]  0.564152306  0.180134556  0.143675179  0.079382934  0.057632455
## [6]  0.004585668 -0.011014811 -0.018548286
```

Proporcion de variabilidad acumulada

```
prop.var.RP.acum<-cumsum(eigen.val.RP)/ sum(eigen.val.RP)
prop.var.RP.acum
```

```
## [1] 0.5641523 0.7442869 0.8879620 0.9673450 1.0249774 1.0295631 1.0185483
## [8] 1.0000000
```

Estimación de la matriz de cargas con rotación varimax

```
L.est.2<-eigen.vec.RP[,1:3] %*% diag(sqrt(eigen.val.RP[1:3]))
L.est.2
```

```
##             [,1]        [,2]        [,3]
## [1,] -0.42621819 -0.27609775  0.56228420
## [2,]  0.48528446 -0.36092954  0.32467098
## [3,] -0.84791581  0.08163995  0.10816670
## [4,]  0.73812189  0.02688907  0.36866093
## [5,] -0.84699944 -0.34227865 -0.12211117
## [6,]  0.78817342 -0.40399024  0.04935203
## [7,]  0.66112453  0.12457105 -0.40191996
## [8,] -0.06868291 -0.77165602 -0.36531090
```

Rotacion varimax

```
L.est.2.var<-varimax(L.est.2)
```

Estimación de la matriz de covarianzas de los errores.

```
Psi.est.2<-diag(diag(R-as.matrix(L.est.2.var$loadings)%*% t(as.matrix(L.est.2.var$loadings))))
Psi.est.2
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]      [,7]
## [1,] 0.4259446 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [2,] 0.0000000 0.5288176 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [3,] 0.0000000 0.0000000 0.2626737 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [4,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3185422 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [5,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1505261 0.0000000 0.0000000
## [6,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2131389 0.0000000
## [7,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3858568
## [8,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
##           [,8]
## [1,] 0.0000000
## [2,] 0.0000000
## [3,] 0.0000000
## [4,] 0.0000000
```

```
## [5,] 0.0000000
## [6,] 0.0000000
## [7,] 0.0000000
## [8,] 0.2663776
```

#—————————— Obtencion de los scores de ambos métodos——————————

PCFA

```
FS.est.1<-scale(x)%*% as.matrix(L.est.1.var$loadings)
FS.est.1
```

```
##                       [,1]          [,2]       [,3]
## Alabama        -5.84072356 -1.3993671511  4.0008109
## Alaska          2.12443806 -3.6163397014 -1.3435941
## Arizona        -0.77245459 -1.1030150088  1.7864181
## Arkansas       -4.26961555 -0.1287634469  1.8680205
## California      1.57843978 -1.6386262821  3.0959757
## Colorado        3.35619481 -0.5747409714 -1.9955520
## Connecticut     2.96609993  2.5265114588 -1.0120520
## Delaware        0.15111765  2.2707877284 -1.3473631
## Florida        -0.91278118 -0.8518787165  3.2141818
## Georgia        -5.10406769 -1.5374188978  3.5972606
## Hawaii          1.68679592  2.0782245763  0.6972161
## Idaho           1.93931571  0.0374520725 -2.6403015
## Illinois        0.36572803 -0.9730363911  1.3246992
## Indiana         0.69870165  0.1740586327 -0.1660034
## Iowa            3.77325852  0.8634090197 -2.4308546
## Kansas          3.22079390  0.2206198504 -1.7333568
## Kentucky       -3.97957229 -0.1711842990  1.8581455
## Louisiana      -6.15095874 -1.1449716511  4.2193388
## Maine           0.38912287  0.9352663421 -2.8385772
## Maryland        0.54556931  0.6481615589  0.7313943
## Massachusetts   1.95531363  1.9508870989 -0.0699601
## Michigan        0.06109118 -0.8995742724  1.1610156
## Minnesota       3.83625590  0.7199310360 -2.2609012
## Mississippi    -6.73875213 -1.1336057288  3.0124928
## Missouri       -0.63621057 -0.5673516660  0.5606479
## Montana         1.70022911 -0.7530855537 -2.9827203
## Nebraska        3.31393569  0.5702899251 -2.6630094
## Nevada          1.83953234 -2.1624547546 -2.8632403
## New Hampshire   1.76672303  1.8835104424 -3.2522623
## New Jersey      1.23076573  1.5154423999  0.6483326
## New Mexico     -2.42369795 -1.2184859435  0.1095350
## New York       -0.55160991 -0.8431042602  2.9025469
## North Carolina -4.53932589 -0.7126552652  2.8168209
## North Dakota    3.26810535  1.0664889529 -3.5180166
## Ohio            0.67643704 -0.0394642439  0.5816740
## Oklahoma       -0.43628926  0.0293430043  0.2108486
## Oregon          2.64633236 -0.0126633017 -0.6563722
## Pennsylvania   -0.06313819  0.0425262164  0.8538298
## Rhode Island    0.25059508  4.0533333045 -1.3779994
## South Carolina -6.20030464 -0.7067780563  3.0142562
## South Dakota    2.51505516  0.8539599931 -3.9694575
## Tennessee      -3.75602365 -0.3764569265  2.4225536
## Texas          -2.74825842 -2.0176142597  4.0126966
```

```
## Utah            3.40911641  0.2638533973 -3.0642167
## Vermont         1.26368503  1.7670538099 -3.5748058
## Virginia       -1.45435214 -0.4332714574  1.8388594
## Washington      2.95298764  0.0002978623 -0.1436737
## West Virginia  -3.41599674  0.5649932020  0.5132111
## Wisconsin       2.58972274  0.8701285803 -1.5397225
## Wyoming         1.92267355 -0.8906222579 -3.6087703
```

PFA

```
FS.est.2<-scale(x)%*% as.matrix (L.est.2.var$loadings)
FS.est.2
```

```
##                       [,1]         [,2]       [,3]
## Alabama        -5.69766092 -1.133005866  3.9030908
## Alaska          1.77921500 -3.310049553 -1.2425530
## Arizona        -0.80948635 -1.007423566  1.6833688
## Arkansas       -4.04451164 -0.036340306  1.8899610
## California      1.28900772 -1.589528660  2.7938220
## Colorado        3.21256763 -0.645092519 -1.9103448
## Connecticut     2.85639977  2.291700954 -1.1152442
## Delaware        0.22491218  2.168332191 -1.3109174
## Florida        -1.04778981 -0.760012075  2.9630979
## Georgia        -5.04193484 -1.243399542  3.4848855
## Hawaii          1.64548810  1.848120424  0.5487863
## Idaho           1.99602286 -0.067186945 -2.4442739
## Illinois        0.17329771 -0.870927790  1.1838509
## Indiana         0.66348403  0.140717116 -0.1900850
## Iowa            3.70915552  0.657976435 -2.3698485
## Kansas          3.13617617  0.071725764 -1.6894853
## Kentucky       -3.82119443 -0.051170443  1.8492550
## Louisiana      -5.97309240 -0.880509145  4.1021292
## Maine           0.58567717  0.845398887 -2.6098620
## Maryland        0.40855637  0.650876372  0.5867974
## Massachusetts   1.91021424  1.761365924 -0.1964750
## Michigan       -0.07208772 -0.823049544  1.0671998
## Minnesota       3.74953682  0.518054623 -2.2104937
## Mississippi    -6.45121865 -0.852611917  3.0320154
## Missouri       -0.64446964 -0.519762510  0.5472506
## Montana         1.72574501 -0.752576236 -2.7507980
## Nebraska        3.28773039  0.392513546 -2.5439122
## Nevada          1.69672312 -1.994626548 -2.6292009
## New Hampshire   1.87991014  1.704867403 -3.0632652
## New Jersey      1.10782292  1.425042094  0.4638907
## New Mexico     -2.26112419 -1.086582245  0.2653217
## New York       -0.72255151 -0.744949928  2.6624378
## North Carolina -4.42441540 -0.513264749  2.7372284
## North Dakota    3.22068093  0.897031063 -3.3556310
## Ohio            0.59453054 -0.051780182  0.4905274
## Oklahoma       -0.36512462  0.000708499  0.2244101
## Oregon          2.56050584 -0.129810062 -0.6934180
## Pennsylvania   -0.10451900  0.054229408  0.7553645
## Rhode Island    0.40356926  3.785456289 -1.3760426
## South Carolina -5.98815271 -0.435831413  2.9745853
## South Dakota    2.60764548  0.683975660 -3.7117087
```

```
## Tennessee      -3.63769564 -0.249263663  2.3593673
## Texas          -2.80670233 -1.827474308  3.8156526
## Utah            3.44131011  0.069209103 -2.8669774
## Vermont         1.44160727  1.580578146 -3.3086066
## Virginia       -1.50774364 -0.328200587  1.7151967
## Washington      2.81601549 -0.109025242 -0.2503494
## West Virginia  -3.18525955  0.632647668  0.5745805
## Wisconsin       2.55487697  0.699000994 -1.5141208
## Wyoming         1.92835024 -0.866073018 -3.3204601
```

graficamos ambos scores

```
par(mfrow=c(2,1))
```

Factor I y II

```
pl1<-plot(FS.est.1[,1], FS.est.1[,2], xlab="primer factor",
     ylab="segundo factor", main="scores con factor I y II con PCFA",
     pch=19, col="blue")
text(FS.est.1[,1], FS.est.1[,2], labels = rownames(x), pos=4, col="blue")
```



Factor I y III

```
pl2<-plot(FS.est.1[,1], FS.est.1[,3], xlab="Primer factor",
     ylab="Tercer factor", main="scores con factor I y III con PCFA",
     pch=19, col="blue")
text(FS.est.1[,1], FS.est.1[,3], labels = rownames(x), pos=4, col="blue")
```



Factor II y III

```
pl3<-plot(FS.est.1[,2], FS.est.1[,3], xlab="Segundo factor",
     ylab="Tercer factor", main="scores con factor II y III con PCFA",
     pch=19, col="blue")
text(FS.est.1[,2], FS.est.1[,3], labels = rownames(x), pos=4, col="blue")
```



scores con factor II y III con PCFA
Tercer factor
Segundo factor
4
2
0
−2
−4
−2
0
2
4
Louisiana
Texas
Alabama
Georgia
Florida
California
North Carolina
Tennessee
Arizona
Illinois
Michigan
Pennsylvania
Hawaii
West Virginia
Missouri
New Mexico
Oklahoma
Washington
Massachusetts
Oregon
Connecticut
Alaska
Delaware
Wisconsin
Kansas
Colorado
Minnesota
Nebraska
Maine
Nevada
Idaho
Montana
Utah
New Hampshire
Wyoming
North Dakota
Vermont
South Dakota