

微分方程式と特殊函数

Twitter：@FugaciousShade

最終更新日：2021 年 9 月 12 日

目次

第 I 部 常微分方程式	2
第 1 章 実領域における線型常微分方程式	3
1.1 ノルム	3
1.1.1 実線型空間上のノルム	6
1.2 Lipschitz 条件	10
1.3 Picard の逐次近似法	10
参考文献	11

記法

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • \mathbb{C} : 複素数全体 • \mathbb{R} : 実数全体 • \mathbb{Z} : 整数全体 • \mathbb{N} : 非負整数全体 • $\operatorname{Re}(z)$: 複素数 z の実部 • $\operatorname{Im}(z)$: 複素数 z の虚部 • z^* : 複素数 z の複素共役 • A^\dagger : 作用素 A の Hermite 共役 (随伴) 作用素 | <ul style="list-style-type: none"> • $A := B$: A を $A = B$ によって定義する • \mathcal{O}, o : Landau 記号 • $\binom{n}{k}$: 二項係数 • δ_{ij} : Kronecker の delta 記号 • \det : 行列式 • $\operatorname{Mat}(m, n, S)$: S 上の (m, n) 行列全体 • ${}^t A$: 行列 A の転置行列 • \forall : 全称記号 • \exists : 存在記号 |
|---|---|

第 I 部

常微分方程式

第 1 章

実領域における線型常微分方程式

この章では主に [高野] を参考にして、実領域における線型常微分方程式の一般論について述べる。

1.1 ノルム

ノルムに関する以下の定義や命題は [野村] に拠る。

定義 1.1 (ノルム). V を \mathbb{R} または \mathbb{C} 上の線型空間とする。 $|\cdot|$ を実数または複素数の絶対値とする。関数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}$ が以下の条件を満たすとき、 $\|x\|$ を x のノルムという：

- (i) (正値性) $\forall x \in V, \|x\| \geq 0$
- (ii) (一意性) $\forall x \in V, [\|x\| = 0 \iff x = 0]$
- (iii) (同次性) $\forall k \in \mathbb{C}, \forall x \in V, \|kx\| = |k|\|x\|$
- (iv) (三角不等式) $\forall x, \forall y \in V, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

ノルムの定義された線型空間をノルム空間という。

命題 1.2 (三角不等式). ノルムは次の性質も満たす：

$$(1.1) \quad \forall x, \forall y \in V, |||x| - |y||| \leq \|x - y\|.$$

Proof. まず, $\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$ から $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ が従う。同様に

$$(1.2) \quad \|y\| = \|(y - x) + x\| \leq \|(-1)(x - y)\| + \|x\| = |-1|\|x - y\| + \|x\| = \|x - y\| + \|x\|$$

なので, $\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|$ である。また, 絶対値の特徴付け $|a| = \max\{a, -a\}$ を用いると, $\max\{\|x\| - \|y\|, \|y\| - \|x\|\} = |||x| - |y||| \leq \|x - y\|$ である。これらにより, $|||x| - |y||| \leq \|x - y\|$ が成立する。□

系 1.3. 命題 1.2 において, $y \mapsto -y$ として, 元の三角不等式と併せれば,

$$(1.3) \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

が従う。

命題 1.4 (ノルムの連続性). ノルムは連続関数である。

Proof. 示すべきことは以下の通り：

$$(1.4) \quad \forall x, \forall y \in V, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \left[\varepsilon > 0 \implies \left(\exists \delta \in \mathbb{R}; \left[\delta > 0 \wedge (\|x - y\| < \delta \implies \|x\| - \|y\| < \varepsilon) \right] \right) \right].$$

実際, $\delta := \varepsilon$ と取れば, 命題 1.2 により, $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| < \delta = \varepsilon$ であるから, ノルムは連続関数である。□

定義 1.5 (ノルムの同値性). 以下が成立するとき, V 上の 2 つのノルム $\|\cdot\|, \|\cdot\|_1$ が同値であるという：

$$(1.5) \quad \exists m, \exists M \in \mathbb{R}; \left[0 < m \leq M \wedge (\forall x \in V, m\|x\|_1 \leq \|x\| \leq M\|x\|_1) \right].$$

命題 1.6. ノルムの同値性は同値関係である。

Proof. ノルム $\|\cdot\|, \|\cdot\|_1$ が同値であることを $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_1$ と記すことにする。すなわち,

$$(1.6) \quad \|\cdot\| \sim \|\cdot\|_1 \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists m, \exists M \in \mathbb{R}; \left[0 < m \leq M \wedge (\forall x \in V, m\|x\|_1 \leq \|x\| \leq M\|x\|_1) \right].$$

このとき関係 \sim が反射律, 対称律, 推移律を満たすことを示す。

- (反射律) 任意の $\|\cdot\|$ に対し, $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|$ が成立することを示す。実際, $m = M = 1$ とすれば,

$$(1.7) \quad 0 < m = 1 \leq M = 1 \wedge (\forall x \in V, 1 \cdot \|x\| \leq \|x\| \leq 1 \cdot \|x\|)$$

であるから成立。

- (対称律) $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_1$, すなわち

$$(1.8) \quad \exists m, \exists M \in \mathbb{R}; \left[0 < m \leq M \wedge (\forall x \in V, m\|x\|_1 \leq \|x\| \leq M\|x\|_1) \right]$$

のとき, $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|$ が成立することを示す。後半の不等式を書き直すと, $\frac{1}{M}\|x\| \leq \|x\|_1 \leq \frac{1}{m}\|x\|$ であり, $0 < m \leq M$ であるから $0 < \frac{1}{M} \leq \frac{1}{m}$ であり, $m' := \frac{1}{M}$, $M' := \frac{1}{m}$ と取れば確かに $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|$ の成立が判る。

- (推移律) 3 つのノルム $\|\cdot\|, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ に対し, $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_1$ と $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$ のとき, $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_2$ が成立することを示す。仮定から,

$$(1.9) \quad \exists m_1, \exists M_2 \in \mathbb{R}; \left[0 < m_1 \leq M_2 \wedge (\forall x \in V, m_1\|x\|_1 \leq \|x\| \leq M_1\|x\|_1) \right],$$

$$(1.10) \quad \exists m_2, \exists M_2 \in \mathbb{R}; \left[0 < m_2 \leq M_2 \wedge (\forall x \in V, m_2\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq M_2\|x\|_2) \right]$$

の両方が成立しているから、 $\|x\| \leq M_1\|x\|_1 \leq M_1M_2\|x\|_2$ 及び、 $\|x\| \geq m_1\|x\|_1 \geq m_1m_2\|x\|_2$ より、 $m_1m_2\|x\|_2 \leq \|x\| \leq M_1M_2\|x\|_2$ が従う。これより、 $m := m_1m_2$ 、 $M := M_1M_2$ と取れば $0 < m_1m_2 \leq M_1M_2$ も成立するので $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_2$ である。

以上により、ノルムの同値性は同値関係である。 \square

定理 1.7. 線型空間 V が有限次元であれば、 V 上の任意の 2 つのノルムは同値である。

Proof. V を有限次元線型空間とし、 $n := \dim V$ とする。 V の基底として、 $\{e_k\}_{0 \leq k \leq n-1}$ を取り固定する。 V の元 x を、 $x = \sum_{k=0}^{n-1} x_k e_k$ と表したときの成分 $\{x_k\}_{0 \leq k \leq n-1}$ を用いて、

$$(1.11) \quad \|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \|x\| := \max_{0 \leq k \leq n-1} \{|x_k|\}$$

と定めると $\|\cdot\|$ はノルムになる。以下 $\|\cdot\|$ がノルムであることを確かめる：

- (i) (正値性) どの k についても $0 \leq |x_k|$ であり、 $\|x\| = \max_k \{|x_k|\} \geq 0$ であるから成立。
- (ii) (一意性) $x = 0$ のとき、どの k についても $x_k = 0$ であるから $\|x\| = \max_k \{|x_k|\} = 0$ である。また、 $\|x\| = 0$ のとき、任意の k に対し、絶対値の非負性から $0 \leq |x_k|$ であって、 $|x_k| \leq \|x\| = 0$ であるから $|x_k| = 0$ である。これより $x = 0$ となる。
- (iii) (同次性) 絶対値の非負性と同次性から、 $\|cx\| = \max_k \{|cx_k|\} = |c| \cdot \max_k \{|x_k|\} = |c|\|x\|$ が従う。
- (iv) (三角不等式) 絶対値の三角不等式から、各 k に対して $|x_k + y_k| \leq |x_k| + |y_k|$ であるから最大値に関してもこの不等号が成り立つので $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ が従う。

以上により式 (1.11) で定められた $\|\cdot\|$ はノルムである。

次に、 V 上の勝手なノルム $\|\cdot\|_1$ を取ってきたときに、式 (1.11) で定義した $\|\cdot\|_1$ と $\|\cdot\|$ が同値になってしまうことを示す。 V のコンパクト集合 S を $S := \{y \in V; \|y\| = 1\}$ によって定め、関数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(y) := \|y\|_1$ と定める。 f の連続性 (命題 1.4) と S がコンパクト集合であることから、 f の値域には最小元 m と最大元 M が存在する。 S 上で $y \neq 0$ であり、ノルムの正値性から $0 < m \leq M$ である。特に、 $\|y\| = 1$ ならば $y \in S$ であり、 m, M の定義から $m \leq f(y) \leq M$ 及び $f(y) = \|y\|_1$ なので $m \leq \|y\|_1 \leq M$ が従う。ここで、 V 上の一般の $x \neq 0$ に対して $y := x/\|x\|$ とすると $\|y\| = \|x/\|x\|\| = \|x\|/\|x\| = 1$ より $y \in S$ であるから $f(y) = \|x/\|x\|\|_1 = \|x\|_1/\|x\|$ であって、 $m \leq \|x\|_1/\|x\| \leq M$ より $m\|x\| \leq \|x\|_1 \leq M\|x\|$ である。 $x = 0$ についても $\|0\| = \|0\|_1 = 0$ であって、 $m\|0\|_1 \leq \|0\| \leq M\|0\|_1$ は成立するので、 $\|\cdot\|_1$ と $\|\cdot\|$ は同値である。

有限次元線型空間 V 上で与えられた任意の 2 つのノルム $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ はそれぞれ式 (1.11) で定義された $\|\cdot\|$ と同値であり、ノルムの同値は同値関係 (命題 1.6) なので、 $\|\cdot\|_1$ と $\|\cdot\|_2$ も同値である。 \square

1.1.1 実線型空間上のノルム

上ではノルムに関して、一般的な形でやや抽象的に述べた。以降では[高野]に基づいて、常微分方程式を実際に扱う際に有用なノルムを具体的に扱う。ここでは有限次元実線型空間 \mathbb{R}^n 上のノルムの例を挙げる。以下では、 $x = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ の各成分を実数とし、 $|\cdot|$ を実数の絶対値とする。

例 1.8 (Euclid ノルム). 原点からの標準的な距離：

$$(1.12) \quad \|x\|_2 := \left(\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

はノルムである。

例 1.9 (一様ノルム). 定理 1.7 の証明において式 (1.11) で定義された $\|\cdot\|$ はノルムである。後述するように、 p ノルムにおいて $p \rightarrow \infty$ の極限で再現されることから、これを $\|\cdot\|_\infty$ と書いて ∞ ノルムとも呼ぶ。

定義 1.10 (p ノルム). p を 1 以上の実数とする。このとき、 x の p ノルム $\|x\|_p$ を、

$$(1.13) \quad \|x\|_p := \left(\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

で定める。

問 1.1. p ノルムがノルムの条件 (定義 1.1) を満たしていることを確かめよ。

1 ノルムのことを絶対値ノルムと呼び、絶対値ノルムによって定まる距離を Manhattan 距離と呼ぶ。2 ノルムは Euclid ノルムに一致する。

命題 1.11. $p \rightarrow \infty$ の極限で p ノルム $\|\cdot\|_p$ は例 1.9 の一様ノルム $\|\cdot\|_\infty$ に一致する。

Proof. x_M は x の成分の x_0, x_1, \dots, x_{n-1} のうち絶対値が最大のものであるとする。このとき、 $|x_M| = \|x\|_\infty$ と書ける。定義より、

$$(1.14) \quad \|x\|_p = \left(\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|x\|_\infty = \max_{0 \leq k \leq n-1} \{|x_k|\} = |x_M|$$

であるから、示すべきことは、

$$(1.15) \quad \left(\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow |x_M| \quad (p \rightarrow \infty)$$

である。まず、 $1 < p < \infty$ のとき、 $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ であることを確かめる。これは、

$$(1.16) \quad 0 \leq |x_M|^p \leq \sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p$$

であることと、 $0 < p$ のとき、 $t \in [0, \infty)$ において $f(t) = t^{\frac{1}{p}}$ が狭義単調増加であること、 0 以上 $(n-1)$ 以下の任意の整数 k について $|x_k| \geq 0$ であることから、

$$(1.17) \quad (|x_M|^p)^{\frac{1}{p}} = |x_M| \leq \left(\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

より成立。また、 0 以上 $(n-1)$ 以下の任意の整数 k について $0 \leq |x_k| \leq |x_M|$ であり、

$$(1.18) \quad 0 \leq \sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p \leq \sum_{k=0}^{n-1} |x_M|^p = n|x_M|^p$$

が成立する。更に、 n は固定された正整数であるから

$$(1.19) \quad n^{\frac{1}{p}} \longrightarrow n^0 = 1 \quad (p \rightarrow \infty)$$

である。

これらのことから、

$$(1.20) \quad 0 \leq \left(\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} - |x_M| \leq (n|x_M|^p)^{\frac{1}{p}} - |x_M| \leq \left(n^{\frac{1}{p}} - 1 \right) |x_M| \longrightarrow 0 \quad (p \rightarrow \infty)$$

が従い、はさみうちの原理から、

$$(1.21) \quad \left(\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow |x_M| \quad (p \rightarrow \infty)$$

であり、これは式 (1.15) の成立を意味している。 □

以降、有限次元線型空間のノルムは例 1.9 の一様ノルムであるとする。

命題 1.12. I を \mathbb{R} 上の閉区間であるとする。 $f: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ を連続なベクトル値関数とすると、

$$(1.22) \quad \left\| \int_I dt f(t) \right\| \leq \int_I dt \|f(t)\|$$

が成立する。

Proof. I 上可積分な g と絶対値に関する以下の不等式：

$$(1.23) \quad \left| \int_I dt g(t) \right| \leq \int_I dt |g(t)|$$

を用いる。

$$(1.24) \quad \forall j \in \mathbb{N}, \forall t \in I, \left[0 \leq j \leq n-1 \implies f_j(t) \leq |f_j(t)| \leq \|f(t)\| \right]$$

であるから,

$$(1.25) \quad \forall j \in \mathbb{N}, \left[0 \leq j \leq n-1 \implies \int_I dt f_j(t) \leq \int_I dt |f_j(t)| \leq \int_I dt \|f(t)\| \right]$$

である。ここで、式 (1.23) の不等式から,

$$(1.26) \quad \left| \int_I dt f_j(t) \right| \leq \int_I dt |f_j(t)| \leq \int_I dt \|f(t)\|$$

であるから,

$$(1.27) \quad \left\| \int_I dt f(t) \right\| = \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \left| \int_I dt f_j(t) \right| \right\} \leq \int_I dt \|f(t)\|$$

が成立する。 □

定義 1.13 (作用素ノルム). 線型作用素 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ に対して, $\|A\|$ を,

$$(1.28) \quad \|A\| := \sup_{\|x\|=1} \{\|Ax\|\}$$

で定める。

以降, A を線型作用素とし, その (j, k) 成分を a_{jk} と書く。

命題 1.14.

$$(1.29) \quad \|A\| = \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| \right\}$$

Proof. $\|x\| = 1$ のとき, x の各成分の絶対値は 1 以下である。このとき, Ax の第 j 成分 $(Ax)_j$ に関して,

$$(1.30) \quad \left| (Ax)_j \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} a_{jk} x_k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| |x_k| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}|$$

となり, 1 つ目の等号成立は,

$$(1.31) \quad \left[\forall k \in \mathbb{N}, (0 \leq k \leq n-1 \implies a_{jk} x_k \geq 0) \right] \vee \left[\forall k \in \mathbb{N}, (0 \leq k \leq n-1 \implies a_{jk} x_k \leq 0) \right]$$

のとき, すなわち $a_{jk} x_k$ が全て同符号のときである。2 つ目の等号成立は, x の各成分の絶対値が 1 に等しい場合であり, この 2 つの条件は同時に満たすことができる。実際, 各 k について, $a_{jk} \geq 0$ なら $x_k = 1$, $a_{jk} < 0$ なら $x_k = -1$ と定めれば, いずれの等号も成立する。これより,

$$(1.32) \quad \|A\| = \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| \right\}$$

である。 □

命題 1.15.

$$(1.33) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

Proof. 各 k について $|x_k| \leq \|x\|$ であるから, Ax の第 j 成分について,

$$(1.34) \quad |(Ax)_j| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} a_{jk} x_k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| |x_k| \leq \left(\sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| \right) \cdot \|x\|$$

が成立して,

$$(1.35) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

が従う。 □

命題 1.16. A, B を \mathbb{R}^n から \mathbb{R}^n への任意の線型作用素とする。このとき,

$$(1.36) \quad \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

が成立する。

Proof. A, B の (j, k) 成分をそれぞれ a_{jk}, b_{jk} とする。まず,

$$(1.37) \quad \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk} + b_{jk}| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| + \sum_{k=0}^{n-1} |b_{jk}|$$

であるから,

$$(1.38) \quad \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk} + b_{jk}| \right\} \leq \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| \right\} + \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |b_{jk}| \right\}$$

であり, $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ である。

次に, m は,

$$(1.39) \quad \forall \ell, \left[0 \leq \ell \leq n-1 \implies \sum_{k=0}^{n-1} |b_{\ell k}| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |b_{mk}| \right]$$

を満たす, すなわち $\|B\|$ を与える行の添字とする。このとき,

$$(1.40) \quad \sum_{k=0}^{n-1} \left| \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{j\ell} b_{\ell k} \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{j\ell}| |b_{\ell k}| \right) = \sum_{\ell=0}^{n-1} \left(|a_{j\ell}| \sum_{k=0}^{n-1} |b_{\ell k}| \right) \leq \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{j\ell}| \right) \left(\sum_{k=0}^{n-1} |b_{mk}| \right)$$

より,

$$(1.41) \quad \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} \left| \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{j\ell} b_{\ell k} \right| \right\} \leq \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{j\ell}| \right\} \cdot \max_{0 \leq m \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |b_{mk}| \right\}$$

が従うので, $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ である。 □

命題 1.17. 定義 1.13 で定義した $\|A\|$ はノルムである。

Proof. 及び、命題 1.16 定義 1.1 の 4 条件を順に確かめる。

- (i) (正值性) 命題 1.14 から、各項にある絶対値は非負なので、 $\|A\| \geq 0$ である。
- (ii) (一意性) 命題 1.14 から、 $\|A\| = 0$ だとすれば、絶対値の非負性から、どの j に関しても $\sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| = 0$ であり、これが成立するためには全ての (j, k) に関して $A_{jk} = 0$ でなければならず、このとき $A = O$ (零行列) である。
- (iii) (同次性) 命題 1.14 から、

$$(1.42) \quad \|cA\| = \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |c| |a_{jk}| \right\} = |c| \cdot \max_{0 \leq j \leq n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |a_{jk}| \right\} = |c| \|A\|.$$

- (iv) (三角不等式) 命題 1.16 から直ちに従う。

□

問 1.2. \mathbb{R}^n のベクトル x のノルムは例 1.9 で述べた一様ノルムとし、 \mathbb{R}^n 上の線型作用素 A のノルムは定義 1.13 で与えられた作用素ノルムであるとする。 $n = 3$ のとき、

$$(1.43) \quad x = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。このとき、 $\|x\|$ と $\|A\|$ を計算せよ。

問 1.3. \mathbb{R}^n のベクトルに対して一様ノルムではなく、例 1.8 で導入した Euclid ノルムを用いた場合、定義 1.13 で定義される $\|A\|$ はどのような性質を持つだろうか。例えば、 \mathbb{R}^2 上の一般的な線型作用素の作用素ノルムを、その成分を用いて具体的に表わせ。(関連：スペクトルノルム)

1.2 Lipschitz 条件

1.3 Picard の逐次近似法

参考文献

- [高野] 朝倉 復刊セレクション 新数学講座『常微分方程式』高野 恭一，朝倉書店 (1994 年)
- [原岡] すうがくの風景 7『超幾何関数』原岡 喜重，朝倉書店 (2002 年)
- [小松] 復刊 近代数学講座 5『特殊函数』小松 勇作，朝倉書店 (2004 年)
- [野村]『球面調和函数と群の表現』野村 隆昭，日本評論社 (2018 年)