

# Baseline-Testprotokoll Einheit 1

Archivhinweis: Diese Vorlage ist nicht die aktive Startlogik fuer Dienstag, 16. Juni 2026. Dienstag ist Onboarding + Training ohne offiziellen Test; Donnerstag ist Training + optionale Mini-Baseline. Nicht parallel am Platz ausfuellen.

Stand: 1. Juni 2026

## Zweck

Dieses Protokoll ist fuer die erste Einheit mit der U22-/Development-Gruppe von Rugby Union Donau Wien gedacht.

Mobile Unterlagen:

- `templates/baseline_test_protocol_unit_1_field_sheet.md`
- `templates/baseline_test_data_sheet.md`

Ziel ist nicht maximale Testtiefe. Ziel ist ein sicherer, standardisierter Einstieg:

- Spieler kennenlernen.
- Anwesenheit und Gruppengroesse realistisch einschuetzen.
- Positionen und Positionscluster grob erfassen.
- Schmerz-, Verletzungs- und Rueckkehrerstatus erkennen.
- einfache Ausgangswerte fuer Power, Sprint und Kondition sammeln.
- Technik- und Belastbarkeitsbild beobachten.
- die Gruppe nicht zerlegen.

## Rahmen

- Zeitpunkt: KW 25 / 2026, voraussichtlich 16. oder 18. Juni.
- Dauer: Ziel 75-85 Minuten, maximal 90 Minuten.
- Gruppengroesse: geplant fuer 10-15 Spieler, skalierbar bis ca. 20.
- Betreuung: funktioniert mit einem Coach, besser mit einer Hilfsperson fuer Datenerfassung oder Zeitnahme.
- Ort: Feld plus bei Bedarf Gym/ueberdachter Bereich fuer Check-in und Dokumentation.

## Grundregeln

- Vergleichbarkeit ist wichtiger als perfekte Laborpraezision.
- Gleiche Reihenfolge fuer alle Spieler.

- Keine Maximaltests im Gym.
- Keine 505-/COD-Tests in Einheit 1.
- Keine harten Repeated-Sprint- oder RHIE-Tests.
- Conditioning kommt immer zuletzt.
- Bronco wird nur durchgefuehrt, wenn Zeit, Wetter, Sicherheit und Messqualitaet passen.
- Rueckkehrer und gelbe Spieler werden nicht automatisch normal mitgetestet.
- Kopf-/Nackensymptome sind kein S&C-Thema: bei Verdacht rausnehmen und medizinisch abklaeren lassen.

## **Vorbereitung vor Trainingsbeginn**

### **Material**

- Datensheet oder Formular.
- Stift/Klemmbrett oder Tablet.
- Waage.
- Massband.
- Huetchen/Flat Markers.
- Stoppuhr.
- Smartphone mit Sprint-/Photo-Finish-App, wenn verfuegbar.
- Stativ, wenn verfuegbar.
- Medizinball, Gewicht dokumentieren.
- Bluetooth-Lautsprecher nur falls spaeter 30-15 IFT oder Yo-Yo geplant wird.

### **Aufbau**

- 30-m-Sprintbahn markieren.
- Start- und Ziellinie klar markieren.
- Broad-Jump-Station markieren.
- Seated-Med-Ball-Throw-Station markieren.
- Screening-Zirkel mit 4-5 Stationen vorbereiten.
- Bronco-Linien 20/40/60 m nur vorbereiten, wenn genug Platz und Zeit vorhanden sind.

### **Coach-Check vor Start**

- Ist die Oberflaeche sicher?
- Ist genug Platz fuer Sprint und Bronco?

- Ist das App-/Kamera-Setup stabil?
- Ist eine Person fuer Daten/Timing verfuegbar?
- Wenn nein: einfacher testen, keine scheinbar praezisen Splits erzwingen.

## Datenfelder

Minimal erfassen:

| Feld                       | Format                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Datum                      | TT.MM.JJJJ                                              |
| Spieler                    | Name                                                    |
| Position                   | Spielerangabe                                           |
| Cluster                    | Collision Forwards / Hybrid / Speed/Space Backs / offen |
| Koerpermasse               | kg                                                      |
| Readiness                  | 1-5                                                     |
| Schlaf                     | 1-5 optional                                            |
| Muskelkater                | 0-10 optional                                           |
| Schmerzflag                | ja/nein                                                 |
| Schmerzort                 | freie Notiz                                             |
| Rueckkehrer / angeschlagen | ja/nein/offen                                           |
| Coach-Notiz                | freie Notiz                                             |

Testwerte:

| Test                              | Wert                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Broad Jump Versuch 1-3            | cm                              |
| Broad Jump Bestwert               | cm                              |
| Seated Med-Ball Throw Versuch 1-3 | m                               |
| Seated Med-Ball Throw Bestwert    | m                               |
| 30-m-Sprint Versuch 1-3           | s                               |
| 10/20/30-m-Splits                 | nur bei stabilem App-Setup      |
| Bronco                            | Gesamtzeit, falls durchgefuehrt |
| Session-RPE                       | 0-10 nach Einheit               |

## Ablauf Einheit 1

### 0-10 min: Ankommen und Check-in

Ziel:

- Spieler erfassen.

- Tagesstatus einschätzen.
- offensichtliche Red Flags erkennen.

Ablauf:

- Name und Position erfassen.
- Koerpermasse messen oder eintragen.
- Readiness 1-5 abfragen.
- Schmerzflag ja/nein plus Ort.
- Rueckkehrerstatus abfragen: "Kommst du gerade aus einer Verletzung zurueck oder gibt es etwas, das ich wissen muss?"

Ampel:

- Gruen: keine relevanten Flags, Schmerz 0-2/10.
- Gelb: Schmerz 3-4/10, deutlicher Muskelkater, auffaellige Unsicherheit, Rueckkehrerstatus offen.
- Rot: Schmerz >4/10, Kopf-/Nackensymptome, veraendertes Laufbild, akute Beschwerden.

Regel:

- Gelbe Spieler testen reduziert oder kontrolliert.
- Rote Spieler machen kein normales Sprint-/Conditioning-Testing.

## **10-22 min: Gemeinsames Warm-up**

Ziel:

- Temperatur und Bewegungsvorbereitung.
- einfache Beobachtung von Bewegungsqualitaet.
- Vergleichbarkeit fuer Tests.

Inhalt:

- lockere Laufvarianten.
- Shuffle, Backpedal, Skip.
- A-March oder A-Skip.
- Dribble / Ankling.
- Pogo oder Line Hops.
- Snap-down + Stick.
- 2-3 progressive Beschleunigungen, nicht maximal.

Coach beobachtet:

- Laufbild.
- Koordination.
- Landekontrolle.
- offensichtliche Schmerzen oder Ausweichbewegungen.

## 22-37 min: Screening-Zirkel

Organisation:

- 4-5 Stationen.
- kleine Gruppen.
- nicht als harter Fitnesstest coachen.
- Ziel ist Beobachtung und Ampelentscheidung.

Stationen:

| Station           | Inhalt                                                              | Beobachtung                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Adduktor          | kurzer Squeeze oder Short-Lever-Hold                                | Schmerz, Seitenunterschied, Toleranz               |
| Sprunggelenk/Wade | Toe-to-wall oder Weight-bearing Lunge, Single-leg Heel Raise        | Beweglichkeit, Kontrolle, Schmerz                  |
| Schulter          | Push-up Plus, Plank Shoulder Tap oder vereinfachte CKCUEST-Variante | Schulterkontrolle, Schmerz, Stabilität             |
| Bridge/Pelvis     | Glute Bridge Hold oder Single-leg Bridge Check                      | Hueftkontrolle, Hamstringkrampf, Seitenunterschied |
| Nacken            | Symptomcheck plus leichte isometrische Eigenwiderstände             | Symptome, Toleranz, Unsicherheit                   |

Dokumentation:

- nicht ueberquantifizieren.
- pro Spieler nur auffaellige Punkte notieren.
- Ampelstatus aktualisieren.

## 37-50 min: Power-Tests

Test 1: Broad Jump

- 2-3 Versuche.
- Start aus stabilem Stand.
- beidbeiniger Absprung, beidbeinige Landung.
- Landung muss kontrolliert sein.
- bester gueltiger Wert zaehlt.

Ungueltig:

- Rueckfallen.
- Hand am Boden.
- deutlicher Schritt nach hinten.
- Schmerz oder unsichere Landung.

Test 2: Seated Med-Ball Throw

- 2-3 Versuche.
- sitzend, Ruecken moeglichst stabil.
- Ballgewicht dokumentieren.
- bester gueltiger Wert zaehlt.

Regel:

- Wenn die Gruppe gross ist, Broad Jump und Med-Ball Throw als Rotation organisieren.
- Keine langen Technikdiskussionen. Kurz erklaren, 1 Probeversuch, dann messen.

## **50-68 min: 30-m-Sprint**

Ziel:

- Sprintausgangswert.
- Sprinttoleranz beobachten.
- grobe Beschleunigungs- und Speed-Basis erfassen.

Setup:

- 30-m-Bahn.
- klare Startlinie.
- gleiche Startposition fuer alle.
- Smartphone/App bevorzugen.
- Handzeit nur als grober Wert.

Ablauf:

- 2-3 Versuche.
- volle Pause.
- kein Sprint unter Ermuedung.

- bei grosser Gruppe in klarer Reihenfolge laufen lassen.

Optional:

- 10/20/30-m-Splits nur nutzen, wenn App, Kamera, Stativ und Operator stabil sind.
- Wenn das Setup unsicher ist, nur 30 m als groben Vergleichswert erfassen.

Abbruch:

- Schmerz.
- unsauberes Laufbild.
- Unsicherheit.
- Kopf-/Nackensymptome.

## **68-85 min: Bronco optional**

Default:

- Bronco ist der pragmatische erste Konditionstest.

Aber:

- Bronco wird nur gemacht, wenn Zeit, Wetter, Platz, Gruppe und Sicherheit passen.
- Wenn die Testqualitaet leidet, wird Bronco auf Einheit 2 verschoben.

Setup:

- Linien bei 0/20/40/60 m.
- 5 Runden: 20 m, 40 m, 60 m hin und zurueck.
- Gesamtzeit erfassen.

Nicht durchfuehren, wenn:

- viele Spieler gelb/rot sind.
- Sprintblock bereits chaotisch oder ermuedend war.
- nur ein Coach mit >15 Spielern vor Ort ist.
- Wetter/Oberflaeche nicht passt.
- Zeitdruck entsteht.

Alternative bei Verschiebung:

- 5-8 Minuten lockere extensive Laufarbeit oder Mobility-Cooldown.

- kein Ersatz-Metcon.

## **85-90 min: Abschluss**

Kurz erfassen:

- Session-RPE 0-10.
- Pain/Issue nach Einheit ja/nein plus Ort.
- kurze Info: "Naechste Einheit startet mit Training, nicht wieder mit einem grossen Testtag."

Coach direkt nach der Einheit:

- Anwesenheit pruefen.
- gelbe/rote Spieler markieren.
- Rueckkehrer notieren.
- unklare Positionen markieren.
- auffaellige Bewegungsmuster notieren.
- entscheiden, ob Bronco nachgeholt werden muss.

## **Skalierung nach Gruppengroesse**

### **8-10 Spieler**

- Tests koennen relativ linear durchlaufen.
- 2-3 Sprintversuche realistisch.
- Bronco wahrscheinlich moeglich, wenn Zeit und Wetter passen.

### **10-15 Spieler**

- Standardfall.
- Screening und Power als Rotation.
- Sprint in fixer Reihenfolge.
- Bronco nur, wenn Ablauf sauber bleibt.

### **16-20 Spieler**

- Prioritaet:

1. Check-in.
2. Warm-up.



3. Screening.
4. Power.
5. Sprint.
6. Bronco nur bei sehr guter Organisation.

- Wenn nur ein Coach vor Ort ist:
- Bronco eher auf Einheit 2 verschieben.
- keine feinen Sprint-Splits erzwingen.
- Notizen kurz halten.

## Entscheidungsregeln

### Bronco verschieben, wenn:

- weniger als 15 Minuten uebrig sind.
- Sprintmessung laenger dauert als geplant.
- mehrere Spieler gelb/rot sind.
- Wetter oder Oberflaeche fraglich sind.
- die Gruppe organisatorisch unruhig wird.

### Sprint reduzieren, wenn:

- Spieler gelb sind.
- Laufbild auffaellig ist.
- Spieler aktuell aus Verletzung zurueckkommt.
- Schmerz oder Unsicherheit auftritt.

Moegliche Anpassung:

- nur 1-2 lockere Beschleunigungen.
- kein Max-Speed.
- kein Bronco.

### Power-Test reduzieren, wenn:

- Landung unsicher ist.
- Knie/Huefte/Sprunggelenk schmerzhaft sind.
- Spieler Rueckkehrer ist und Status unklar bleibt.

Moegliche Anpassung:

- Probe ohne Messung.
- qualitative Notiz statt Wert.

## Was nicht in Einheit 1 gehoert

- 1RM-Tests.
- schwere Top-Sets.
- modified 505 oder harte COD-Tests.
- Repeated-Sprint-Test.
- RHIE-Test.
- harter Kontakt.
- volle Wrestling-/Grappling-Blöcke.
- Neck-Bridges.
- komplexe Olympic-Lift-Varianten.
- lange Fragebogen.

## Ergebnis nach Einheit 1

Nach der Einheit sollten vorliegen:

- Anwesenheitsliste.
- grobe Positions- und Clusterzuordnung.
- Ampelstatus pro Spieler.
- Rueckkehrer- oder Schmerznotizen.
- Broad-Jump-Werte.
- Med-Ball-Throw-Werte.
- 30-m-Sprintwerte.
- Bronco-Zeit, falls durchgefuehrt.
- Coach-Notizen zu Technik, Organisation und Belastbarkeit.

Diese Daten reichen fuer den Start von Offseason Block 1. Fehlende Werte werden nicht erzwungen, sondern in Einheit 2 oder im normalen Training nachgetragen.