

Fecha Última Actualización: 01-07-2024 10:41:08

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Gabriel Andrés Tapia Jara
Edad : 23a 7m 5d
Dirección : Filapenses 4031

Rut : 20.282.163-4
Fecha Nacto: 26/11/2000
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0228416
Sexo : Masculino
Teléfono : 949996766

N° Epicrisis
404240

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Traumatología Y Ortopedia
Unidad de Egreso : Traumatología Y Ortopedia

Fecha Ingreso : 20/06/2024 01:06
Fecha Egreso : 01/07/2024 10:07

Días Estadía: 11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

FRACTURA EXPUESTA TIBIA BILATERAL POR BALA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente consulta el 20/06 tras recibir impactos de bala en ambas extremidades inferiores.
Ingresa en contexto de fractura expuesta de tibia bilateral.
A pabellón el mismo día para instalación de fijadores externos en ambas extremidades inferiores.
Se maneja con tratamiento ATB de fractura expuesta.
Resolución definitiva en etapas. Primera cirugía pierna derecha el día 25/06, se instala clavo endomedular en tibia derecha sin incidentes.
Segunda cirugía el 27/06, clavo endomedular en tibia izquierda, sin incidentes.
Paciente evoluciona de manera favorable
Actualmente en condiciones de alta y control ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

FRACTURA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA - Expuesta bilateral

Condición de Egreso Alta Domicilio
Estable

Egreso con Catéter Doble J: NO

Plan Post Alta

GENERALES

- Reposo relativo
- No retirar curaciones por su cuenta
- Deambular con 2 bastones o andador con carga parcial sobre extremidad inferior derecha.
- Uso de bota ortopédica hasta control con médico en extremidad inferior izquierda. MANTENER EXTREMIDAD EN DESCARGA.
- Alimentación habitual

MEDICAMENTOS

- Cefadroxilo 500 mg, 1 comprimido cada 12 horas por 7 días
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 8 horas por 15 días
- Aspirina 100 mg, 1 comprimido al día por 30 días.

Fecha Epicrisis : 01/07/2024 10:41

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 01-07-2024 10:41:08

Página 2 de 2

- Celecoxib 200 mg, 1 comprimidos cada 12 horas por 5 días.
- Tramadol gotas 100 mg/m, 5 - 10 gotas en caso de dolor severo maximo cada 8 horas

CONTROLES

- Control con Dr Lepe en 2 semanas en CDT pasillo 4, pedir hora con interconsulta para el día viernes 12 de julio.

Acudir al servicio de urgencia en caso de fiebre, dolor que no cede con medicamentos, problemas con heridas operatorias

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles



Isadora Camila Del Carmen Bec.

Becado/Residente

INTERNO

Médico Tratante (Staff)