概率论笔记

一个短篇

2024 年 01 月 17 日

目录

1 基本概念 **2**
1.1 运算 2
1.2 关系 2
1.3 频率和概率 2
1.4 条件概率 3
1.5 全概率与贝叶斯公式 3
1.6 事件的独立性 3
1.7 伯努利概型 3

2 随机变量及其分布 **4**
2.1 $R.V.$ 和 分布函数 4
2.2 分布函数 4
2.3 离散型随机变量及其分布 4
2.4 连续型随机变量 5
2.5 随机变量的分布 6

3 多维随机变量 **6**
3.1 二维随机变量和联合分布函数 6
3.2 连续型随机变量 7
3.3 边缘分布 7
3.4 条件分布 8
3.5 独立性 8
3.6 二维连续型随机变量的分布 8

4 随机变量的数字特征 **9**
4.1 数学期望 9
4.2 方差 9
4.3 常见形式 10
4.4 协方差 10

5 大数定律和中心极限定理 **11**
5.1 大数定律 11
5.2 中心极限定理 12

6 样本与抽样分布 **12**
6.1 基本概念 12
6.2 抽样分布 13

7 参数估计 **14**
7.1 点估计 14
7.2 评选标准 14
7.3 区间估计 14

8 假设检验 **15**

1 基本概念

1.1 运算

若 A 代表事件 A 发生, $\overline{A}$ 代表事件没有发生，我们定义如下在随机事件上的关系运算：

包含

$$A \subset B \Leftrightarrow A \to B$$

另外有 $A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$

差集

$$A - B \Leftrightarrow A \wedge \overline{B}$$

另外有 $A - B = A - AB = A\overline{B}$

交集

$$A \cap B \Leftrightarrow A \wedge B$$

并集

$$A \cup B \Leftrightarrow A \vee B$$

对于交集和并集运算，符合以下四种运算律：

交换律

$$A \cup B = B \cup A$$
$$A \cap B = B \cap A$$

结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

分配律

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$
$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

对偶律（德摩根定律）

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

1.2 关系

在事件间，存在如下两种关系：

互斥事件

$$A \cap B = \varnothing$$

对立事件

$$A \cap B = \varnothing \wedge A \cup B = \Omega.$$

1.3 频率和概率

Definition 1.1:

频率

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

概率

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} f_n(A) \to P$$

Properties 1.1:

非负性

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

规范性

$$P(\Omega) = 1, P(\varnothing) = 0$$

无限可加性

If $A \cap B = \varnothing$
then $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

互补性

$$P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$$

概率之间存在如下运算：

Definition 1.2 （运算）：

1. 减法：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$，If $B\subset A, P(A-B)=P(A)-P(B)$
2. 加法：$P(A+B)=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$
3. 乘法：$P(AB)=P(A\cap B)=P(A)P(B\mid A)$

1.4 条件概率

Definition 1.3： 如果 $P(A)>0$，则条件概率为 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$。

依此，我们有两条推广式：
1. $P(B\cup C\mid A)=P(B\mid A)+P(C\mid A)-P(BC\mid A)$
2. $P(B-C\mid A)=P(B\mid A)-P(BC\mid A)$

1.5 全概率与贝叶斯公式

Definition 1.4 （完备事件组）： $S=\{A_1,A_2,A_3,...,A_n\}$ 是一个属于 Ω 的事件组，并且满足 $\forall A_1,A_2\subset S, A_1\cap A_2=\varnothing, \wedge\ A_1\cup A_2\cup A_3\cup ...\cup A_n=\Omega$，则 S 为一个完备事件组。

由定义，我们可以设 B 是一个随机事件，$\{A_1,A_2,...,A_i\}$ 是一个完备事件组，我们有：

Formula 1.1 （全概率公式）：

$$\begin{aligned}P(B)&=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i)\\&=\sum_{i=1}^{n}P(BA_i)\end{aligned}$$

Formula 1.2 （贝叶斯公式）：

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_iB)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i)}$$

1.6 事件的独立性

若 A，B 是相互独立事件，则有

$$\begin{aligned}P(A\mid B)=P(A)&\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)\\&\Leftrightarrow P(B\mid A)=P\left(B\mid\overline{A}\right)\\&\Leftrightarrow P\left(B\mid\overline{A}\right)=P(B)\end{aligned}$$

且 $A,\overline{A},B,\overline{B}$ 也相互独立，此外有

若A,B,C 互为独立事件 $\longrightarrow$ A,B,C 两两独立
若A,B,C 互为独立事件 $\longrightarrow$ 关于 A,B 的加法，乘法，减法以及逆运算也分别独立与 C 和 $\overline{C}$

1.7 伯努利概型

Definition 1.5 （伯努利实验）： 实验只有两种可能结果 $A,\overline{A}$ 的实验叫做伯努利实验。

Formula 1.3 （二项概率公式）：

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

2 随机变量及其分布

2.1 $R.V.$ 和 分布函数

$R.V.$ 是一个从随机试验 E 的样本空间 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的一个映射。

2.2 分布函数

Definition 2.1: 设 X 是一个随机变量， r 是任意实数，则称事件 $\{X \leq r\}$ 的概率为 $R.V.$ X 的分布函数，计作 $F(r)$。

分布函数有如下性质:

Properties 2.1 （范围概率）： $P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} = F(x_2) - F(x_1)$

Properties 2.2 （增减性）： $F(x)$ 是一个不减函数

Properties 2.3 （规范性）： $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

2.3 离散型随机变量及其分布

2.3.1 常见的分布

Definition 2.2 （0 - 1 分布）： 若随机变量 X 分布服从下方分布列，其中 $0 < p < 1$，则称为 0 - 1 分布或两点分布。

X	0	1
P	p	$1-p$

Definition 2.3 （二项分布）： 计作 $X \sim B(n, p)$

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k \in \{x \mid x \in \mathbb{N}^+ \cap [0, n]\}$$

Definition 2.4 （泊松分布）： 计作 $X \sim P(\lambda)$

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \qquad (\lambda > 0)$$

Definition 2.5 （几何分布）： $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}P$

Definition 2.6 （超几何分布）： 计作 $X \sim H(N, M, n)$

$$P\{X = k\} = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}},\ k \in \{1, 2, 3, ... \min(M, N)\}$$

Theorem 2.1（泊松定理）： 当 $X \sim B(n,p)$ 且 n 充分大，p 充分小时

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \lambda = np$$

2.4 连续型随机变量

Definition 2.7（分布函数）： 若 $f(t)$ 是概率密度函数，则分布函数 $F(x)$ 为

$$F(X) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$$

Formula 2.1（区间概率公式）： $F\{a < X < b\} = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

2.4.1 常见形式

Definition 2.8（均匀分布）：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & b < x < a \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Definition 2.9（指数分布）：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x > 0 \\ 0, & \text{otherwize} \end{cases}$$

指数分布具有无记忆性，即 $P\{x > t+T \mid x > t\} = P\{x > T\}$。

2.4.2 正态分布

Definition 2.10（正态分布）： 计作 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma > 0$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ x \in \mathbb{R}$$

Properties 2.4（可加性）： 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 则有
$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$

Annotation 2.1: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{A}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{A\pi},\ A > 0$

Proof: 设 $X \sim N\left(0, \frac{A}{2}\right)$, 因为概率分布函数具有规范性 $F(+\infty) = 1$ 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1$. 带入得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{A\pi}}e^{-\frac{x^2}{A}}\,\mathrm{d}x = 1$$
$$\frac{1}{\sqrt{A\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{A}}\,\mathrm{d}x = 1$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{A}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{A\pi}$$

□

Definition 2.11 （标准正态分布）： 当 $\mu=0,\sigma^2=1,X\sim N(0,1),x\in\mathbb{R}$时，其为标准正态分布。

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}-e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$\Phi(x)=F(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)\,\mathrm{d}t$$

Definition 2.12 （标准化）： 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 不满足标准正态分布，则 $\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

根据标准化，如果我们想要计算一个满足非标准化的正态分布的随机变量在范围 $(a,b]$上的概率，我们可以 X 先将其标准化为 $\frac{X-\mu}{\sigma}$ 并计算 $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 即可。

Definition 2.13 （分位点）： μ_α 表示 $P\{x>\mu_\alpha\}=\alpha$. 并且有 $\mu_{1-\alpha}=\mu(-\alpha)$.

2.5 随机变量的分布

对于离散型随机变量，我们可以先求出取值，在分别对对应的取值求出概率。而对于连续性随机变量，重点是求其密度函数：即已知 $X\sim f_X(x),Y=g(X)$，求 $R.V.Y$ 的分布函数 $f_Y(y)$。

首先介绍根据分布函数求 $R.V.Y$ 的 密度函数的方法：

Annotation 2.2 （根据分布函数法）：

1. 首先，找到密度函数 $f_Y(y)$ 的分段点，一般有如下两种情况
   1. $f_X(x)$ 的分段点，带入 $g(x)$ 后得到的 y 的值，和
   2. $y=g(x)$ 的最值
2. 其次，根据以上分段点，求出区间 $(l,r]$ 的 $F_Y(y)$：

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(x)\le y\}=\int_l^r f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

3. 最后，对求出的分布函数求导即可得到随机变量 y 的密度函数 $f_Y(y)={F_Y}'(y)$。

除此之外，还可以用下方的定理中的公式来进行求解：

Formula 2.2： 设 $f_X(x)$ 随机变量 X 的密度函数，对于随机变量 Y 有 $Y=g(X)$，且 $g(X)$ 为单调函数，令 $x=h(y)$ 是 $y=g(x)$ 的反函数，α,β 分别是 $g(x)$ 的最小值和最大值。则 $Y=g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$ 为：

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(h(y))|h'(y)|, & \alpha<y<\beta\\ 0 & ,\ \text{其他}\end{cases}$$

3 多维随机变量

3.1 二维随机变量和联合分布函数

Definition 3.1 （二维随机变量）： 设随机试验 E 的样本空间 $\Omega=\{e\}$，$X=X(e),Y=Y(e)$ 的定义在 Ω 上的随机变量，则 (X,Y) 为定义在 Ω 上的二维随机变量。

Definition 3.2 （联合分布函数）：设 $x,y\in\mathbb{R}$，则 x,y 的联合分布函数为事件 $\{X\le x\}$ 与事件 $\{Y\le y\}$ 同时发生的概率为二维随机变量的联合分布函数

$$F(x,y)=P\{(X\le x)\cup(Y\le y)\}\overset{\text{计作}}{=}P\{X\le x,Y\le y\}$$

随机变量的分布函数的几何意义为在二维坐标轴中，$F(x,y)$ 为 $X \le x$ 与 $Y \le y$ 所围成的矩形区域的面积。易得，点 (X,Y) 落在 $\{(x,y) \mid x_1 < x \le x_2, y_1 < y \le y_2\}$ 区域的概率为
$F(x_2,y_2) - F(x_2,y_1) - F(x_1,y_2) + F(x_1,y_1)$。

3.2 连续型随机变量

Definition 3.3 （密度函数）： 联合概率密度指的是对于二维随机变量 (X,Y)，其概率分布函数为

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

其中的非负函数 $f(x,y)$ 即为联合概率密度。

二维随机变量的联合密度函数有如下性质：

Properties 3.1：

1. 非负性：

$$f(x,y) \ge 0$$

2. 规范性：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = F(\infty,\infty) = 1$$

3. 设 G 是平面 xOy 上的闭区域，则点 (X,Y) 落在 G 区域上的概率为

$$F\{(X,Y) \in G\} = \iint_{G} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

3.2.1 常见形式

Definition 3.4 （均匀分布）：

$$f(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{S_G}, (u,v) \in G \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

3.3 边缘分布

Definition 3.5 （分布函数）： 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(X,Y)$，Ω 为完备事件组，则 $F_X(x) = P\{X \le x, \Omega\}, F_Y(y) = P\{\Omega, Y \le y\}$ 分别为 二维随机变量关于 X 或 Y 的边缘分布函数。

Definition 3.6 （分布律 / 质量函数）： 已知 二维随机变量 (X,Y) 的分布律为
$P\{X,Y\} = P\{X = x_i \cap Y = y_i\}$ 则关于 X 的边缘分布律为

$$P_X(x) = \sum^{i} P(x,y_i)$$

Definition 3.7 （密度函数）： 设 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)$ 则关于 X 的边缘密度函数和关于 Y 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

3.4 条件分布

Definition 3.8 （分布律）： 有二维随机变量 (X,Y)

$$P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P_Y\{Y=y_j\}}$$

即为随机变量 X 在 $Y=y_j$ 下的条件分布律

Definition 3.9 （密度函数）： 有二维随机变量 (X,Y) 及其联合概率密度$f(x,y)$，固定 $Y=y$，则随机变量 X 在 $Y=y$ 条件下的概率密度函数为 $f_{X\mid Y}=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

3.5 独立性

Definition 3.10： 有二维随机变量 (X,Y)，$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$ 满足独立。对于离散型随机变量， 独立性在于是否满足 $P(x,y)=P_X(x)P_Y(y)$。对于连续性随机变量， 在于其密度函数是否满足 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。

3.6 二维连续型随机变量的分布

对于离散型随机变量，依旧是先求取值，再求概率，而对于两个连续型随机变量，我们有如下方法:

Formula 3.1 （分布函数法）： 有二维随机变量 (X,Y) 及其联合概率分布 $f(x,y)$， 已知 $Z=g(X,Y)$，则 Z 的概率分布为

$$\begin{aligned}F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}&=P\{(X,Y)\mid g(X,Y)\le z\}\\&=\iint\limits_G f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

或使用卷积公式:

Formula 3.2 （卷积公式）： 若随机变量 X,Z,Y 存在 $Z=X+Y$ 关系，则

X,Y 不独立	X,Y 独立
$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\,\mathrm{d}x$	$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$

Proof: 对于 $Z=X+Y$

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

令 $y+x=t$ 将二重积分中对 y 的积分换为对 t 的积分得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z}f(x,t-x)\,\mathrm{d}t$$

改变积分次序后得

$$\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,t-x)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t$$

要求 Z 的密度函数，对变上限积分求导可得

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\,\mathrm{d}x$$

若 (X,Y) 独立，又有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$$

□

4 随机变量的数字特征

4.1 数学期望

Definition 4.1 （离散型）： 对于离散型随机变量 X，设 x_i 为其分布律的第 i 个取值，相应概率为 p_i， 则其数学期望（均值）为:

$$E(X)=\sum^{i}x_ip_i$$

Definition 4.2 （连续型）： 若连续型随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$ 则它的均值为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\,\mathrm{d}x$$

若要求 $Y=g(X)$ 的均值，则

$$E(g(X))=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

若 $Z=g(X,Y)$ 且二维随机变量 (X,Y) 有联合概率密度 $f(x,y)$ 则

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Properties 4.1： 有常数 C，随机变量 X 与 Y:
1. $E(C)=C$
2. $E(C+X)=C+E(X)$
3. $E(CX)=CE(X)$
4. $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$
5. 若 X,Y 独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$

4.2 方差

Definition 4.3： 方差为随机变量与其均值的距离的平方的均值即 $D(X)=E\left[(X-E(X))^2\right]$， 其用来表示 X 偏离其均值 $E(X)$ 的程度大小。且方差 $D(X)\geq 0$。

Formula 4.1 （方差计算公式）： $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

Properties 4.2： C 为常数
1. $D(C)=0$
2. $D(X+C)+D(X)$
3. $D(CX)=C^2D(X)$
4. $D(X+Y)=D(X)+D(Y)-2[E(XY)-E(X)E(Y)]$

4.3 常见形式

Theorem 4.1 （0 - 1 分布）： 若随机变量 X 服从 $0-1$ 分布，则

$$E(X)=p, D(X)=p(1-p)$$

Theorem 4.2 （二项分布）： 若随机变量 X 服从二项分布即 $X \sim B(n,p)$ 则

$$E(X)=np, D(X)=np(1-p)$$

Proof: 若随机变量 $X \sim B(n,p)$ 则其含义为 n 重伯努利实验中成功的次数即
$X=X_1+X_2+...+X_n$，其中 X_i 表示第 i 次伯努利实验， 每次伯努利实验独立且都有相同的 p，即 $E(X_i)=p$， 则

$$\begin{aligned} E(X)&=E(X_1+X_2+...+X_n)=np \\ D(X)&=D(X_1+X_2+...+X_n)=np(1-p) \end{aligned}$$

□

Theorem 4.3 （泊松分布）： 若随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布即 $X \sim P(\lambda)$ 则

$$E(X)=D(X)=\lambda$$

Theorem 4.4 （均匀分布）： 若 $X \sim U(a,b)$ 则

$$E(X)=\frac{a+b}{2}, D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$$

Theorem 4.5 （指数分布）： 若 $X \sim e(\lambda)$ 则

$$E(X)=\frac{1}{\lambda}, D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$$

Theorem 4.6 （正态分布）： 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 则

$$E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$$

4.4 协方差

Definition 4.4 （协方差）： 有二维随机变量 (X,Y)，称 $E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$ 为随机变量 (X,Y) 的协方差， 通常计作 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 即

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}(X,Y)&=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] \\ &=E(XY)-E(X)E(Y) \end{aligned}$$

特别的，相同变量的协方差为其方差 $\operatorname{cov}(X,X)=D(X)$。

已知方差的性质 3：$D(X+Y)=D(X)+D(Y)-2[E(XY)-E(X)E(Y)]$， 我们将协方差的计算公式带入可得到 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)-2\operatorname{cov}(X,Y)$。

Properties 4.3： 协方差有以下性质

1. $\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(Y,X)$
2. $\operatorname{cov}(aX,bY)=ab\ \operatorname{cov}(X,Y)$
3. $\operatorname{cov}(X+Y,Z)=\operatorname{cov}(X,Z)+\operatorname{cov}(Y,Z)$
4. 若 X,Y 相互独立，则 $\operatorname{cov}(X,Y)=0$

Definition 4.5 （相关系数）： 有随机变量 X, Y，则其相关系数为：

$$\rho_{XY} = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

Properties 4.4： 相关系数有以下性质

1. $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$
2. 相关性
   1. 若相关系数 $\rho_{XY} = 0$ 则称 X, Y 不相关
   2. 若 $\rho_{XY} = 1$，则称 X, Y 为正相关，$y = ax + b, a > 0$
   3. 若 $\rho_{XY} = -1$，则称 X, Y 为负相关，$y = ax + b, a < 0$

5 大数定律和中心极限定理

5.1 大数定律

Theorem 5.1 （切比雪夫不等式）： 有随机变量 X 及其均值 $E(X)$ 方差 $D(X)$，存在任意正数 ε 有

$$P\{|\ X - E(X)\ | \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

另有

$$P\{|\ X - E(X)\ | < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

Theorem 5.2 （切比雪夫大数定律）： 设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 是相互独立的随机变量序列，且 $E(X_i), D(X_i)$ 均存在， 且 $D(X_i) \leq C$，记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 则对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n \to +\infty} P\Big\{|\ \overline{X} - E\big(\overline{X}\big)\ | < \varepsilon\Big\} = 1$$

$$\Leftrightarrow \overline{X} \text{ 依概率收敛到 } E\big(\overline{X}\big) \text{ 即: } \overline{X} \xrightarrow{P} E\big(\overline{X}\big)$$

Theorem 5.3 （伯努利大数定律）： 设 n_A 为 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，且 $P(A) = p$，则对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n \to +\infty} P\left\{|\ \frac{n_A}{n} - p\ | < \varepsilon\right\} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$$

Theorem 5.4 （辛钦大数定律）： 有随机变量序列 $X_1, X_2, ..., X_n$，随机变量间相互独立且服从同一分布，$E(X_i)$ 存在， 则对于任意正数 ε 有

$$\lim_{n \to +\infty} P\Big\{|\ \overline{X} - E\big(\overline{X}\big)\ | < \varepsilon\Big\} = 1$$

$$\Leftrightarrow \overline{X} \xrightarrow{P} E\big(\overline{X}\big)$$

5.2 中心极限定理

独立随机变量的和的分布当随机变量的个数足够大的时候，近似的服从正态分布。

Theorem 5.5 （独立同分布（列维 – 林德伯格）中心极限定理）： 若一随机变量序列 $X_1, X_2, ..., X_n$ 服从同一分布且具有相同的期望 $E(X_i) = \mu$， 相同的方差 $D(X_i) = \sigma^2$，将 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 计作 η_n 则当 n 充分大的时候，有

$$\begin{aligned} \eta_n \text{ 近似服从 } & N(E(\eta_n), D(\eta_n)) \\ & = N(n\mu, n\sigma^2) \end{aligned}$$

又由正态分布的标准化可得

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \text{ 近似服从 } N(0,1)$$

Theorem 5.6 （棣莫弗 – 拉普拉斯（De Moivre – Laplace）定理）： 若随机变量 $X_n, n = 1, 2, ...$ 服从参数为 n, p 的二项分布，也即随机变量 X 可以分为 n 的相互独立的随机变量 X_i 服从 $0 - 1$ 分布，对于任意的 x 有

$$\lim_{n \to +\infty} P\left\{ \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x \right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{t^2}{2}} \, \mathrm{d}t = \Phi(x).$$

也即：当 n 充分大时，$\sum_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从参数为 np 与 $np(1-p)$ 的正态分布， 进而 $\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从标准正态分布。

6 样本与抽样分布

6.1 基本概念

Definition 6.1 （样本）： 设随机变量 X 服从分布 F，若随机变量序列 $X_1, X_2, ..., X_n$ 具有同一分布 F 且相互独立， 则称这一随机变量序列为从总体 F 或总体 X 得到的容量为 n 的样本，$x_1, x_2, ..., x_n$ 为 X 的 n 个独立观测值。

反之，若一随机变量序列是总体 F 的一个样本，则序列中的随机变量同分布为 F 且相互独立。

Definition 6.2 （经验分布函数）： 有 样本 $x_1, x_2, ..., x_n$，用$S(x), -\infty < z < \infty$ 表示 $x_1, x_2, ..., x_n$ 中不大于 x 的随机变量的个数，定义经验分布函数 $F(z)$ 为

$$F_{n(x)} = \frac{1}{n} S(x), \quad -\infty < x < \infty$$

6.1.1 统计量

Definition 6.3 （统计量与统计量的观测值）： 若有一随机变量序列 $X_1, X_2, ..., X_n$ 是总体 F 的一个容量为 n 的样本， 则称不含有位置参数的函数函数 $g(X_1, X_2, ..., X_n)$ 为统计量。

由定义可知，$g(X_1, X_2, ..., X_n)$ 也是一个随机变量，若有 $x_1, x_2, ..., x_n$ 是样本的观测值，则 $g(x_1, x_2, ..., x_n)$ 是随机变量 $g(X_1, X_2, ..., X_n)$ 的观测值。

有总体 $X, E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$， 下方为常见的统计量:

Definition 6.4 （样本平均值）： $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$.

根据定义可得 $E\left(\overline{X}\right)=\mu, D\left(\overline{X}\right)=\frac{\sigma^2}{n}$

Definition 6.5 （样本方差）： $S^2=\frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)$

根据定义可得，$E(S^2)=D(X)=\sigma^2$

Definition 6.6 （样本标准差）： $S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2}$

Definition 6.7 （样本 k 阶原点矩）： $A_k=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k,\quad k=1,2,3,...$

Definition 6.8 （样本 k 阶中心矩）： $B_k=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^k,\quad k=2,3,...$

6.2 抽样分布

抽样分布即为统计量为 $g(X_1,X_2,...,X_n)$ 的分布，在做题时题目一般会给出提示数据，可以查表求解。

6.2.1 χ^2 分布，t 分布和 F 分布

Definition 6.9 （ χ^2 分布 ）： 设样本 $X_1,X_2,...,X_n$ 相互独立，且均服从 $N(0,1)$ 分布，则有 $X=X_1^2+X_2^2+...+X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布， 即 $X\sim\chi^2(n)$。

χ^2 分布有如下几条性质：

Properties 6.1:

1. 可加性

若 $X\sim\chi^2(n_1),Y\sim\chi^2(n_2)$ 则 $X+Y\sim\chi^2(n_1+n_2)$.

2. 均值与方差

若 $X\sim\chi^2(n)$，则 $E(X)=n,D(X)=2n$.

3. 上 α 分位点

在 χ^2 分布的密度图形中，当 $x=x_\alpha$ 时，$x>x_\alpha$ 的面积为 α， 称此点为上 α 分位点。此时有 $P\{X>x_\alpha\}=\alpha$.

Definition 6.10 （t 分布）： 若有 $X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$ 且相互独立，则

$$\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}=t\sim t(n)$$

Definition 6.11 （F 分布）： 若有 $X_1\sim\chi^2(n_1),X_2\sim\chi^2(n_2)$ 且相互独立，则

$$\frac{X_1/n_1}{X_2/n_2}=F\sim F(n_1,n_2)$$

与 χ^2 分布类似的，t 分布及 F 分布都具有上 α 分位点。

Definition 6.12 （正态总体的样本均值与样本方差的分布）： 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$X_1, X_2, ..., X_n$ 为总体的一个样本，则

1. $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
2. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
3. $\overline{X}$ 与 S^2 独立
4. $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

7 参数估计

7.1 点估计

Definition 7.1： 已知总体 X 的分布，含有未知参数 θ，用样本做参数来构造统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, ..., X_n)$ 来估计 θ。

由一阶矩估计（点估计）推广到 k 阶矩估计，由大数定理可得，当数量足够大时，样本矩趋近于总体矩， 根据矩估计中用样本矩代替总体矩的思想，由总体的分布可以得到总体矩，接着用样本矩代替总体矩， 也即构造未知参数 θ 与样本矩的等价关系。最后解得 $\hat{\theta}$ 即为矩估计量。

7.1.1 最大似然估计

基本思想是使得样本发生的概率最大的 $\hat{\theta}$ 即为最大似然估计。

在最大似然估计中，用似然函数去刻画样本出现的概率大小，对于离散型随机变量， 其最大似然函数即为样本间质量函数的积，基本思想是使得样本发生的概率最大的 $\hat{\theta}$ 即为最大似然估计。

在最大似然估计中，用似然函数去刻画样本出现的概率大小，其形式如下:

$$L(\theta) = \prod_{i=0}^{n} P\{X = X_i\} \quad \text{（离散型随机变量）}$$

$$\prod_{i=0}^{n} f(x_i) \quad \text{（连续型随机变量）}$$

在求解最大似然估计时，一般通过求导求其导数的驻点来得到 $\hat{\theta}$， 对于连乘函数形式的似然函数而言，可以先等式两边同时取 **对数** 使连乘变为连加， 再求导求驻点即 $\frac{\mathrm{d}\ln \mathrm{Li}(\theta)}{\mathrm{d}\theta} \triangleq 0$。

7.2 评选标准

1. 无偏性，若 $E\left(\hat{\theta}\right) = \theta$ 则称 $\hat{\theta}$ 为无偏估计， 若 $\lim\limits_{n\to\infty} E\left(\hat{\theta}\right) = \theta$ 则称为渐进无偏估计。
2. 有效性，若对于未知参数 θ 有两个估计量 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$， 两者当中方差较小的估计量更有效。
3. 一致性，若 n 趋于无穷时，估计量以概率趋紧于未知参数，则称估计量与为质量一致，一般的， 若估计量的均值等于未知参数及具有无偏性，估计量的方差趋近于零，即具有有效性， 则满足估计量与未知参数具有一致性。

7.3 区间估计

Definition 7.2 （置信区间）： 对于总体的一个未知参数 θ，存在一个 α，使得 $P\left\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\right\} = 1 - \alpha$， 则称 $\left(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2\right)$ 为置信区间。

在求解置信区间时，通常先构造一个确定分布的含有参数 θ 的样本统计量，也称作枢轴量 J， 根据其分布求出 $P\{a < J < b\} = 1 - \alpha$，的左右端点 a, b （一般是由其分布的函数图像总结而来，用上分位点表示），进而解出 θ 的置信区间。

在构造枢轴量时，可以根据正态总体的样本均值与样本方差的分布来进行构造。

Annotation 7.1：当 σ^2 已知时，求未知参数 μ 的置信区间，构造枢轴量

$$J=\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$$

此时，满足 $P\left\{-z_{\frac{\alpha}{2}}<J<z_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$。

Annotation 7.2：当 σ^2 未知时，求未知参数 μ 的置信区间，构造枢轴量

$$J=\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$$

此时，满足 $P\left\{-t_{(\frac{\alpha}{2},n-1)}<J<t_{(\frac{\alpha}{2},n-1)}\right\}=1-\alpha$。

Annotation 7.3：当 μ 未知时，求 σ^2 的置信区间，构造枢轴量

$$J=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$$

此时，满足 $P\left\{-\chi^2_{(\frac{\alpha}{2},n-1)}<J<\chi^2_{(\frac{\alpha}{2},n-1)}\right\}=1-\alpha$。

8 假设检验

假设检验即对于所要检验的参数 θ，首先根据题意设定一个假设值 $H_0=\theta$，求其所构造枢轴量 J 的满足 $P\{\theta_1<J<\theta_2\}=1-\alpha$ 的区间 (θ_1,θ_2)，其补集 $(-\infty,\theta_1)\cup(\theta_2,+\infty)$ 为**拒绝域**，将假设值代入所构造的枢轴量，若结果落在拒绝域上，则拒绝假设 H_0。