

Имеются следующие базовые объекты:

- учителя $T = \{t_1, \dots, t_n\}$
- учебные группы $G = \{g_1, \dots, g_m\}$
- временные слоты на период составления расписания $S = \{s_1, \dots, s_p\}$

Множество слотов S при этом состоит из d отрезков, каждый размером в p_d , соответствующих дням, т.е. $p = d \cdot p_d$ ($d, p_d \in \mathbb{N}$). Несмотря на то, что d в общем случае произвольное, будем иногда называть период составления расписания *неделей*.

Для множества X будем через X_\perp обозначать множество $X \cup \{\perp\}$, где \perp - некоторое специальное значение, не входящее ни в одно из рассматриваемых нами множеств.

Нужно составить *расписание* $A \in G_\perp^{n \times p}$, где $a_{i,k}$ означает группу, которой во время s_k должен преподавать учитель t_i , либо, если $a_{i,k} = \perp$, что этот учитель в это время свободен. Расписание должно удовлетворять следующим *жёстким требованиям* (используется нотация Айверсона):

- Так как мы составляем расписание с точки зрения учителей, то автоматически выполняется, что каждый учитель в каждый слот преподаёт только одной группе. Аналогичное же правило для групп нужно потребовать дополнительно:
 $\forall i_1 = \overline{1, n}, i_2 = \overline{i_1 + 1, n}, j = \overline{1, m}, k = \overline{1, p} \ [a_{i_1, k} = g_j \wedge a_{i_2, k} = g_j] = 0 \ (hard_1(A))$
- Задана матрица $R \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{n \times m}$. Учитель t_i должен провести у группы g_j ровно $r_{i,j}$ занятий за неделю, то есть $\forall i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m} \ \sum_{k=1}^p [a_{i,k} = g_j] = r_{i,j} \ (hard_2(A))$
- Задана матрица $F \in \{0, 1\}^{n \times p}$, где $f_{i,k}$ задаёт доступность учителя t_i во время s_k . Нужно, чтобы выполнялось $\forall i = \overline{1, n}, k = \overline{1, p} \ [a_{i,k} \neq \perp] \leq f_{i,k} \ (hard_3(A))$

Введём вспомогательную функцию k , определённую для $x \in \{1, \dots, d\}$ и $y \in \{1, \dots, p_d\}$ как $k(x, y) = (x - 1)p_d + y$, то есть сопоставляющую номеру дня и номеру слота внутри дня глобальный номер этого слота.

Жёсткие требования определяют множество *допустимых* решений, на котором мы уже будем стремиться как можно лучше в некотором смысле удовлетворить *мягким требованиям*. Введём некоторые функции.

- Учителям удобнее разместить свои занятия по возможности компактнее, то есть минимизировать количество *дырок* — пустых слотов, по обе стороны от которых в этот день у этого преподавателя есть занятия. Таким образом, $\forall i = \overline{1, n}$ и для расписания A определим функцию $holes_i(A) = \sum_{x=1}^d \sum_{y=1}^{p_d} ([a_{i,k(x,y)} = \perp] \cdot [\sum_{y_1=1}^{y-1} \sum_{y_2=y+1}^{p_d} [a_{i,k(x,y_1)} \neq \perp \wedge a_{i,k(x,y_2)} \neq \perp] > 0])$
- Даже если учитель может провести занятие в какое-то время, оно может быть для него неудобным, то есть имеется мягкая версия требования $hard_3$. Эти *удобства* будут задаваться с помощью аналогичной по формату матрицы $C \in \{0, 1\}^{n \times p}$, где $c_{i,k} = 1$, если учителю t_i *удобно* провести занятие во время s_k . Таким образом, $\forall i = \overline{1, n}$ и для расписания A определим функцию $inconvenient_i(A) = \sum_{k=1}^p [a_{i,k} \neq \perp] \cdot [c_{i,k} = 0]$

Назначим первой разновидности мягких требований некоторый вес w_1 , а второй некоторый вес w_2 . Например, можно положить $w_1 = 1, w_2 = 3$, но для общей постановки константы несущественны. В итоге получаем следующую задачу:

$$\begin{aligned}
& \text{minimize}_{A \in G_{\perp}^{n \times p}} L(A) = \sum_{i=1}^n (w_1 \cdot \text{holes}_i(A) + w_2 \cdot \text{inconvenient}_i(A)) \\
& \text{s.t. } \text{hard}_1(A) \wedge \text{hard}_2(A) \wedge \text{hard}_3(A)
\end{aligned}$$