

1) Stabilire che il seguente integrale improprio diverge positivamente

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) dx$$

La funzione integranda è continua su $(0, +\infty)$ ed ha un'asintoto verticale a destra per $x \rightarrow 0^+$

Possiamo quindi considerare separatamente

$$\int_0^a \sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) dx \quad \text{e} \quad \int_a^{+\infty} \sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) dx$$

dove a è un qualunque numero in $(0, +\infty)$

Studiamo $\int_a^{+\infty} \sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) dx$

Poiché $\arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) \sim \frac{x^2}{x^3+4} \sim \frac{1}{x}$ per $x \rightarrow +\infty$

e $\sqrt{\frac{x+2}{x}} \rightarrow 1$ per $x \rightarrow +\infty$

$\sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) \sim \frac{1}{x}$ per $x \rightarrow +\infty$

e quindi $\int_a^{+\infty} \sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) dx = +\infty$

Dato che $\sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) > 0$ su $(0, +\infty)$

$\int_0^a \sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) dx \neq -\infty$

e dunque $\int_0^a \dots + \int_a^{+\infty} \dots$ non

è una forma indeterminata; d'altro canto per $x \rightarrow 0^+$

$\sqrt{\frac{x+2}{x}} \sim \sqrt{\frac{2}{x}}$ e $\arctan\frac{x^2}{x^3+4} \sim \frac{x^2}{x^3+4} \sim \frac{x^2}{4}$ quindi

$\sqrt{\frac{x+2}{x}} \arctan\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) \sim \frac{x^{3/2}}{2\sqrt{2}}$ per $x \rightarrow 0^+$, di conseguenza

la funzione integranda ha limite finito ($=0$) per $x \rightarrow 0^+$ ed è quindi integrabile in $[0, a]$

Pertanto

lim

Pertanto

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{x+2}{x}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x^2}{x^3+4}\right) dx = +\infty$$

2) Determinare il dominio della funzione


$$f(x,y) = (x^2+y^2) \log(x-y)$$

Rappresentarlo graficamente sul piano. Dimostrare poi che f è differenziabile sul suo dominio. Calcolare quindi $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1,0)$ al vettore del vettore $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$.

$$\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x-y > 0\}$$

Dunque il dominio di f è aperto ed è dato da i punti (x,y) per cui

$y < x$: è quindi il semipiano aperto colorato in figura



$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x \log(x-y) + \frac{x^2+y^2}{x-y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y \log(x-y) - \frac{x^2+y^2}{x-y}$$

Entrambe le derivate parziali sono continue su $\operatorname{dom} f$ e quindi per il teorema del differenziale f è differenziabile su $\operatorname{dom} f$.

Il punto $(1,0) \in \operatorname{dom} f$.

$$\begin{aligned} \text{Poiché } f \text{ è in differenziabile } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1,0) &= \nabla f(1,0) \cdot \mathbf{v} = \\ &= 1 \cdot v_1 - 1 \cdot v_2 = v_1 - v_2 \end{aligned}$$

3) Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' + 6y' + 9y = -e^{-3x} \log x$$

d'equazione caratteristica $\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0$ che ha un'unica soluzione

$\lambda = -3$. Quindi l'integrale generale dell'equazione

omogenea associata è $y(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Cerchiamo una soluzione particolare con il metodo di variazione delle costanti arbitrarie (dato che il termine noto $q(x) = -e^{-3x} \log x$ non rientra nella classe di funzioni per cui è possibile applicare il metodo di similitudine)

$$\begin{cases} c_1'(x) e^{-3x} + c_2'(x) x e^{-3x} = 0 \\ c_1'(x) (-3e^{-3x}) - c_2'(x) (e^{-3x} - 3x e^{-3x}) = -e^{-3x} \log x \end{cases}$$

$$c_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x e^{-3x} \\ -e^{-3x} \log x & e^{-3x} - 3x e^{-3x} \end{vmatrix}}{W(x)}$$

$$c_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^{-3x} & 0 \\ -3e^{-3x} & -e^{-3x} \log x \end{vmatrix}}{W(x)}$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{-3x} & x e^{-3x} \\ -3e^{-3x} & e^{-3x} - 3x e^{-3x} \end{vmatrix} = e^{-6x} - 3x e^{-6x} + 3x e^{-6x} = e^{-6x}$$

$$c_1'(x) = \frac{x e^{-6x} \log x}{e^{-6x}} = x \log x$$

$$c_2'(x) = \frac{-e^{-6x} \log x}{e^{-6x}} = -\log x$$

$$c_1(x) = \int x \log x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \log x - \frac{1}{4} x^2$$

$$c_2(x) = -\int \log x \, dx = -x \log x + x$$

l'integrale generale è quindi

$$y(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-3x} \log x - \frac{1}{4} x^2 e^{-3x} - x^2 e^{-3x} \log x + x^2 e^{-3x}$$

-3x -3x 2, 2, -3x 1, 2, -3x 2, 2, -3x

$$y(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-3x} \log x - \frac{1}{4} x^2 e^{-3x} - x^2 e^{-3x} \log x + x^2 e^{-3x}$$

$$= c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x} + \frac{3}{4} x^2 e^{-3x} - \frac{1}{2} x^2 e^{-3x} \log x$$

- 4) Dare la definizione di dominio normale rispetto ad uno dei due assi cartesiani. Richiamare poi le formule di riduzione per l'integrale di una funzione continua su un dominio normale D .

Dimostrare infine che nel caso in cui D sia il triangolo di vertici $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ e f è continua su D si ha

$$\int_0^1 \left(\int_0^{1-x} f(x,y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} f(x,y) dx \right) dy$$

Si veda, ad esempio, le lezioni 22-23, per le definizioni.

L'ultima parte dell'esercizio è un'immediata

conseguenza delle formule di riduzione tenendo

presente che T è normale rispetto ad entrambi gli assi cartesiani:

$$T = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq 1-x \}$$

$$= \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1 \wedge 0 \leq x \leq 1-y \}$$