



Politecnico di Bari  
CUC Ingegneria dell'Informazione  
CdL Ingegneria delle Telecomunicazioni  
AA 2006 - 2007

Corso di Analisi Matematica II - Tracce di esame  
Docente: Dott. E. Caponio

- 1) Dare la definizione di serie numerica divergente positivamente.

Stabilire il carattere delle seguenti serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(e - \frac{1}{e^n}\right) e^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{2n^3 - \pi}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n - 2 + n \log n}{n^{5/2}}.$$

- 2) Enunciare il teorema di integrazione per serie.

Applicarlo per determinare lo sviluppo in serie di MacLaurin della funzione  $f(x) = \frac{\log(1+x)}{x}$ .

Applicarlo infine per calcolare con un errore inferiore a  $1/100$

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x}.$$

- 3) Determinare e rappresentare graficamente l'insieme di definizione della funzione

$$f(x, y) = \frac{y^4(x+1)^2 \log \sqrt{(x+1)y}}{(x+1)^{3/2} + \sqrt{y}}.$$

Dare, quindi, la definizione di punto di accumulazione per un insieme. Stabilire inoltre se il punto  $(-1, 0)$  è di accumulazione per l'insieme di definizione di  $f$  e in tal caso calcolare

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,0)} f(x, y).$$

- 4) Dare la definizione di funzione differenziabile in un punto.

Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  un insieme aperto; dimostrare che se  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  è differenziabile in  $x_0 \in A$ , allora  $f$  è continua in  $x_0$ .

Considerare poi le funzioni  $g(x, y) = xe^y + 2$  e  $f(\xi, \eta) = (\xi\eta, \xi - \eta)$ . Dimostrare che la funzione  $g \circ f$  è differenziabile in  $\mathbb{R}^2$  e calcolare  $\nabla(g \circ f)(\xi, \eta)$ , per ogni  $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$ .

- 1) Dare la definizione di serie numerica convergente.

Stabilire il carattere delle seguenti serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\pi - \frac{\pi}{2^n}\right) 2^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{2n^2 - e}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2 + n + n \log(n^2)}{n^{5/2}}.$$

- 2) Scrivere lo sviluppo in serie di MacLaurin della funzione  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ .

Enunciare poi il teorema di integrazione per serie.

Applicarlo per calcolare con un errore inferiore a  $1/100$

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x}.$$

- 3) Determinare e rappresentare graficamente l'insieme di definizione della funzione

$$f(x, y) = \frac{y^3(x-1)^3 \log[(x^2-1)y]}{(x-1)^2 + y^2}.$$

Dare, quindi, la definizione di punto di accumulazione per un insieme. Stabilire inoltre se il punto  $(1, 0)$  è di accumulazione per l'insieme di definizione di  $f$  e in tal caso calcolare

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} f(x, y).$$

- 4) Dare la definizione di funzione differenziabile in un punto.

Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  un insieme aperto; dimostrare che se  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  è differenziabile in  $x_0 \in A$ , allora  $f$  è continua in  $x_0$ .

Considerare poi le funzioni  $g(x, y) = ye^x - 1$  e  $f(\xi, \eta) = (\xi + \eta, \xi\eta)$ . Dimostrare che la funzione  $g \circ f$  è differenziabile in  $\mathbb{R}^2$  e calcolare  $\nabla(g \circ f)(\xi, \eta)$ , per ogni  $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$ .

**Gruppo A**

---

- 1) Considerare la successione di funzioni  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  così definita:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{\arctan nx}{nx} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

se ne calcoli il limite puntuale in  $\mathbb{R}$  e si dica, motivando la risposta, se la convergenza è uniforme.

- 2) Sia  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x - x_0)^n$  una serie di potenze ed  $f$  la sua somma. Scrivere la relazione esistente tra  $D^{(n)}f(x_0)$  e  $a_n$ .

Usarla poi per calcolare

$$D^{(5)} \left( \frac{1}{1 - 16x^2} \right) (0).$$

- 3) Stabilire se esiste il limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-2)} \frac{xy - y + 2x - 2}{x^2 - y^2 - 2x - 4y - 3}.$$

- 4) Considerare le funzioni  $f(\xi, \eta) = (\xi^2 - \eta^2, \cos(\xi\eta))$  e  $g(x, y) = (\arctan(xy), xy)$ . Dimostrare che la funzione  $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  è differenziabile in  $\mathbb{R}^2$ . Calcolare poi il suo differenziale nel punto  $(0, 1)$ .

## Gruppo B

- 5) Si determini la soluzione del problema

$$\begin{cases} y' = \frac{t^2 + y^2}{ty} \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

- 6) Considerare il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \arctan\left(\frac{t + y^2}{t^2 + 1}\right) - y \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Stabilire per quali  $(t_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ , il problema ha un'unica soluzione. Stabilire inoltre se (al variare di  $(t_0, y_0)$ ) le soluzioni sono definite su  $\mathbb{R}$ .

- 7) Dimostrare che la 1-forma

$$\omega = y(2xe^{x^2y} - 1)dx + x(xe^{x^2y} - 1)dy$$

è esatta e se ne calcoli una primitiva. Calcolare poi

$$\int_{\gamma} \omega$$

dove  $\gamma = \gamma(t) = (2\cos(3t), \frac{1}{2}\sin(3t))$ ,  $t \in [0, \frac{2\pi}{3}]$ .

- 8) Calcolare

$$\iint_D \frac{x}{y} \sin(xy) dx dy,$$

dove  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq xy \leq 2, \frac{x}{2} \leq y \leq x\}$ .

**Gruppo A**

- 1) Studiare la convergenza puntuale della serie di funzioni

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 2} \frac{1}{(4 - x^2)^n}.$$

- 2) Enunciare il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale. Verificare, inoltre, che non si applica sull'intervallo  $[0, 1]$  alla successione

$$f_k(x) = \begin{cases} k^2 & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{1}{k} \\ 0 & \text{se } \frac{1}{k} < x \leq 1 \end{cases}$$

specificando quale ipotesi del teorema non è soddisfatta.

- 3) Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \log(x^2 + y^2)$$

- 4) Dimostrare che la funzione

$$f(x, y) = \frac{x^2 y - 1}{x^2 - y^2} \sin(x + y)$$

è differenziabile in ogni punto del suo dominio.

Calcolare poi l'equazione del piano tangente al grafico di  $f$  nel punto di coordinate  $(0, \pi)$ .

## Gruppo B

- 5) Determinare i punti di minimo e massimo locale della funzione

$$f(x, y) = 2y^2 \log(2 + x) + x^2 y^2.$$

Stabilire inoltre se  $f$  ha punti di minimo e massimo assoluti

- 6) Sia  $I$  un intervallo di  $\mathbb{R}$  e si consideri  $t \in I \mapsto A(t)$ , con  $A(t)$  matrice  $n \times n$  avente per elementi funzioni di classe  $C^1$ . Dimostrare che gli  $n$  problemi di Cauchy

$$\begin{cases} y' = A(t)y \\ y(t_0) = e_i \end{cases}$$

dove  $t_0 \in I$  e  $\{e_i\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$  è la base canonica di  $\mathbb{R}^n$ , forniscono  $n$  soluzioni linearmente indipendenti del sistema  $y' = A(t)y$  e che ogni altra soluzione si scrive come combinazione lineare di queste.

- 7) Risolvere, per  $t > 0$  l'equazione differenziale

$$ty' = -(1 + t)y + ty^3.$$

- 8) Calcolare

$$\int_{\gamma} \left( \log(x + y) + \frac{x}{x + y} \right) dx + \frac{x}{x + y} dy,$$

dove  $\gamma = \gamma(t) = (2 + \cos t, \frac{1}{2} \sin t)$ ,  $t \in [0, \pi]$ .

**Gruppo A**

- 1) Enunciare il teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata.

Si consideri poi

$$f_k(x) = \frac{1}{k^2} \cos(kx)$$

e si verifichi che il teorema si applica a tale successione.

- 2) Studiare la convergenza puntuale della serie di funzioni

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\log n} \frac{1}{(1 - \sqrt{x})^n}.$$

- 3) Enunciare il Teorema di Schwartz.

Applicarlo poi per stabilire se può esistere una funzione definita in  $\mathbb{R}^2$  e ivi di classe  $C^2$  tale che

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x^2 y \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \cos(xy).$$

- 4) Determinare l'insieme di definizione della funzione

$$f(x, y) = \frac{x}{y} \cos \frac{y}{x^2 - y}$$

e rappresentarlo graficamente. Provare che  $f$  è differenziabile in ogni punto del suo insieme di definizione.



### Gruppo B

- 5) Sia  $A$  un aperto di  $\mathbb{R}^2$  e  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  di classe  $C^2$  e sia  $(x_0, y_0) \in A$  tale che  $\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$ . Dimostrare che se l'Hessiano di  $f$  in  $(x_0, y_0)$  è definito positivamente allora  $(x_0, y_0)$  è di minimo locale forte per  $f$ .

- 6) Determinare l'integrale generale in forma implicita dell'equazione

$$t^2(1+y)y' = 2.$$

- 7) Provare che la forma differenziale

$$\frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

è chiusa ma non esatta in  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$ .

- 8) Sia  $A = [1, 2] \times [0, 1]$ . Calcolare l'integrale

$$\iint_A \left( \frac{x}{x+y} \right)^2 dx dy.$$

**Gruppo A**

- 1) Studiare il carattere della serie numerica
- 

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left( 1 - \cos^2 \frac{1}{2n} \right).$$

- 2) Studiare la convergenza puntuale su  $\mathbb{R}$  della successione di funzioni:

$$f_n(x) = x^2 n^2 e^{-nx}.$$

Stabilire poi, che la convergenza non è uniforme sull'intervallo  $[0, +\infty)$ .

- 3) Calcolare, se esiste, il seguente limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^3}{\tan(x - y)}.$$

- 4) Stabilire se esiste il piano tangente al grafico della funzione

$$f(x, y) = \frac{x}{y} \arctan(e^{xy})$$

nel punto  $P = (0, 1)$  e scriverne l'equazione.

### Gruppo B

- 5) Fornire un esempio di un problema di Cauchy per cui non sussiste l'unicità della soluzione.
- 6) Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' - 2y' + 2y = \sin x - 4.$$

- 7) Stabilire se la seguente forma differenziale è esatta:

$$w = e^{xy}dx - e^{xy}dy.$$

- 8) Calcolare l'integrale

$$\iint_A \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy,$$

dove  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 16, x \leq 0, y \leq \frac{1}{2}x\}$ .

**Gruppo A**

- 1) Studiare il carattere delle serie numeriche

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{\cos \frac{1}{n}} - 1}{n^2}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\arctan(n^2 - 1))^{\frac{1}{2}} + n}{n^2 + 1}.$$

- 2) Dimostrare che la serie delle derivate di una serie di potenze ha lo stesso raggio di convergenza della serie di partenza.
- 3) Calcolare, se esiste, il seguente limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{(x^2 - 2x + 4) \sin(y^2)}{y^2 x^3 - 2y^2 x^2}.$$

- 4) Considerare le funzioni  $f(\xi, \eta) = (\cos(\xi\eta), \xi^2 + \eta^2)$  e  $g(x, y) = (\arctan xy, x - y)$ . Determinare l'aperto di  $\mathbb{R}^2$  su cui la funzione  $g \circ f$  è differenziabile e calcolare poi  $d(g \circ f)(0, 0)$ .

### Gruppo B

- 5) Determinare i punti di estremo locale per la funzione

$$f(x, y) = x^2 y (x - y)^{\frac{1}{3}}.$$

Ha  $f$  punti di estremo assoluto? Motivare la risposta.

- 6) Determinare la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + 4y = \cos 2x + 2x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

- 7) Determinare il sottoinsieme del piano su cui è definita la forma differenziale

$$\frac{x^2 y^2 - 2xy^3}{(x - y)^2} dx + \frac{2x^3 y - x^2 y^2}{(x - y)^2} dy$$

e stabilire se ivi è esatta.

- 8) Calcolare l'integrale

$$\iint_A (e^x e^y x \cos(x + y) - y e^y e^x \cos(x + y)) \, dx dy,$$

dove  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x + y < \frac{\pi}{2}, -3 < y - x < -1\}$ .

**Gruppo A**

- 1) Studiare nell'intervallo  $[0, 1]$  la convergenza puntuale della successione

$$f_n(x) = \frac{n}{(1 + nx)^2}.$$

Stabilire se si ha convergenza uniforme su ogni intervallo del tipo  $[a, 1]$  con  $0 < a < 1$ .

- 2) Determinare e rappresentare graficamente l'insieme di definizione della funzione

$$f(x, y) = \log((x - y) \sin x)$$

- 3) Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \log(1 + x - y) \sin \left( \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

- 4) Considerare le funzioni  $f(\xi, \eta) = (\xi\eta, \sin(\xi^2 + \eta^2))$  e  $g(x, y) = (xye^{xy}, x + y)$ . Stabilire se la funzione  $g \circ f$  è differenziabile in  $(\sqrt{\frac{\pi}{2}}, 0)$  e, in caso affermativo, calcolare

$$d(g \circ f) \left( \sqrt{\frac{\pi}{2}}, 0 \right).$$

### Gruppo B

- 5) Stabilire che la funzione

$$f(x, y) = \frac{x - y + 1}{2x + y} + \sin xy$$

è differenziabile sul suo insieme di definizione. Calcolare poi  $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0)$ , per qualsiasi versore  $v = (v_1, v_2)$ .

- 6) Stabilire che esiste una ed una sola soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \cos t + y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Si calcoli poi il polinomio di Maclaurin di ordine 3 per la soluzione.

- 7) Calcolare

$$\int_{\gamma} (2xy^2 - 1)dx + 2yx^2dy,$$

dove  $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  è la curva di componenti  $\gamma(t) = (\frac{1}{t+1}, t)$ .

- 8) Calcolare l'integrale

$$\iint_A \frac{x^2}{2 + y} dx dy,$$

dove  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 < y < x^2, 0 < x < 1\}$ .