


Possibile svolgimento della prova dell'11 luglio 2025 – Modulo B

- 1) Il dominio di integrazione  $A$  è l'intersezione di due regioni:
- $x^2 + y^2 < 4x$  equivale a  $(x - 2)^2 + y^2 < 4$ , cioè l'interno del cerchio di centro  $(2, 0)$  e raggio 2;
  - $y > x$ , cioè il semipiano sopra la bisettrice del I e III quadrante.



Per calcolare l'integrale, conviene usare le coordinate polari con polo in  $O$ . La condizione  $x^2 + y^2 < 4x$  in coordinate polari diventa:

$$r^2 < 4r \cos \theta \Leftrightarrow r < 4 \cos \theta.$$

La condizione  $y > x$  diventa  $r \sin \theta > r \cos \theta$ , ovvero  $\tan \theta > 1$ , che significa  $\theta \in (\pi/4, \pi/2)$ .

Il dominio in coordinate polari è:

$$A = \{(r, \theta) : 0 < r < 4 \cos \theta, \pi/4 < \theta < \pi/2\}.$$

L'integranda in coordinate polari:

$$xy = r \cos \theta \cdot r \sin \theta = r^2 \cos \theta \sin \theta.$$


L'integrale diventa:

$$\int_A xy \, dx \, dy = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{4 \cos \theta} r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot r \, dr \, d\theta \quad (1)$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^{4 \cos \theta} d\theta = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \cdot 4^3 \cos^4 \theta d\theta \quad (2)$$

$$= -64 \left[ \frac{\cos^6 \theta}{6} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{32}{3} \frac{1}{(\sqrt{2})^6} = \frac{32}{24} = \frac{4}{3}. \quad (3)$$

- 2) Il dominio di  $F$  è determinato dalla sola condizione  $y - x^2 > 0$ , ovvero  $y > x^2$ . Esso è quindi la regione del piano sopra la parabola  $y = x^2$ :



Il dominio è un insieme aperto (è la controimmagine mediante il polinomio  $p(x, y) = y - x^2$  dell'intervallo aperto  $(0, +\infty)$ ), non limitato, connesso per archi.

La funzione  $F$  è differenziabile in  $(1, 2)$ , perché le sue componenti sono funzioni di classe  $C^1$  (in realtà  $C^\infty$ ) nel dominio.

Calcoliamo la matrice Jacobiana di  $F$ . Le derivate parziali sono:

Prima componente  $F_1(x, y) = \frac{x}{\sqrt{y-x^2}}$ :

$$\frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y) = \frac{\sqrt{y-x^2} - x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{y-x^2}}}{y-x^2} = \frac{y}{(y-x^2)^{3/2}}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial y}(x, y) = -\frac{x}{2(y-x^2)^{3/2}}.$$

Seconda componente  $F_2(x, y) = \arctan(xy)$ :

$$\frac{\partial F_2}{\partial x}(x, y) = \frac{y}{1+(xy)^2}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial y}(x, y) = \frac{x}{1+(xy)^2}.$$

Terza componente  $F_3(x, y) = e^{x^2-y}$ :

$$\frac{\partial F_3}{\partial x}(x, y) = 2xe^{x^2-y}, \quad \frac{\partial F_3}{\partial y}(x, y) = -e^{x^2-y}.$$

Valutando in  $(1, 2)$ :

$$J_F(1, 2) = \begin{pmatrix} 2 & -1/2 \\ 2/5 & 1/5 \\ 2e^{-1} & -e^{-1} \end{pmatrix}$$

Per calcolare  $(F \circ \gamma)'(0)$ , usiamo la regola della catena:

$$(F \circ \gamma)'(0) = J_F(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = J_F(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-3/2 \\ 2/5+3/5 \\ 2e^{-1}-3e^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -e^{-1} \end{pmatrix}$$

- 3)** Le soluzioni singolari sono le funzioni costanti che annullano  $g(y) = y^2 - y = y(y-1)$ , ovvero  $y = 0$  e  $y = 1$ .

Per l'integrale generale, separiamo le variabili:

$$\frac{dy}{y(y-1)} = \cos x \, dx.$$

Decomponiamo in fratti semplici:

$$\frac{1}{y(y-1)} = \frac{1}{y-1} - \frac{1}{y}.$$

Integrando:

$$\log |y-1| - \log |y| = \sin x + C, \quad \text{ovvero} \quad \log \left| \frac{y-1}{y} \right| = \sin x + C.$$

L'integrale generale in forma implicita è:

$$\left| \frac{y-1}{y} \right| = e^{\sin x + C} = Ke^{\sin x}, \quad K > 0.$$

Rimuovendo il valore assoluto:

$$\frac{y-1}{y} = \pm Ke^{\sin x} = \tilde{K}e^{\sin x}, \quad \tilde{K} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Da cui possiamo ricavare  $y = y(x)$ :

$$y = \frac{1}{1 - \tilde{K}e^{\sin x}}$$

Per la condizione iniziale  $y(\pi/2) = 2$ :

$$2 = \frac{1}{1 - \tilde{K}e^1} \Leftrightarrow 1 - \tilde{K}e = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \tilde{K} = \frac{1}{2e}.$$

La soluzione richiesta è quindi

$$y = \frac{1}{1 - \frac{1}{2e}e^{\sin x}} = \frac{2e}{2e - e^{\sin x}}.$$

- 4) **Criterio del confronto asintotico per integrali impropri:** Siano  $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  due funzioni definitivamente positive e integrabili su ogni intervallo  $[a, b]$  con  $b > a$ . Se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, +\infty),$$

allora gli integrali impropri  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  e  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  hanno lo stesso carattere.

**Dimostrazione:** Poiché  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L > 0$ , per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $x_0 > a$  tale che per ogni  $x > x_0$ :

$$L - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < L + \varepsilon$$

e inoltre, a patto di scegliere un  $x_0$  più grande, possiamo assumere che  $f$  e  $g$  sia non negative sull'intervallo  $(x_0, +\infty)$ . Scegliamo  $\varepsilon = L/2$ . Allora per  $x > x_0$ :

$$\frac{L}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3L}{2}$$

Quindi per  $x > x_0$ :

$$\frac{L}{2}g(x) < f(x) < \frac{3L}{2}g(x)$$

Se  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  converge, allora  $\int_{x_0}^{+\infty} g(x) dx$  converge, quindi anche  $\int_{x_0}^{+\infty} \frac{3L}{2}g(x) dx = \frac{3L}{2} \int_{x_0}^{+\infty} g(x) dx$  converge. Per il criterio del confronto,  $\int_{x_0}^{+\infty} f(x) dx$  converge, e quindi  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  converge.

Se  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  diverge, allora  $\int_{x_0}^{+\infty} g(x) dx$  diverge, quindi anche  $\int_{x_0}^{+\infty} \frac{L}{2}g(x) dx = \frac{L}{2} \int_{x_0}^{+\infty} g(x) dx$  diverge. Per il criterio del confronto,  $\int_{x_0}^{+\infty} f(x) dx$  diverge, e quindi  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  diverge.

In entrambi i casi, i due integrali hanno lo stesso carattere.  $\square$

**Applicazione:** Studiamo il carattere di  $\int_2^{+\infty} \frac{\sin(\frac{1}{x})}{x \log x} dx$ .

Ricordiamo che per  $t \rightarrow 0$ :  $\sin t \sim t$ . Quindi per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\sin\left(\frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x}.$$

Pertanto

$$\frac{\sin(\frac{1}{x})}{x \log x} \sim \frac{1}{x^2 \log x}$$

e per il criterio del confronto asintotico l'integrale dato ha lo stesso carattere di:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2 \log x} dx.$$

Quest'ultimo è un integrale improprio che converge. Infatti, per  $x > e$  abbiamo  $\log x > 1$ , quindi:

$$\frac{1}{x^2 \log x} < \frac{1}{x^2}$$

e  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$  converge. Quindi l'integrale  $\int_2^{+\infty} \frac{\sin(\frac{1}{x})}{x \log x} dx$  converge.