


1) Calcolare il seguente integrale

$$\int_A \log(xy+1) \, dx \, dy$$

dove  $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq xy \leq 1 \wedge \frac{1}{2} \leq y \leq x\}$

A è l'insieme rappresentato in figura in giallo



Facciamo un cambio di variabile ponendo

$$\begin{cases} xy = u \\ \frac{y}{x} = v \end{cases} \quad \text{quindi} \quad 0 \leq u \leq 1 \quad \text{e} \quad \frac{1}{2} \leq v \leq 1$$

cioè nel piano  $(u,v)$  l'insieme  $A$  è mappato dalla trasformazione qui sopra nell'insieme  $B = [0,1] \times [\frac{1}{2},1]$

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{pmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{pmatrix}$$

$$\left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right| = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = 2\frac{y}{x} = 2v. \quad \text{Quindi}$$

$$\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right|^{-1} = \frac{1}{2v}$$

$$\text{Pertanto} \quad \int_A \log(xy+1) \, dx \, dy = \int_B \log(u+1) \frac{1}{2v} \, du \, dv =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \log(u+1) \, du \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{v} \, dv =$$

$$\frac{1}{2} \log v \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \cdot \left( u \log(u+1) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{u}{u+1} \, du \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \cdot \left( \log 2 - 1 + \log(u+1) \Big|_0^1 \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \cdot \left( \log 2 - 1 + \log 2 \right) =$$

$$= +\frac{1}{2} \log 2 \cdot (2 \log 2 - 1)$$

2) Determinare i punti critici della funzione

$\varphi(x,y) = (xy)^4(x-y+1)$  e studiamo la natura

$\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ .

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x,y) = 4(xy)^3 y (x-y+1) + (xy)^4$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x,y) = 4(xy)^3 x (x-y+1) - (xy)^4$$

$$\begin{cases} 4(xy)^3 y (x-y+1) + (xy)^4 = 0 \\ 4(xy)^3 x (x-y+1) - (xy)^4 = 0 \end{cases}$$

sommiamo membro a membro  
e risolvendo la 1ª equazione otteniamo:

$$\begin{cases} 4(xy)^3 (x-y+1)(x+y) = 0 \\ 4(xy)^3 y (x-y+1) + (xy)^4 = 0 \end{cases}$$

equivalente a

$$\begin{cases} xy = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} (x-y+1) = 0 \\ (xy)^4 = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x+y = 0 \\ 4x^7(2x+1) + x^8 = 0 \end{cases}$$

tutti i punti dell'asse  
della  $x$  e quelli dell'asse  
della  $y$  sono critici

$$\begin{cases} x=0 \\ y=1 \end{cases} \vee \begin{cases} y=0 \\ x=-1 \end{cases}$$

$P_1 = (0,1)$  e  $P_2 = (-1,0)$   
sono punti critici

$$\begin{cases} x^7(8x+4+x) = 0 \\ y = -x \end{cases}$$


$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -\frac{4}{9} \\ y = \frac{4}{9} \end{cases}$$

$(0,0)$  è  
critico

$P_3 = (-\frac{4}{9}, \frac{4}{9})$

Proviamo ad analizzare la natura dei punti trovati.

Cominciamo con i punti sugli assi cartesiani. Poiché su ognuno di essi  $\varphi$  si annulla, la loro natura dipende dal segno di  $\varphi$  in un intorno del punto fissato. Poiché il segno di  $\varphi$  dipende



solo dal segno di  $g(xy) = x-y+1$

abbiamo per i punti sull'asse

della  $x$ ,  $(\bar{x}, 0)$ , e per quelli nell'asse della  $y$ ,  $(0, \bar{y})$ :

se  $\bar{x} > -1 \rightarrow$  minimo locale non forte

"  $\bar{x} < -1 \rightarrow$  massimo " "

$(-1, 0)$  è di sella

"  $\bar{y} > 1 \rightarrow$  massimo " "

"  $\bar{y} < 1 \rightarrow$  minimo " "

$(0, 1)$  è di sella

Infine studiamo la natura del punto  $P = (-\frac{4}{9}, \frac{4}{9})$

$$\begin{aligned} \varphi_{xx}(x,y) &= 12(xy)^2 y^2 (x-y+1) + 4(xy)^3 y + 4(xy)^3 y = \\ &= 12(xy)^2 y^2 (x-y+1) + 8(xy)^3 y \end{aligned}$$

$$f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y) = 12(xy)^3(x-y+1) + 4(xy)^3(x-y+1) - 4(xy)^3y + 4(xy)^3x$$

$$= 16(xy)^3(x-y+1) + 4(xy)^3(x-y)$$

$$f_{yy}(x,y) = 12(xy)^2x^2(x-y+1) - 4(xy)^3x - 4(xy)^3x =$$

$$= 12(xy)^2x^2(x-y+1) - 8(xy)^3x$$

$$f_x\left(-\frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right) = 12\left(\frac{4}{9}\right)^6\left(\frac{1}{9}\right) - 8\left(\frac{4}{9}\right)^7 = \left(\frac{4}{9}\right)^6\left(\frac{4}{3} - \frac{32}{9}\right) = -\frac{20}{9}\left(\frac{4}{9}\right)^6 = -5\left(\frac{4}{9}\right)^7$$

$$f_{xy}\left(-\frac{5}{8}, \frac{5}{8}\right) = -16\left(\frac{4}{9}\right)^6\left(\frac{1}{9}\right) + 4\left(\frac{4}{9}\right)^6\left(\frac{8}{9}\right) =$$

$$= \left(\frac{4}{9}\right)^6\left(-\frac{16}{9} + \frac{32}{9}\right) = \left(\frac{4}{9}\right)^6\frac{16}{9} = 4\left(\frac{4}{9}\right)^7$$

$$f_{yy}\left(-\frac{5}{8}, \frac{5}{8}\right) = 12\left(\frac{4}{9}\right)^6\left(\frac{1}{9}\right) - 8\left(\frac{4}{9}\right)^7 = -5\left(\frac{4}{9}\right)^7$$

$$H_f\left(-\frac{5}{8}, \frac{5}{8}\right) = \begin{pmatrix} -5\left(\frac{4}{9}\right)^7 & 4\left(\frac{4}{9}\right)^7 \\ 4\left(\frac{4}{9}\right)^7 & -5\left(\frac{4}{9}\right)^7 \end{pmatrix}$$

$$|H_f\left(-\frac{5}{8}, \frac{5}{8}\right)| = 25\left(\frac{4}{9}\right)^{14} - 16\left(\frac{4}{9}\right)^{14} > 0 \quad \text{quindi } P\left(-\frac{5}{8}, \frac{5}{8}\right) \text{ è di massimo locale forte}$$

Allo stesso risultato si può giungere osservando che  $f$  è nulla sul bordo del triangolo di vertici  $(0,0)$ ,  $(-1,0)$ ,  $(1,0)$  ed è positiva al suo interno.  $P$  è interno a tale triangolo e quindi per il teorema di Weierstrass  $P$  deve massimizzare anche il punto di massimo dello restrizione di  $f$  a tale triangolo.

3) Determinare in forme esplicite la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = (y \log y) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

$$y' = (y \log y) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{è un'equazione a variabili separabili}$$

Essa ammette un'unica soluzione singolare data da  $y(x) = 1, \forall x \in (-1,1)$ . Dato che in  $0$ , la soluzione è uguale a  $2$ , possiamo escludere che  $y(x) = 1$  ha la soluzione cercata e possiamo dividere entrambi i membri dell'equazione per  $y \log y$  (osservando anche che la soluzione sarà  $> 1$ ) ottenendo

$$\frac{y'}{y \log y} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{quindi} \quad \int \frac{dy}{y \log y} = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\text{cioè} \quad \log(\log y) = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + C$$

$$\text{cioè } \log(\log y) = \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2} + C$$

Perché  $y(0) = 2$  otteniamo  $\log(\log 2) = -1 + C$  da cui

$$C = 1 + \log(\log 2)$$

$$\text{Anziché } \log y = e^{-\sqrt{1-x^2} + 1} e^{\log(\log 2)} = e^{-\sqrt{1-x^2} + 1} \cdot \log 2$$

$$\text{cioè } y(x) = e^{\log 2 \cdot e^{-\sqrt{1-x^2} + 1}} = (e^{\log 2})^{e^{-\sqrt{1-x^2} + 1}} = 2^{e^{1-\sqrt{1-x^2}}}$$

4) Enunciare e dimostrare il teorema di Fermat per una funzione di due variabili reali

Si veda, ad esempio, pag. 73-74 del manuale Fusco, Marcellini, Spigolon  
"Elementi di Analisi Matematica due", Liguori Editore