

1) a) Calcola  $\sqrt[3]{27i}$  in forma cartesiana

$$|27i| = 27 \quad \text{Arg}(27i) = \frac{\pi}{2} \quad \text{quindi}$$

$$\sqrt[3]{27i} = 3 \left( \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}\right) \right), \quad k=0,1,2$$

$$= \begin{cases} 3 \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i & (\text{per } k=0) \\ -3 \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i & (\text{per } k=1) \\ -3i & (\text{per } k=2) \end{cases}$$

b) dom  $f$ :  $x^3 + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$

$f$  è somma delle funzioni

$g(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x^3 + 1)$  che è strett. decrescente in  $\frac{1}{3}$  questo composto da  $g_1(x) = x^3 + 1$  strettamente crescente e  $g_2(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$  strettamente decrescente

e  
 $h(x) = e^{-x+1} = e \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^x$  che è strettamente decrescente

Quindi anche  $f$  è strettamente decrescente

$$\text{Im} f := f((-1, +\infty)) = \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \right) = (-\infty, +\infty)$$

2) dom  $f$ :  $\frac{2+x^2}{x^2-4} > 0 \Leftrightarrow x^2-4 > 0 \Leftrightarrow x > 2 \vee x < -2$

$f \in C^0((-\infty, -2) \cup (2, +\infty))$  quindi gli unici

asintoti verticali sono da cercare in 2 o da dx e in -2 o da sx

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left( \frac{x^2+2}{x^2-4} \right)^x = (+\infty)^2 = +\infty \quad \text{dunque la retta } x=2 \text{ è asintoto verticale a dx}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \left( \frac{x^2+2}{x^2-4} \right)^x = (+\infty)^{-2} = 0 \quad x=-2 \text{ non è asintoto}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \left( \frac{x^2+2}{x^2-4} \right)^x = (+\infty)^{-2} = 0 \quad x = -2 \text{ non \u00e9 asintoto}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \log \left( \frac{x^2+2}{x^2-4} \right)}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \log \frac{x^2+2}{x^2-4} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \log \left( 1 + \frac{6}{x^2-4} \right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x}{x^2-4} \cdot \frac{\log \left( 1 + \frac{6}{x^2-4} \right)}{\frac{6}{x^2-4}} = 0 \cdot 1 = 0 \end{aligned}$$

Quindi  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^0 = 1$  e dunque la retta  $y=1$  \u00e9

asintoto orizzontale per  $x \rightarrow +\infty$ . In modo analogo si vede che la stessa retta \u00e9 asintoto orizzontale anche per  $x \rightarrow -\infty$ .

$f$  \u00e9 derivabile nel suo dominio, quindi in  $x_0=4$  il grafico di  $f$  ammette la tangente

$$f'(x) = e^{x \log \left( \frac{x^2+2}{x^2-4} \right)} \left( \log \frac{x^2+2}{x^2-4} + x \frac{x^2-4}{x^2+2} \frac{2x(x^2-4) - 2x(x^2+2)}{(x^2-4)^2} \right)$$

$$= \left( \frac{x^2+2}{x^2-4} \right)^x \left( \log \frac{x^2+2}{x^2-4} - \frac{12x^2}{(x^2+2)(x^2-4)} \right)$$

$$f'(4) = \left( \frac{3}{2} \right)^4 \left( \log \frac{3}{2} - \frac{12 \cdot 16}{18 \cdot 12} \right) = \left( \frac{3}{2} \right)^4 \left( \log \frac{3}{2} - \frac{8}{9} \right) < 0$$

L'equazione della retta tangente al grafico di  $f$  nel punto  $x_0=4$  \u00e9

$$y = f(4) + f'(4)(x-4) = \left( \frac{3}{2} \right)^4 + \left( \frac{3}{2} \right)^4 \left( \log \frac{3}{2} - \frac{8}{9} \right) (x-4)$$

Poich\u00e9  $f'(4) < 0$  e  $f'$  \u00e9 continua dal teorema della permanenza del segno delle funzioni continue si ha che  $f'(x) < 0$  in un intorno di  $x_0=4$  e quindi  $f$  \u00e9 strettamente decrescente in tale intorno.

$$\begin{aligned}
 3) \quad \int x \operatorname{arctg} x^2 & \stackrel{x^2=t; dt=2x dx}{=} \frac{1}{2} \int \operatorname{arctg} t \, dt = \frac{1}{2} t \operatorname{arctg} t - \frac{1}{2} \int \frac{t}{1+t^2} dt \\
 & = \frac{1}{2} t \operatorname{arctg} t - \frac{1}{4} \log(1+t^2) + c = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} x^2 - \frac{1}{4} \log(1+x^4) + c
 \end{aligned}$$

4) Si veda ad esempio, p. 106 e pagg. 112-113 del manuale Marcellini, Sbordone "Elementi di Analisi Matematica uno", Liguori Ed.