

1) -2) Calcolare il nuovo complesso

$$\left(\frac{2-i}{1+2i} \right)^9$$

$$\frac{2-i}{1+2i} = \frac{(2-i)(1-2i)}{5} = \frac{-5i}{5} = -i = e^{-\frac{\pi}{2}i}$$

e quindi $\left(\frac{2-i}{1+2i} \right)^9 = e^{-\frac{9}{2}\pi i} = -i$

b) Determinare il dominio, il tipo di monotonia e l'immagine della funzione

$$f(x) = (x^2 + 1)e^{\sqrt{-x}}$$

$$\text{dom } f = (-\infty, 0]$$

f è il prodotto delle funzioni positive

$$g(x) = x^2 + 1 \quad \text{e} \quad h(x) = e^{\sqrt{-x}};$$

g è strettamente decrescente su $(-\infty, 0]$

h è composta da $h_1(x) = \sqrt{-x}$ e $h_2(x) = e^x$

Perché h_1 è strettamente decrescente e h_2 è strett. crescente

h è strett. decrescente. Dunque f è strett. decrescente in quanto prodotto di funzioni positive, strett. decrescenti

$f \in C^0((-\infty, 0])$ e quindi

$$\text{Im } f = \left[f(0), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right) = [1, +\infty)$$

2) Determinare dominio, asintoti e punti estremi locali e globali della funzione

$$f(x) = \frac{x}{x+1} + \log(x^2 - 1)$$

$$f(x) = \frac{x}{x+1} + \log(x^2-1)$$

$$\text{dom } f : \left\{ \begin{array}{l} x^2-1 > 0 \\ x+1 \neq 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x > 1 \vee x < -1 \\ x \neq -1 \end{array} \right.$$

$$\text{quindi } \text{dom } f = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

$f \in C^0(\text{dom } f)$ quindi gli eventuali asintoti verticali sono da cercare nei punti -1 e 1

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \quad \left[\frac{-1}{0^-} - \infty = \infty - \infty \right]$$

Andiamo di risolvere la forma indeterminata

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x+1} \left(x + (x+1) \log(x^2-1) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x+1} \left[x + (x+1) [\log|x+1| + \log(1-x)] \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x+1} \left[x + (x+1) \log|x+1| + (x+1) \log(1-x) \right] \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (x+1) \log|x+1| = \lim_{x \rightarrow -1^-} -|x+1| \log|x+1|$$

$$\stackrel{|x+1|=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} -t \log t = 0$$

$$\text{quindi } \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x+1} \left[x + (x+1) \log|x+1| + (x+1) \log(1-x) \right] = \frac{1}{0^-} (-1) = +\infty$$

e dunque $x = -1$ è asintoto verticale

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{1}{2} (-\infty) = -\infty$$

quindi la retta $x = 1$ è asintoto verticale

Andiamo eventuali asintoti orizzontali

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 + \infty = +\infty \text{ non è asintoto orizzontale per } x \rightarrow +\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 + 0 = 0$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 0 \cdot x = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ quindi f non ha neanche
asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 + \infty = +\infty$ non ha asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 + 0 = 0$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - 0 \cdot x = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, non ha asintoto obliquo per $x \rightarrow -\infty$




$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x+1-x}{(x+1)^2} + \frac{2x}{x^2-1} = \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{2x}{x^2-1} \\ &= \frac{x^2-1 + 2x(x+1)^2}{(x^2-1)(x+1)^2} = \frac{(x+1)(x-1 + 2x^2 + 2x)}{(x^2-1)(x+1)^2} \\ &= \frac{(x+1)(2x^2+3x-1)}{(x^2-1)(x+1)^2}; \text{ quindi} \end{aligned}$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow (x+1)(2x^2+3x-1) > 0$$

$$2x^2+3x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{-3+\sqrt{17}}{4} \vee x < \frac{-3-\sqrt{17}}{4}$$

quindi



Pertanto f ha un punto di minimo locale in $x = -\frac{3+\sqrt{17}}{4}$
Poiché $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ tale minimo non è globale

3)

Calcolare

$$1 - \sqrt{2}$$

3) Calcolare

$$\int \frac{x^2}{2} (2-x^3)^{\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}} dx$$

posto $x^3 = t$, $dt = 3x^2 dx$ otteniamo

$$\int \frac{x^2}{2} (2-x^3)^{\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}} dx = \frac{1}{6} \int (2-t)^{\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}} dt$$

$$= -\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} (2-t)^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{6} (2-t)^{\frac{1}{\sqrt{2}}}, \quad t = x^3$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{6} (2-x^3)^{\frac{1}{\sqrt{2}}} + C$$

4) Enunciare e dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale

si veda, ad esempio, la lezione 26.

Riguardo all'ultima parte dell'esercizio si osserva:

che detto $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^x e^{-s^2} ds$

risulta F derivabile e $F'(x) = e^{-x^2} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
e dunque F è strett. crescente.